

# 古今圖書集成

中華書局影印

231370


第四四〇册

博物彙編

藝術典

醫部

三七一三九  
(卷)



2944



四肢門九

鍼灸

導引

2949

素問曰肝熱病者熱爭則狂言及驚脅滿痛手足躁不得安臥庚辛甚甲乙大汗氣逆則庚辛死刺足厥陰少陽  
腎熱病者先腰痛筋瘦苦渴數飲身熱熱爭則項痛而強筋寒且瘦足下熱不欲言其逆則項痛員員澹澹然戊己甚壬癸大汗氣逆則戊己死刺足少陰太陽  
熱病先脅脅痛手足躁刺足少陽補足太陰病甚者爲五十九刺  
熱病始於足脛者刺足陽明太陰而汗出止  
靈樞經曰正月二月三月人氣在左無刺左足之陽四月五月六月人氣在右無刺右足之陽七月八月九月人氣在右無刺右足之陰十月十一月十二月

手太陰之別名曰列缺起於腕上分間並太陰之經直入掌中散入於魚際其病實則手銳掌熱虛則欠坎小便遺數取之去腕半寸別走陽明也  
手少陽之別名曰豐隆去踝八寸別走太陰其別者循脛骨外廉上絡頭項合諸經之氣下絡喉嗌其病氣逆則喉痹卒瘡實則狂顛虛則足不收脛枯取之所別也  
足陽明之別名曰豐隆去踝八寸別走太陰其別者循脛骨外廉上絡頭項合諸經之氣下絡喉嗌其病氣逆則喉痹卒瘡實則狂顛虛則足不收脛枯取之所別也  
邪在肝則兩脅中痛寒中惡血在內行善掣節時脚腫取之行間以引脅下補三里以溫胃中取血脉以散惡血取耳間青脈以去其掣  
身有所傷血出多及中風寒若有所墮墜四肢懈惰不收名曰體惰取其小腹臍下三結交三結交者陽明太陰也臍下三寸關元也  
暴擊癟眩足不任身取天柱  
病始手臂者先取手陽明太陰而汗出病始頭首者先取項太陽而汗出病始足脛者先取足陽明而汗出  
熱病面青腦痛手足躁取之筋間以第四鍼於四肢筋蹻曰浸索筋於肝不得索之金金者肺也  
足髀不可舉側而取之在樞合中以員利鍼大鍼不可刺病注下血取曲泉  
雲門闊骨委中髓空此八者以瀉四肢之熱也  
左足應立春其日戊寅己丑左手應立夏其日戊辰己巳右手應立秋其日戊申己未右足應立冬其日

人氣在左無刺左足之陰  
手太陰之別名曰列缺起於腕上分間並太陰之經直入掌中散入於魚際其病實則手銳掌熱虛則欠坎小便遺數取之去腕半寸別走陽明也  
手少陽之別名曰豐隆去踝八寸別走太陰其別者循脛骨外廉上絡頭項合諸經之氣下絡喉嗌其病氣逆則喉痹卒瘡實則狂顛虛則足不收脛枯取之所別也  
足陽明之別名曰豐隆去踝八寸別走太陰其別者循脛骨外廉上絡頭項合諸經之氣下絡喉嗌其病氣逆則喉痹卒瘡實則狂顛虛則足不收脛枯取之所別也  
邪在肝則兩脅中痛寒中惡血在內行善掣節時脚腫取之行間以引脅下補三里以溫胃中取血脉以散惡血取耳間青脈以去其掣  
身有所傷血出多及中風寒若有所墮墜四肢懈惰不收名曰體惰取其小腹臍下三結交三結交者陽明太陰也臍下三寸關元也  
暴擊癟眩足不任身取天柱  
病始手臂者先取手陽明太陰而汗出病始頭首者先取項太陽而汗出病始足脛者先取足陽明而汗出  
熱病面青腦痛手足躁取之筋間以第四鍼於四肢筋蹻曰浸索筋於肝不得索之金金者肺也  
足髀不可舉側而取之在樞合中以員利鍼大鍼不可刺病注下血取曲泉  
雲門闊骨委中髓空此八者以瀉四肢之熱也  
左足應立春其日戊寅己丑左手應立夏其日戊辰己巳右手應立秋其日戊申己未右足應立冬其日

人氣在左無刺左足之陰  
手太陰之別名曰列缺起於腕上分間並太陰之經直入掌中散入於魚際其病實則手銳掌熱虛則欠坎小便遺數取之去腕半寸別走陽明也  
手少陽之別名曰豐隆去踝八寸別走太陰其別者循脛骨外廉上絡頭項合諸經之氣下絡喉嗌其病氣逆則喉痹卒瘡實則狂顛虛則足不收脛枯取之所別也  
足陽明之別名曰豐隆去踝八寸別走太陰其別者循脛骨外廉上絡頭項合諸經之氣下絡喉嗌其病氣逆則喉痹卒瘡實則狂顛虛則足不收脛枯取之所別也  
邪在肝則兩脅中痛寒中惡血在內行善掣節時脚腫取之行間以引脅下補三里以溫胃中取血脉以散惡血取耳間青脈以去其掣  
身有所傷血出多及中風寒若有所墮墜四肢懈惰不收名曰體惰取其小腹臍下三結交三結交者陽明太陰也臍下三寸關元也  
暴擊癟眩足不任身取天柱  
病始手臂者先取手陽明太陰而汗出病始頭首者先取項太陽而汗出病始足脛者先取足陽明而汗出  
熱病面青腦痛手足躁取之筋間以第四鍼於四肢筋蹻曰浸索筋於肝不得索之金金者肺也  
足髀不可舉側而取之在樞合中以員利鍼大鍼不可刺病注下血取曲泉  
雲門闊骨委中髓空此八者以瀉四肢之熱也  
左足應立春其日戊寅己丑左手應立夏其日戊辰己巳右手應立秋其日戊申己未右足應立冬其日

人氣在左無刺左足之陰  
手太陰之別名曰列缺起於腕上分間並太陰之經直入掌中散入於魚際其病實則手銳掌熱虛則欠坎小便遺數取之去腕半寸別走陽明也  
手少陽之別名曰豐隆去踝八寸別走太陰其別者循脛骨外廉上絡頭項合諸經之氣下絡喉嗌其病氣逆則喉痹卒瘡實則狂顛虛則足不收脛枯取之所別也  
足陽明之別名曰豐隆去踝八寸別走太陰其別者循脛骨外廉上絡頭項合諸經之氣下絡喉嗌其病氣逆則喉痹卒瘡實則狂顛虛則足不收脛枯取之所別也  
邪在肝則兩脅中痛寒中惡血在內行善掣節時脚腫取之行間以引脅下補三里以溫胃中取血脉以散惡血取耳間青脈以去其掣  
身有所傷血出多及中風寒若有所墮墜四肢懈惰不收名曰體惰取其小腹臍下三結交三結交者陽明太陰也臍下三寸關元也  
暴擊癟眩足不任身取天柱  
病始手臂者先取手陽明太陰而汗出病始頭首者先取項太陽而汗出病始足脛者先取足陽明而汗出  
熱病面青腦痛手足躁取之筋間以第四鍼於四肢筋蹻曰浸索筋於肝不得索之金金者肺也  
足髀不可舉側而取之在樞合中以員利鍼大鍼不可刺病注下血取曲泉  
雲門闊骨委中髓空此八者以瀉四肢之熱也  
左足應立春其日戊寅己丑左手應立夏其日戊辰己巳右手應立秋其日戊申己未右足應立冬其日

善驚悲不樂厥脛足下熱面盡熱渴行間主之

膽眩寒厥手臂痛善驚妄言面赤泣出腋門主之  
腰脊痛強引背少腹俛仰難不得仰息脚痿重尻不舉溺赤腰以下至足清不仁不可以坐起膀胱俞主之

腰痛快快不可以俛仰腰以下至足不仁入脊腰背寒次竈主之先取缺盆後取尾骶與八竈

腰痛不可舉足跟中踝後痛脚痿僕參主之

氣瘤癩陰急股樞腨內廉痛交信主之

胷滿膨膨然實則癃閉腋下腫虛則遺溺脚急兢兢

然筋急痛不得大小便腰痛引腹不得俛仰委陽主

胷滿膨膨然實則癃閉腋下腫虛則遺溺脚急兢兢

然筋急痛不得大小便腰痛引腹不得俛仰委陽主

乳下二寸堅脅滿悸列缺主之

振寒瘈瘈手不伸咳嗽唾濁氣鬲善嘔鼓領不得汗煩滿因爲癰衄尺澤主之左室刺右右室刺左

間熱口中熱煩心心痛臂內廉及脅痛聾咳瘈瘈口乾頭痛不可顧少澤主之

振寒瘈瘈頭不可顧煩滿身熱惡寒目赤

痛背爛生膚膜暴痛勦衄發聾臂重痛肘攀痂疥胷中引膿泣出而驚頸項強身寒頭不可以顧後谿主之

振寒熱頸項腫實則肘攀頭項痛狂易虛則生疣小者痂疥支正主之

氣喘熱病衄不止煩心善悲腹脹逆息熱氣足脛中寒不得臥氣滿胷中熱暴泄仰息足下寒中悶嘔吐

不欲飲食隱白主之

熱痛煩心足寒清多汗先取然谷後取太谿大指間動脈皆先補之

手足寒至節喘息者死

手足清煩熱汗不出手肢轉筋頭痛如錐刺之狀熱不可以動動益煩心喉痹舌卷乾脣內廉不可及頭耳聾鳴竅陰皆主之

膝外廉痛熱病汗不出目外皆赤痛頭眩兩領痛寒逆泣出耳鳴聲多汗目癢胷中痛不可反側痛無常處俠谿主之

目視不明振寒目瞤瞳子不見腰兩脅痛脚痠轉筋丘墟主之

頭重鼻衄及瘈瘈汗不出煩心足下熱不欲近衣項痛目瞤鼻及小便皆不利至陰主之

鼽衄腰脊腳腨痠重戰慄不能久立腨如裂脚跟急痛足攀引少腹痛喉咽痛大便難腹脹承山主之

四厥手足悶者使人久持之厥熱脛痛內庭主之

瘡驚互引脚如結腨如裂束骨主之

瘡瘈瘈頭如結腨如裂崑崙主之

風痹注病不可已者足如履冰時如入湯中肢脛淫

瘈瘈煩心頭痛時嘔時悶眩已汗出久則目眩悲以喜怒短氣不樂不出三年死

足痺不可舉側而取之在樞闔中以員利鍼大鍼不可

膝中痛取犧鼻以員利鍼鍼發而間之鍼大如釐刺

足不仁刺風府

腰以下至足清不仁不可以坐起尻不舉腰俞主之足下熱痛不能久坐濕痹不能行三陰交主之膝外廉痛不可屈伸脛痹不仁陽關主之

髀樞中痛不可舉以毫鍼寒而留之以月生死爲病數立已長鍼亦可

偏枯四肢不用善驚大臣主之

兩手攀不收伸及腋偏枯不仁手痺偏小筋急大陵主之

足不收痛不可以行天泉主之

足下緩失履衝陽主之

手及臂攀神門主之

痱瘈臂腕不用脣吻不收合谷主之

肘痛不能自帶衣起頭眩領痛面黑風肩背痛不可顧關衝主之

嗌外腫肘臂痛五指痺不可屈伸頭眩領痛面黑風肩背痛不可

偏枯臂腕發痛肘屈不得伸手又風頭痛涕出肩臂

頸痛項急煩滿驚五指掣不可屈伸戰慄腕骨主之

風逆暴四肢腫濕則唏然寒饑則煩心飽則眩大都主之

風逆四肢腫復澑主之

瘈瘈風頭重頸痛樞股脣外廉骨痛瘈瘈痹不仁振

陽主之

肩中熱指臂痛肩髃主之

肩重不舉臂痛肩髃主之

肩重肘臂痛不可舉天宗主之

肘痛尺澤主之

肩肘中痛難屈伸手不可舉腕重急曲池主之

肩肘節痠重臂痛不可屈伸肘筋主之

肘中灌灌臂內廉痛不可及頭外關主之

肘痛引肩不可屈伸振寒熱頸項肩背痛臂痿痹不

仁天井主之

肘臂腕中痛頸腫不可以顧頭項急痛眩淫澀肩胛

小指痛前谷主之

肩痛不可自帶衣臂腕外側痛不舉陽谷主之

臂不可舉頭項痛咽腫不可嚥前谷主之

肩痛欲折肱如拔手不能自上下養老主之

嗜臥四肢不欲動搖身體黃灸手五里左取右右取

左

女子手脚拘攣腹滿疝月水不通乳餘疾絕子陰癢

陰交主之

婦人陰挺出四肢淫澀身悶照海主之

膝內廉痛引曠不可屈伸連腹引咽喉痛膝關主之

脛痛重足跗不收跟痛巨虛下廉主之

膝寒痹不仁不可屈伸脾關王主之

脾痹引膝股外廉痛不仁筋急陽陵泉主之

寒從足小指起脈痹上下帶智脅痛無常處至陰主之

足大指搏傷下車挫地通背指端傷爲筋痹解谿主之

熱病煩心心悶而汗不出掌中熱心痛身熱如火浸

淫煩滿舌本痛中衝主之

足外皮痛臨泣主之

身懈寒少氣熱甚惡人心惕惕然取飛揚及絕骨跗

下臨泣立已淫澀脛痠熱病汗不出皆主之

寒灌灌舌煩手臂不仁唾沫脣乾引飲手腕攀指肢

痛肺脹上氣耳中生風欬喘逆痹臂痛嘔吐飲食不

下膨膨然少商主之

千金方曰掖門主手臂痛

巨闕主手清

肩貞主手麻木不舉

陰交主手脚拘攣

少商主手不仁

列缺主手臂身熱

大陵主手攀不伸又云主手掣小偏

內關主手中風熱

大陵主手攀不伸又云主手掣小偏

間使主手痛

曲澤主手背逆氣

中衝勞宮少衝大泉經渠列缺主手掌熱肘中痛

前腋主臂裏攀急手不上舉

尺澤主掣痛手不可伸

神門少海主手臂攀

養老主手不得上下

內庭主四厥手足悶

腕骨中渚主五指掣不可屈伸

曲池主手不可舉重腕急肘中痛難屈伸又云主手

不舉

陽谿主臂腕外側痛不舉

心臟肝臉主筋急手相引

尺澤關衝外關竅陰主臂不及頭

前谷後谿陽谿主臂重痛肘攀

膕會支溝曲池腕骨肘筋主肘節痹臂痠重腋急痛

肘難屈伸

中膈臉譴譴主腋攀

腕骨前谷曲池陽谷主臂腕急腕外側痛脫如拔

天井外關曲池主臂痠不伸

大泉經渠主臂內廉痛

巨骨前谷主內不舉

肩窩天宗陽谷主臂痛

曲池關衝三里中渚陽谷尺澤王肘痛時寒

關衝主肘疼不能自穿衣

魚際靈道主肘攀柱滿

大陵主肘攀腋腫

間使主肘內廉痛

地五會陽輔申脈委陽天池臨泣主腋下腫

天宗主肩重臂痛

肩外廉主肩甲痛而寒至肘

腕骨主肩臂痛

陽關主膝外廉痛不可屈伸脛痹不仁

崑崙主脚如結踝如裂

陰陵泉主足痺痛

京骨承山承筋商丘主脚攀

承山承筋主脚脛痠脚急跟痛脚筋急痛兢兢

浮白主足緩不收

天柱行間主足不任身

行間主厥足中熱

然谷主足不能安脛痠不能久立

中都主足下熱脛寒不能久立

衝陽三里僕參飛揚復留完骨主足痺失履不收

僕參主足跟中踝後痛

飛揚主腨中痛

復留主脛寒不能自溫又主脚後廉急不可前足跗

京骨然谷腎腧主足痛

太谿次竅膀胱腧主足清不仁

太谿主手足寒至節

地倉太泉主足痿蹠不能行

光明主痿蹠坐不能起

風府腰腧主足不仁

條口三里承山承筋主足下熱不能久立

丘墟主腕不收坐不得起髀樞脚痛

陽輔陽交陽陵泉主髀樞膝骨痺不仁  
環跳束骨交信陰交陰舍主髀樞中痛不可舉

臨泣三陰交主髀中痛不得行足外皮痛  
申脈隱白行間主脛中寒熱

太衝涌泉主脛痠  
趺陽主腨外廉骨痛

至陰主風寒從足小指起脈痹上下

至陽主脛疼四肢重少氣難言

厲兌條口三陰交主脛寒不得臥

內庭環跳主肢痛不可屈伸

陽間環跳承筋主脛痹不仁

涌泉然谷主五趾盡痛足不踐地

風市主兩膝攀痛引脅拘急蟬蹙或青或焦或枯或

黧如腐木

太衝主膝內踝前痛

梁丘曲泉陽關主筋攀膝不得屈伸不可以行

犢鼻主膝中痛不仁

中封主少氣身重濕膝踵內踝前痛

解谿條口丘墟太白主膝股腫脝酸轉筋

合陽主膝股重

上廉主風水膝腫

陰市主膝上寒

伏兔主膝中寒

俠谿陽關主膝外廉痛

髀關主膝寒不仁痿痹不得屈伸

光明主膝痛脛熱不能行手足偏小

膝關主膝內廉痛引脅不可屈伸連腹引咽喉痛

凡犢鼻腫可灸不可刺若其上堅勿攻攻之即死

章門主四肢懈惰喜怒

列缺主四肢厥喜笑

曲泉趺陽天池大巨支溝小海絕骨前谷主四肢不舉

照海主四肢淫滌

五里三陽絡天井厲兌三間主嗜臥四肢不欲動搖

復留豐隆大都主風逆四肢腫

脚氣初灸風市次灸伏兔次灸犢鼻次灸膝兩眼次

灸三里次灸上廉次灸下廉次灸絕骨

臂直下舒十指掩著兩髀便點當手中央指頭髀大

筋上是灸之百壯多亦任人輕者不可減百壯重者

乃至一處五百壯勿令頓灸三報之佳第二伏兔

穴令病人累趺端坐以病人手掌橫掩膝上指下旁

與曲膝頭齊上旁側肉際當中央是灸百壯亦可五

十壯第三犢鼻穴在膝頭蓋骨上際外骨邊平處以

手按之得節解則是一云在膝頭下近外三骨箕腫

中動腳以手按之得窟解是灸之五十壯可至百壯

第四膝眼穴在膝頭骨下兩旁陷者宛宛中是第五

三里穴在膝頭骨節下五寸附脛骨外是一云在膝

頭骨節下三寸人長短大小當以病人手度取灸之

百壯第六上廉穴在三里下一寸亦附脛骨外是灸

之百壯第七下廉穴在上廉下一寸一云附脛骨外

是灸之百壯第八絕骨穴在脚外踝上一寸一云四

寸是凡此諸穴灸不必一頓灸盡壯數爲佳凡病一腳

之三日之中灸令盡壯數可日日報灸

病兩脚則灸兩脚凡脚弱病皆多兩脚又一方云如

覺脚惡便灸三里及絕骨各一處兩脚惡者合四處

灸之多少隨病輕重大要雖輕不可減百壯不瘥速

以次灸之多多益佳一說灸絕骨最要人有患此脚

弱不卽治及少腹腹腫大上氣於是乃須大法灸隨

諸陰及諸關節腹背盡灸之并服八風散往往得瘥者覺病入腹若病人不堪痛不能盡作大灸但灸胃心腹諸穴及兩脚諸穴亦有得好瘥者凡量一夫之法覆手并舒四指對度四指上中節上橫過爲一夫

夫有兩種有三指爲一夫者此脚弱灸以四指爲一夫也亦依支法存舊法梁丘竇鼻三里上廉下廉解谿太衝陽陵泉絕骨崑崙陰陵泉三陰交足太陰伏溜然谷涌泉承山束骨等凡一十八穴舊法多灸百會風府五臟六腑臉募頃來灸者悉覺引氣向上所以不取其法氣不止者可用之其要病已成恐不救者悉須灸之其足十趾去指奇一分兩足凡八穴曹氏乃曰八衝極下氣有效其足十指端名曰氣端日灸三壯並大神要其八衝可日灸七壯氣下卽止病者非深相知悉慎勿爲人灸之慎之慎之凡灸八衝須小作艾炷

衛生寶鑑曰肺寒氣海一穴在臍下一寸五分任脈所發三里二穴在膝下三寸肺外廉兩筋間舉足取之足陽明脈所合也可灸三壯鍼入五分三陰交二穴足內踝上三寸骨下陷中足太陰少陰厥陰之交會可灸三壯鍼入三分

髓會絕骨鍼經云腦髓消脛瘦耳鳴絕骨在外踝上輔骨下當膕中是也髓會之處也潔老人云頭熱如火足冷如冰可灸陽輔穴又云肺瘦冷絕骨取之陽輔二穴在足外踝上四寸輔骨前絕骨端如前三分去丘墟七寸足少陽脈之所行也可灸三七壯鍼入五分

醫學綱目曰足跟紅腫凍瘡於足指面後跟赤白肉

際骨下刺入三分彈鍼出血可灸二七壯脚氣腫痛取三里絕骨各二寸半丘墟鍼入一寸瀉之行間五分留八吸瀉之灸俠谿先瀉後補灸陽輔絕骨各

之商丘鍼入五分瀉十吸

治腳氣諸穴隨經選用之陷谷三分瀉之前谷五分瀉之灸中封瀉之灸俠谿先瀉後補灸陽輔絕骨各二寸半瀉之灸通谷一分瀉之灸

扁鵲治腳氣取腎氣在臍旁相去各四寸肩井三里氣海交龍

寒濕腳氣紅腫生瘡取中封五分瀉之陽輔絕骨各二寸半瀉之灸

又法取行間三里照海崑崙絕骨京骨委中三陰交兩足麻及足膝無力取風市在腿外廉垂手中指點到處是穴鍼五分補多瀉少留五呼先瀉成後補生又足不能行取丘墟行間崑崙太衝陽輔三陰交復瀉三里此一穴大治足不能行

刺灸諸痛法先明經脈次別淺深蓋經脈者爲手足十二經脈也

臂膊疼痛肩顫手三里外關

臂膊疼痛肩顫手三里外關

又法取肩頸曲池手上廉合谷不應再取肩井列缺臂痛連腕取腋門沿皮向後透陽池瀉之中渚沿皮透腕骨瀉之

臂痠攣取肘窮竅陰尺澤前谷後谿

腕痛取陽谿曲池

腕無力併痛取腕骨橫鍼入三分痛則瀉無力則補曲池補瀉同上

五指拘攣取三間一分先瀉後補灸之前谷一分瀉之灸

跨痛腿支風取環跳在髀樞中側臥伸下足屈上足方可鍼可入三寸半補少瀉多留八吸居竈一寸二分留八吸瀉之委中出血

跨痛蹶足取環跳懸鍾摘英作丘墟鍼五分留三呼灸三壯

跨痛脚支風不能轉側舉動艱難取環跳三寸半灸七七壯風市灸二七壯又取委中崑崙三里陽陵泉如不已取下穴五樞陽輔

腰脚痛取委中崑崙人中

側脚風取絕骨太衝

髀樞痛足脛寒熱足外廉皮骨痛取臨泣一分足三陰寸半陽輔

髀筋急脛痛足緩痿痹脰疼膝冷外廉不可屈伸濕痹流腫取風市中瀆陽關懸鍾

腿痛取陽陵泉三里伏兔陰市

腿膝拘攣痛引脅或青或焦或黧或枯如腐木狀風市灸之取陽陵泉曲泉崑崙

腿膝外廉痛股腫脛瘦轉筋痿痹或膝脛熱不可行動取俠谿五分髀關光明各一寸

髀痹引膝股外廉急痛脛瘦搖動有聲諸節痠不能行取陽陵泉絕骨中封

腿膝內廉痛引臍不可屈伸連腹引咽喉痛取太衝

五分中封膝關

脛瘦寒足下熱不能久立濕痹不仁取中都衝陽承

山承筋

脛寒四肢重少氣難言不得臥取至陽三陰交

草鞋風取崑崙瀉之留六呼太谿瀉之留六呼申脈

五分補少瀉多留二呼忌灸

草鞋風足腕痛取崑崙透太谿又取丘墟商丘各寸

半瀉之灸

又法取崑崙丘墟商丘照海如不已取後穴太衝解

谿

足腕不任痿躯坐不起髀脚痛取光明沿皮五分丘

墟直五分

腕緩不收覆足不任脛痠取然谷浮白崑崙

外踝紅腫痛取申脈半寸瀉之

繞踝風取曲池如繞外踝痛兼刺孫絡如繞內踝痛

取足少陽小指間三分兼刺大都三分如繞前廉痛

刺行間六分

脚背紅腫取太衝丘墟衝陽彈指出血臨泣

又法取太衝臨泣行間內庭如不已取崑崙丘墟

大拇指本節前骨疼取太衝彈鍼出血

足五指盡痛不得踐地取湧泉二分然谷一分

鶴膝風腫及腿痛取髌骨在膝蓋骨上一寸梁丘穴

兩旁各五分鍼入五分留一吸瀉之又取膝關在膝蓋骨下犢鼻內旁橫鍼透膝眼在犢鼻外旁禁灸留八呼瀉之

又法取膝關委中三寸半俱紫脈上出血爲妙又取三里如不已取陽陵泉中院豐隆

膝腫取行間又取陽陵泉橫透陰陵泉補生瀉成取

陰陵泉橫透陽陵泉補生瀉成又取膝間

腳拗痛取委中出血

腳膝痛筋急取風池三間三陰交三里

蹇膝伸不屈治其健在髀輔骨上橫骨下股外之中

側立搖動取之筋動應手

坐而膝痛治其機在髀骨兩旁相接處

立而暑解治其骸關膝解爲骸關若膝痛起立而膝

骨解中熱者治其骸關

膝痛痛及拇指治其膿在膝解之後曲脚之中委中

坐而膝痛如物隱者治其關在健之後背立按之動

搖筋應手

膝痛不可屈伸治其背內大杼穴也

連筋若折治陽明中俞髎三里穴也

膝痛若別治巨陽少陽榮然谷穴也

淫滌脛痠不能久立治少陽之雜在外踝上五寸光明穴也

兩肘俱攣取曲池九分先瀉後補補四呼瀉九呼尺澤手如弓方可鍼五分先補後瀉

筋攀骨痛取魂門補之

張仲文神仙灸法治脚筋攣急不可屈伸灸曲脈兩

文頭左右脚四處各三壯卽內外曲交穴每灸一脚

二火齊下艾炷纔燒至肉初覺疼便用一人齊吹至

火滅午時著艾至人定已來藏腑自動一二行或轉

動如雷聲其疾立愈此法神效卒不可量也

膝筋拘攣不開取兩膝外曲交尖灸二十七壯卽委陽穴

景岳全書曰凡脚氣初覺卽灸患處二三十壯或用雷火鍼以導引濕氣外出及飲醪醴以通經散邪其要法也

若壅既成而邪盛者必腫痛熱甚一時藥餌難散宜砭去惡血以消熱腫砭刺之後以藥繼之

膝筋拘攣不開取兩膝外曲交尖灸二十七壯卽委陽穴

奇效良方曰治脚轉筋急伸脚將腳緊鉤向前其痛卽止

保生祕要曰手足麻風導引法將左足搭右膝上以右手扳左脚左手托脚跟扳向右頭卽轉左右亦如之兼法運動氣脈自潮運功氣血兩虛之證起於歸元會意運法漸行患處多旋百轉以還原位行住坐臥得閑皆可運用或時以指甲捻麻處捻之覺痛使血來朝之意

導引

手足癱病念蹻行通關法或念背再推散四肢去手

骨節疼痛想火燒之

手指痛依患處念用環轉再折分散

手足不仁目轉蹻輪并氣海夜翻背水溉崑崙偏身

汗出四肢塞要在勤行是妙功還宜兩足交相擦更

可三陰穴處同

手足餒先念蹻次涌泉處肋拔上至蹻又從蹻處肋

拔下至涌泉止又從左手肋拔過右手右手肋拔過

左手每次行六幅

手足火燒患處推散想木洗之

手生瘡瘍手內外骨節處想火燒之又以水洗之再通散四肢血脉

足脛膝瘡依患處念用環轉數次推開分散用火燒之卽愈

手戰風從左手心處想火起轉至於肩過心頭直至右手心處亦想火轉至肩過心頭於左手心處

腳氣涌泉穴在足心濕氣皆從此入日夕之間常以兩足赤肉更次用一手握指一手摩擦數目多時覺足心熱卽將脚指略動轉倦則少歇或令人擦之亦得終不若自擦爲佳脚力強健無痿弱痠痛之疾矣

附通關法從北極定樞斗柄大旋三偏天地包羅行於臍下分開兩路旋下兩腿之前聯絡不絕雙行轉腿底向後繞元海上至命門會合從右轉左大旋三偏從椎骨下分行兩肩經肘後外關達掌心循內關過肩井由項後透泥丸行明堂漸落雙瞳自面部下胃膈會心窩從左轉下降大旋三偏如前臍下分開循環偏體周流運用卯酉二辰行之或九度或二十一度而止慎勿執著若有若無此所謂煉其形和其氣也

第二百十八卷目錄

醫部彙考一百九十八

四肢門十

醫案一

藝術典第二百十八卷

醫部彙考一百九十八

四肢門十

醫案一

三國志華佗別傳曰人有在青龍中見山陽太守廣

陵劉景宗景宗說中平曰數見華佗其治病手脈之候其驗若神琅邪劉勳爲河內太守有女年幾二十

左脚膝裏上有瘡瘍而不痛瘡愈數十日復發如此七八年迎佗使視佗曰是易治之當得稻糠黃色犬一頭好馬二匹以繩繫犬頸使走馬牽犬馬極輒易計馬走三十餘里犬不能行復令步人拖曳計向五十里乃以藥飲女女卽安臥不知人因取大刀斷犬

腹近後脚之前以所斷之處向瘡口令去二三十停之須臾有若蛇者從瘡中而出便以鐵錐橫貫蛇頭蛇在皮中動搖良久須臾不動乃牽出長三尺許純是蛇但有眼處而無童子又逆鱗耳以膏散著瘡中七日愈

兵部手集曰武元衡相國在西川自苦脛瘡焮癢不

可堪百醫無效及到京有廳吏上此方用之便瘥也方用馬齒莧搗爛傅上不過三兩徧

揮塵錄曰會稽楊梅爲天下冠童貫苦脚氣或云楊梅仁可治之郡守王嶷餽五十石貫用之而愈取仁法以柿漆拌核暴之則自裂出也

儒門事親曰新寨馬叟年五十九因欠秋稅官杖之得驚氣成風搖已三年矣病大發則手足顫掉不能持物食則令人代哺口日張睞脣舌嚼爛抖擗之狀如線引傀儡每發市人皆聚觀夜臥發熱衣被盡去徧身燥痒中熱而反外寒久欲自盡手不能繩領產求醫至破其家而病益堅叟之子邑中舊小吏也以父母病訊戴人戴人曰此病甚易治若隆暑時不過一涌再涌則愈今已秋寒可三之如未愈更刺膿穴必愈先以通聖散汗之繼服涌劑則吐痰一二升至晚又下五七行其疾小愈待五日再一涌出痰三四升如雞黃成塊狀如湯熱叟以手顫不能自探妻與代探咽嗌腫傷昏憒如醉約一二時許稍醒又下數行立覺勢輕顫減熱亦不作足亦能步手能巾櫛自持匙筋未至三涌病去如灌病後但覺極寒戴人曰當以食補之久則自退蓋大疾之去衛氣未復故宜以散風導氣之藥切不可以熱劑溫之恐反成他病也

黃如村一叟兩手搐搦狀如拽鋸冬月不能覆被適戴人之舞陽道經黃如不及用藥鍼其兩手大指後中注穴上戴人曰自肘已上皆無病惟兩手搐搦左氏所謂風淫末疾者此也或刺後谿手太陽穴也屈小指握紋盡處是穴

李氏一小兒病手足搐搦以示戴人戴人曰心火勝也勿持捉其手當從搐搦此由乳母保抱太極所致乃令掃淨地以水灑之乾令復灑之令極濕俛臥兒於地上良久渾身轉側泥涴皆滿仍以水洗之少頃而瘥矣

一稅官風寒濕痹腰脚沉重浮腫夜則痛甚兩足惡寒經五六月間猶著綿襪足膝皮膚少有跣露則冷風襲之流入經絡其病轉劇走注上下往來無定其痛極處便攀急而腫起肉色不變腠理如蟲行每遇風冷病必轉增飲食減少肌體瘦乏須人扶稍能行立所服者烏附薑桂種種燥熱燔鍼著灸莫知其數前後三年不愈一日予脈之其兩手皆沉滑有力先以導水丸通經散各一服是夜瀉三十餘行痛減半漸服赤茯苓湯川芎湯防風湯此三方在宣明論中治療方是也日三服煎七八錢熬熱然汗出又作玲瓏竈法熏蒸而愈

穎臯韓吉卿自髀至足生濕惡瘡大者如錢小者如豆痒則搔破水到則浸淫狀類蟲行疥癩愈而復生瘢痕成四十餘年不瘥戴人哂之曰此濕惡瘡也由水濕而得故多在足下以舟車濬川大下十餘行去如掃

谷陽鎮酒監張仲溫謁一廟觀匠者砌露臺高四尺許因登之下臺或肭一足外踝腫起熱痛如火一醫欲以鉛鍼刺腫上出血戴人急止之曰肭已痛矣更加鍼之二痛俱作何以忍也乃與神祐丸八十九下二十餘行禁食熱物夜半腫處發痒痛止行步如常戴人曰吾此法十治十愈不誑後人

常仲明之妻每遇冬寒兩手熱痛戴人曰四肢者諸陽之本也當夏時散越而不痛及乎秋冬收斂則痛以三花神祐九大下之而愈

郾城梁賈人年六十餘忽曉起梳髮覺左手手指麻斯須半臂麻又一臂麻斯須頭一半麻比及梳畢從脅至足皆麻大便二三日不通往問他醫皆云風也或藥或鍼皆不解求治於戴人戴人曰左手三部脈皆伏比右手小三倍此枯澀病也不可純歸之風亦有火燥相兼乃命一湧一泄一汗其麻立已後以辛涼之劑調之潤燥之劑濡之惟小指次指向麻戴人曰病根已去此餘烈也方可鍼谿谷谿谷者骨空也一日晴和往鍼之用靈樞中雞足法向上臥鍼三進三引訖復臥鍼起向下臥鍼送入指間皆然手熱如火其麻全去昔劉河間作原病式常以麻與澀同歸燥門中真知病機者也

陽夏胡家婦手足風裂其兩目昏漫戴人曰厥陰所至爲暎又曰鳴柔啓坼皆風之用風屬木木鬱者達之達謂吐也先令涌之繼以調胃承氣湯加當歸鴻之立效

戴人女僮足有凍瘡戴人令服舟車丸濬川散大下之遂愈人或疑之戴人曰心火降則下寒消何疑之有

麻先生兄村行爲犬所齧昇至家腫腫如罐堅若鐵石毒氣入裏嘔不下食頭痛而重往問戴人女僮曰痛隨利減以檳榔丸下之見兩行不差適戴人自舞陽回謂麻曰腫腫如此足之三陰三陽可行乎麻曰俱不可行如是何不大下之乃命夜臨臥服舟車丸

百五十粒通經散三四錢比至夜半下十四行腫立消作胡桃紋反細於不傷之腫戴人曰慎勿貼膏紙當令毒氣出流膿血水常行又一日戴人恐毒氣未盡又服舟車丸百餘粒濬川散三四錢見六行病人曰十四行易當六行反難何也戴人曰病盛則勝藥病衰則不勝其藥六日其膿水盡戴人曰膿水行時不畏風盡後畏風也乃以愈風餅子日三服之又二日方與生肌散一傅之而成痂嗚呼用藥有多寡使差別相懸向使不見戴人則利減之言非也以此知

知醫已難用醫尤難

麻先生妻病代指痛不可忍酒調通經散一錢半夜先吐吐畢而痛減予因嘆曰向見陳五曾病此醫以爲小蟲傷或以草上有毒物手因觸之遷延數月膿盡方已以今日觀之可以大笑

息帥腰股沉痛行步坐馬皆不便或作脚氣寒濕治

之或作虛損治之烏附乳沒活血壯筋骨之藥無不用之至六十餘日目赤上熱大小便俱澀腰股之病如故戴人診其兩手脈皆沉遲沉者在裏也宜泄之以舟車丸濬川散各一服去積水二十餘行至早晨服薤白粥一二頓與之上馬已能矍鑠矣

棠溪李十八郎病腰脚大不伸僵跛躄而行已數年矣服藥無功止藥却愈因秋暮涉水病復作醫氏使服四斤丸其父李仲安乃乞藥於戴人戴人曰近日服何藥仲安曰四斤丸曰目昏赤未其父驚曰目正暴發戴人曰宜速來不來則喪明矣始來策杖而行目腫無所見戴人先令涌之藥下忽走二十行兩目頓明策已棄去比再涌泄能讀官曆日調一月令

服當歸丸健步而歸矣

東垣十書曰靈壽縣董監軍癸卯冬大雪時因事到真定忽覺有風氣暴至診候得六脈俱弦甚按之洪實有力其證手攀急大便祕澀面赤熱此風寒始至加於身也四肢者脾也以風寒之邪傷之則搐急而攣痙乃風淫末疾而寒在外也內經曰寒則筋攣正謂此也本人素飲酒內有濕熱乘於腸胃之間故大便祕澀而面赤熱內則手足陽明受邪外則足太陰脾經受風寒之邪用桂枝甘草以却其寒邪而緩其急搐又以黃芩之苦寒以瀉實而潤燥急救腎水用升麻葛根以升陽氣行手足陽明之經不令遏絕更以桂枝辛熱入手陽明之經爲引用潤燥復以芍藥甘草專補脾氣使不受風寒之邪而退木邪專益肺金也加人參以補元氣爲之輔佐加當歸身去裏急而和血潤燥活血通經湯主之

乙巳春廉平章年三十八身體充肥腳氣始發頭面渾身肢節微腫皆赤色足腫赤腫痛不可忍不敢扶策手著皮膚其痛轉甚起而復臥而復起晝夜苦楚難以名狀求予治之平章以北土高寒故多飲酒積久傷脾不能運化飲食下流之所致投以當歸拈痛湯一兩二錢其痛減半再服腫痛悉除止有右手指末微赤腫以三棱鍼刺手爪甲端多出惡血赤腫全去不數日因食濕麪肢體覺痛再以枳實大黃湯治之夫脚氣之疾皆水濕之爲也麪滋其濕血壅而不行故肢節煩疼內經曰風能勝濕羌活辛溫透關節去濕故以爲主血留而不能行則痛當歸之辛溫散壅止痛枳實之苦寒治痞消食故以爲臣大黃苦

寒以導藥之濕熱併治諸老血留結取其峻駿故以爲使也

丹溪心法曰拘奶奶脚底如錐刺痛或跗腫手腕亦痛而腫大便泄滑裏急此血少又下焦血分受濕氣爲病健步丸主之

一村夫背僵僂而足攣已成廢人予診其脈兩手皆沉弦而濶遂以戴人煅腎散與之上吐下瀉過月餘

久吐瀉交作如此凡三貼然後平復

司丞叔平生脚自踝以下常覺熱冬不可加棉於上嘗自言曰我資稟壯不怕冷予曰此足三陰虛宜斷慾事以補養陰血庶乎可免笑而不答年方十七患痿半年而死

衛生寶鑑曰真定府張大年二十九素好嗜酒至元

辛未五月間病手指節腫痛屈伸不利膝頸亦然心下痞滿身體沉重不欲飲食卽欲吐面色痿黃精神減少至六月間來求予治之診其脈沉而緩緩者脾也難經云臉主體重節痛臉者脾之所主四肢屬脾蓋其人素飲酒加之時助濕氣大勝流於四肢故爲腫痛內經云諸濕腫痛皆屬脾土仲景云濕流關節肢體煩痛此之謂也宜以大羌活湯主之內經云濕淫於內治以苦溫以苦發之以淡滲之又云風能勝濕羌活獨活辛溫透關節而勝濕故以爲君升麻苦平威靈仙防風蒼朮苦辛溫發之者也故以爲臣血壅而不流則痛當歸身辛溫以散之使血氣各有所歸人參甘草甘溫溫脾胃養正氣使苦劑不能傷胃仲景云濕熱相合肢節煩疼苦參黃芩知母茵陳苦寒乃苦以泄之者也凡皆製炒以爲因用治濕不利小便非其治也猪苓甘溫平澤瀉鹹平淡以滲之又能導其留飲故以爲佐氣味相合上下分消其濕使壅滯之氣得宣通也

北之東武偶脚氣忽作徧身肢體微腫其痛手不能近足脛尤甚履不任穿跣以騎馬空兩鏡而以竹器盛之以困急來告予思內經有云飲發於中附腫於外又云諸痛爲實血實者宜決之以三棱鍼數刺其腫上血突出高二尺餘漸漸如線流於地約半升許其色紫黑頃時腫消痛減以當歸拈痛湯重一兩半服之是夜得睡明日再服而愈本草十劑云宣可去壅通可去滯內經云濕淫於內治以苦溫羌活苦辛透關節而勝濕防風甘草溫散經絡中流濕故以爲主水性潤下升麻葛根苦辛平味之薄者陰中之陽引而上行以苦發之也白朮苦甘溫和中勝濕蒼朮體輕浮氣力雄壯能去皮膚腠理間濕故以爲臣夫血壅而不流則痛當歸身辛溫以散之使血氣各有所歸人參甘草甘溫溫脾胃養正氣使苦劑不能傷胃仲景云濕熱相合肢節煩疼苦參黃芩知母茵陳苦寒乃苦以泄之者也凡皆製炒以爲因用治濕不利小便非其治也猪苓甘溫平澤瀉鹹平淡以滲之又能導其留飲故以爲佐氣味相合上下分消其濕使壅滯之氣得宣通也

至元壬午五月二十八日王伯祿年踰五旬有七右臂膊腫盛上至肩下至手指色變皮膚涼六脈沉細而微此乃脈證俱寒予舉瘡醫孫彥和視之曰此乃附骨癰開發已遲以燔鍼啓之膿清稀解次日肘下再開之加吃逆不絕彥和與丁香柿蒂散兩服稍緩次日吃逆尤甚自利臍腹冷痛腹滿飲食減少時發昏憤於左乳下黑盡處灸二七壯又處托裏溫中湯用乾薑附子木香沉香茴香羌活等藥咬咀一兩半欲與服或者曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火又當盛暑之時用乾薑附子可乎予應之曰理所當然不得不然內經曰脈細皮寒瀉利前後飲食不入此謂五虛况吃逆者胃中虛寒故也諸痛痒瘡瘍皆屬心火是言其定理也此證內外相反須當捨時從證也非大方

辛熱之劑急治之則不能愈也遂投之諸證悉去飲

中書粘合公年四旬經幹魁梧丙辰春從征至揚州

近足脛尤甚履不任穿跣以騎馬空兩鏡而以竹器盛之以困急來告予思內經有云飲發於中附腫於外又云諸痛爲實血實者宜決之以三棱鍼數刺其腫上血突出高二尺餘漸漸如線流於地約半升許其色紫黑頃時腫消痛減以當歸拈痛湯重一兩半服之是夜得睡明日再服而愈本草十劑云宣可去壅通可去滯內經云濕淫於內治以苦溫羌活苦辛透關節而勝濕防風甘草溫散經絡中流濕故以爲主水性潤下升麻葛根苦辛平味之薄者陰中之陽引而上行以苦發之也白朮苦甘溫和中勝濕蒼朮體輕浮氣力雄壯能去皮膚腠理間濕故以爲臣夫血壅而不流則痛當歸身辛溫以散之使血氣各有所歸人參甘草甘溫溫脾胃養正氣使苦劑不能傷胃仲景云濕熱相合肢節煩疼苦參黃芩知母茵陳苦寒乃苦以泄之者也凡皆製炒以爲因用治濕不利小便非其治也猪苓甘溫平澤瀉鹹平淡以滲之又能導其留飲故以爲佐氣味相合上下分消其濕使壅滯之氣得宣通也

至元壬午五月二十八日王伯祿年踰五旬有七右臂膊腫盛上至肩下至手指色變皮膚涼六脈沉細而微此乃脈證俱寒予舉瘡醫孫彥和視之曰此乃附骨癰開發已遲以燔鍼啓之膿清稀解次日肘下再開之加吃逆不絕彥和與丁香柿蒂散兩服稍緩次日吃逆尤甚自利臍腹冷痛腹滿飲食減少時發昏憤於左乳下黑盡處灸二七壯又處托裏溫中湯用乾薑附子木香沉香茴香羌活等藥咬咀一兩半欲與服或者曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火又當盛暑之時用乾薑附子可乎予應之曰理所當然不得不然內經曰脈細皮寒瀉利前後飲食不入此謂五虛况吃逆者胃中虛寒故也諸痛痒瘡瘍皆屬心火是言其定理也此證內外相反須當捨時從證也非大方辛熱之劑急治之則不能愈也遂投之諸證悉去飲

中書粘合公年四旬經幹魁梧丙辰春從征至揚州

食倍進瘡勢溫膿色正彥和復用五香湯數服後月餘平復隱守常者衆人之見知變者智者之事知常而不知變細事因而取敗者亦多矣况醫乎哉守常知變豈可同日而語哉

醫學綱目曰有人重病足不履地者十年良醫殫技莫能治所親置之道旁以求救者遇一游僧見之告曰此疾一藥可治但不知此土有否因爲之入山求索果得乃威靈仙也使服之數日能步履其後山人鄧思濟知之遂著其法云採得陰乾月餘搗篩溫清酒和二錢匕空心服之如人本性殺藥可加及六錢匕利過兩行則減之病除乃停服其性甚善不觸諸藥但惡茶及麪湯以甘草梔子代飲可也

一男子手足常自汗醫用芩連梔藥并補劑皆不效又足汗常多以八物半芩爲君白附川烏佐使其汗即無

孫少府監韓彥正暴得疾手足不舉諸醫皆以爲風鍼手足亦不知痛遂召孫診之孫曰此脚氣耳用檳榔末三錢生薑三片紫蘇七葉陳皮三錢水一大盞煎至七分去渣熱服數劑而愈

一男子年近三十滋味素厚性多焦怒秋間髀樞左

右一點發痛延及於膝晝靜夜劇惡寒口或渴或不

渴或痞或不痞醫多用風藥兼用補血至次年春其膝漸腫痛愈甚食漸減形羸瘦至春末膝腫如桃不可屈伸診其脈左弦大頗實寸澀甚大率皆數知其小便必數而短遂作飲食痰積在太陽陽明治之炒

黃藥一兩生甘草梢犀角屑蒼朮鹽炒各三錢川芎二錢陳皮牛膝木通芍藥各五錢遇暄熱加條芩三

錢爲細末每三錢重與生薑自然汁同研細多少以水盪起煎令沸帶熱食前飲之一晝夜四次與至半月後數脈漸減痛漸輕去犀角加牛膝敗龜板半兩當歸半兩如前服又與半月腫漸減食漸進不惡寒唯脚膝痠軟未能久立久行乃於前方中去蒼朮黃芩時當夏熱加炒黃藥至一兩半予依本方內加牛膝春夏用莖葉冬用根杵取汁用之效尤速須斷酒肉濕麪胡椒當仲夏加生地黃半兩冬加茱萸桂枝不月而愈

有人嗜酒日須五七十杯後患脚氣甚危或教以巴戟半兩糯米同炒米微轉色不用米大黃一兩剉炒

同爲末熟蜜爲丸溫水下五十九仍禁酒遂愈薛己醫按曰文選姚海山中暑頭痛發熱氣高而喘肢體倦怠兩手麻木余謂熱傷元氣用人參益氣湯頓安又用補中益氣湯加麥門五味而痊

舉人于尚之素腎虛積勞足痿不能步履後舌瘡不能言面色黧黑余謂腎氣虛寒不能運及所發用地黃飲子治之而愈後不慎調攝而復作或用牛黃清心丸之類發熱痰甚誠似中風用祛風化痰之類小便祕澀口舌乾燥仍用前飲及加減八味丸漸愈又用補中益氣湯而痊

一男子元氣素弱或頭目眩運或肢體倦熱仲夏因勞役飲食不時兩手麻木肢體倦怠余以爲暑熱傷元氣用人參益氣湯而愈

知州韓廷儀先患風證用疏風化痰養血之藥而痊

其腿膝骨內發熱作痛服十味固本丸天麻丸益甚兩尺脈數而無力余以爲腎水虛不能生肝木虛火

內動而作非風邪所致也不信又服羌活愈風丹之類四肢痿軟偏身麻木痰涎上湧神思不清余曰皆脾氣虧損不能榮養周身又不能攝涎歸源先用六君子加芎歸木香數劑壯其脾氣以攝涎歸源又以八珍湯數劑以助五臟生化之氣以榮養周身而諸證漸愈乃朝以補中益氣湯培養脾肺夕以六味地黃丸滋補肝腎如此三月餘而安

斬閣老夫人先曾脅脹痛後四肢不收自汗如水小便自遺大便不實口緊目瞓飲食頗進十餘日或以爲中臟公甚憂余曰非也若風旣中臟真氣旣脫惡證卽見禍在反掌焉能延之乃候其色面目俱赤而或青診其脈左三部洪數惟肝尤甚余曰曾乳脹痛

肝經血虛肝氣否塞也四肢不收肝經血虛不能養筋也自汗不止肝經風熱津液妄泄也小便自遺肝經熱甚陰挺失職也大便不實肝木熾盛克脾土也遂用犀角散四劑諸證頓愈又用加味道遙散調理而安後因鬱怒前證復作兼發熱嘔吐飲食少思月經不止此木盛尅土而脾不能攝血也用加味歸脾湯爲主佐以逍遙散調補肝脾之氣清和肝脾之血而愈後每遇怒或睡中手足搐搦復用前藥卽愈

一婦人素經水過期因勞怒四肢不能屈曲名曰癰疽此血虛而風熱所乘先用八珍湯加鈎藤鉤柴胡漸愈更佐以加味逍遙散調理而痊

冢宰劉紫岩因勞下體軟痛發熱痰盛用清燥湯入竹瀝薑汁服之熱痛減半再劑而全愈

吾師僉憲高如齋自大同回謂余曰吾成風病矣兩腿逸則痿軟而無力勞則作痛如鐵刺脈洪數而有

力余告之曰此肝腎陰虛火盛而致痿軟無力真病之形作痛如錐邪火之象也用壯水益腎之劑而愈先生曰向寓宦邸皆以爲風恨無醫藥若服風劑豈其然哉乃吾之幸也竊謂前證往往以爲風疾輒用發散而促其危者多矣

一婦人素血虛因大勞兩足發熱晡熱月經過期或用四物芩連飲食少思胃痞吐痰用二陳枳實黃連大便不實吐痰無度足跟作痛余曰足熱晡熱月經過期乃肝脾血虛也會痞吐痰飲食少思脾胃氣虛也蓋胃爲五臟之根本胃氣一虛諸病悉至先用補中益氣加茯苓半夏脾胃漸健乃佐以六味丸以補脾腎不兩月而痊

一男子足痿軟日晡熱余曰此足三陰虛當用六味滋腎二丸補之一婦人腿足無力勞則倦怠余曰四肢者土也此屬脾虛當用補中益氣及還少丹主之俱不從余言各執搜風天麻二丸并愈風丹而殞

余素性愛坐觀書久則倦怠必服補中益氣加麥門五味酒炒黑黃蘖少許方覺精神清妥否則夜間少寐足內痠熱若再良久不寐腿內亦然且兼腿內筋似有抽縮意致兩腿左右頻移展轉不安必至倦極方寐此勞傷元氣陰火乘虛下注丁酉五十一年齒縫中有如物塞作脹不安甚則口舌如有瘡然日晡益甚若睡良久或服前藥始安至辛丑時五十有五晝間齒縫中作脹服補中益氣一劑夜間得寐至壬寅有內難之變日間雖服前劑夜間齒縫亦脹每至午前諸齒并肢體方得稍健午後仍脹觀此可知血氣日衰治法不同

一儒者四時喜極熱飲食或吞酸噯腐或大便不實足指縫濕痒此脾胃虛寒下陷用六君子加薑桂治之而愈稍爲失宜諸疾仍作用前藥更加附子錢許數劑不再發

一男子形體倦怠飲食適可足指縫濕痒行坐久則重墜此脾胃氣虛而下陷用補中益氣加茯苓半夏熟睡良久四劑稍安又用八珍湯調補而愈

一儒者雖盛暑喜燃火四肢常欲沸湯漬之面赤吐痰一似實火吐甚宿食亦出惟食椒薑之物方快余謂食入反出乃脾胃虛寒用八味丸及十全大補加炮薑漸愈不月平復

一儒者善飲便滑溺滯食減胃滿腿足漸腫證屬脾胃虛寒用加減金匱腎氣丸食進腫消更用八味丸胃強脾健而愈

侍御譚希曾咳嗽吐痰手足時冷余以爲肺脾虛寒用補中益氣加炮薑而愈

閻老梁厚齋氣短有痰小便赤濇足跟作痛尺脈浮大按之則濇此腎虛而痰飲也用四物送六味丸不月而康仲景先生云氣虛有飲用腎氣丸補而逐之誠開後學之矇暗濟無窮之天札腎氣丸卽六味丸也

一儒者患夢遺脚跟作痛口乾作渴大便乾燥午後熱甚用補中益氣湯加芍藥元參并加減八味丸而愈

通府黃廷用飲食起居失宜兩足發熱口乾吐痰自用二陳四物益甚兩尺數而無力余曰此腎虛之證也不信仍服前藥足跟熱痒以爲瘡毒又服導濕之劑赤腫大熱外用敷藥破而出水久而不愈及用追毒丹瘡突如桃始信余言滋其化源半載得瘥

儒者章立之左股作痛用清熱滲濕之藥色赤腫脹痛連腰脅腿足無力余以爲足三陰虛用補中益氣六味地黃兩月餘元氣漸復諸證漸退喜其慎疾年許而痊

又用四物芩連枳實之類智膈痞滿飲食少思汗出如水再用二陳芩連黃蘖知母麥門五味言語譖妄兩手舉拂余謂汗多亡陽神無所依用參芪各五錢歸朮各三錢遠志茯神酸棗仁炙甘草各一錢服之熟睡良久四劑稍安又用八珍湯調補而愈

一儒者因累婚腿腳軟痛面黑食減惡寒足腫小腹脹痛上氣痰喘余以爲少陰虧損陽氣虛寒之證用八味丸料煎服諸證頓除又服丸劑半年元氣漸充形體如故

又用四物芩連枳實之類智膈痞滿飲食少思汗出如水再用二陳芩連黃蘖知母麥門五味言語譖妄兩手舉拂余謂汗多亡陽神無所依用參芪各五錢歸朮各三錢遠志茯神酸棗仁炙甘草各一錢服之熟睡良久四劑稍安又用八珍湯調補而愈

一儒者因累婚腿腳軟痛面黑食減惡寒足腫小腹脹痛上氣痰喘余以爲少陰虧損陽氣虛寒之證用八味丸料煎服諸證頓除又服丸劑半年元氣漸充形體如故

劑以致誤人多矣

一男子素遺精脚跟作痛口乾作渴大便乾燥午後熱甚用補中益氣加芍藥元參及六味丸而愈

大尹王汝鄰兩足發熱吐痰如湧左尺數而無力余謂足三陰虛彼反服四物二陳黃藥知母之類喉舌作痛又服清熱敗毒之劑其舌如赤桃脈洪數而無力此肺復傷腎經虧甚虛火上炎水泛而爲痰也當滋化源以生腎木遂用補中益氣湯六味地黃丸而痊

閣老靳介庵脚指縫作痒出水腫焮脚面敷止痒之藥不應服除濕之劑益甚余以爲陰虛濕熱下注用六味地黃丸補中益氣湯而愈

大叅李北溪左足赤腫作痛此足三陽經濕熱下注先用隔蒜灸活命飲一劑其痛頓止灸患處出水赤腫頓消次用托裏敗毒散四劑灸患處出膿而愈儒者楊舉元患脚發微腫痛微赤焮此足三陰經陰虛濕熱下注用隔蒜灸托裏散而起發用十全大補湯而腫成又與加減八味丸料百劑而斂

一儒者患脚發腫硬色白兩月餘矣此足三陰經虧損爲外寒所侵用大防風湯及十全大補兼服而消後瘡不利飲食勞倦前證復作盜汗內熱飲食不化便滑肌瘦此脾土虛寒而命門火不能相生用八味丸益氣湯百餘劑喜其年壯得愈

一男子脚心發熱作渴引飲或用四物芩連黃藥知母輩腹痛作嘔煩熱大渴此足三陰虧損前藥復傷脾胃也先用六君加炮薑數劑而脾胃醒再用補中益氣加茯苓半夏而脾胃健乃以加減八味丸兼服

半載而愈

一儒者腳心發熱作痒以滾湯浸漬潰而出水肌體骨立作渴吐痰此脾胃虛而水泛爲痰也服益氣湯六味丸年餘元氣復而諸證愈

少宗伯顧東江面黧作渴余曰此腎經虧損當滋化源以杜後患彼雖然之而終不服次年九月內左足面疽色黯不痛脚腿沉重用隔蒜灸三十餘壯足腿卽輕瘡出血水數日而消瘡色仍黯時公將北行賀萬壽余診之曰脾脈衰憊陽氣虛極不宜遠行公曰余得夢屢驗向夢羣仙待我此壽徵也至河間驛聚仙堂病篤歎曰立齋豈能留我果卒於此亦異數也

一人足指患脫疽焮痛色赤發熱隔蒜灸之更以人參敗毒散去桔梗加金銀花白芷大黃二劑痛止又以十宣散去桔梗官桂加天花粉金銀花數劑而痊一人年踰四十左足大指赤腫焮痛此脾經積毒下注而然名曰脫疽喜色赤而腫以人參敗毒散去人參桔梗加金銀花白芷大黃二劑更以金銀花甘草節苦蕘四劑頓退再以十宣散去桔梗官桂加金銀花防己數劑愈

一人足指患脫疽色紫赤不痛隔蒜灸五十餘壯尚不痛又明灸百壯始痛更投仙方活命飲四劑乃以托裏藥潰脫而愈

一膏梁人年逾五十亦患脫疽色紫黑脚焮腫孫真人曰脫疽之證急斬去之毒延腹必不治色黑不痛者亦不治喜其飲食如故動息自寧爲瘡瘍之善證也尚可治遂以連翹敗毒散六劑更以金銀花甘草

節苦蕘二十餘劑患指潰脫更以芎歸生地連翹金銀花白芷二十餘劑而愈次年忽發渴子治以加減八味丸不聽服生津等藥愈甚服八味丸而止

一芻蕘左足指患一泡麻木色赤次日指黑五日連足黑冷不知疼痛脈沉細此脾胃受毒所致進飛龍奪命丹一服翌日令割去足上死黑肉割後骨始痛可救治以十全大補湯而愈蓋死肉乃毒氣盛而拒截榮氣所致况至陰之下血氣難達經云風淫末疾是也向若攻伐之則邪氣乘虛上侵必不救也

一人足指患脫疽色黑不痛令明灸三十餘壯而痛喜飲食如常予謂急割去之速服補劑彼不信果延上遂致不救

一人足指患脫疽色赤焮痛作渴隔蒜灸數壯以仙方活命飲三劑而潰更服托裏藥及加減八味丸潰脫而愈

一婦人年踰四十近環跳穴生一毒尺脈沉緊腿不能伸經曰脾寒移於肝癰腫筋掣夫脾主肉肝主筋肉溫則筋舒肉冷則筋急遂與乳香定痛丸治之少愈更以助胃壯氣血藥二十餘劑而消王汝道膝腿赤腫筋骨疼痛服十宣散不應診其脈沉細予以五積散二劑而痛止更以十宣散去桔梗加牛膝杜仲三十餘劑膿潰而愈此寒氣之腫八風之變也

一男子足指患脫疽大痛色赤而腫令隔蒜灸至痛止以人參敗毒散去桔梗加金銀花白芷大黃而潰更以仙方活命飲而痊此證形勢雖小其惡甚大須隔蒜灸之不痛者宜明灸之庶得少殺其毒

一男子脚背患脫疽赤腫作痛令隔蒜灸三十餘壯痛止以仙方活命飲四劑而潰更以托裏消毒藥而愈

一男子足指患脫疽色赤焮痛作渴隔蒜灸數壯服仙方活命飲三劑而潰更服托裏藥及加減八味丸潰脫而愈

一男子脚背患脫疽色黯而不腫痛煩躁大渴尺脈大而濇此精氣已絕不治後果然

一婦修甲傷次指成膿不潰焮痛至手誤敷冷藥以致通腕焮腫微嘔少食彼以爲毒氣內攻而然予診其脈沉細此痛傷胃氣而然也遂刺之服六君子湯加藿香當歸食進更以八珍湯加黃芪白芷桔梗月餘而愈

一幼女因凍傷兩足至春發潰指俱壞遂去之服以大補藥而愈

一女患嵌甲傷指年餘不愈日出膿數滴予謂足大指乃肝脾二經發源之所宜灸患處使瘀肉去陽氣至瘡口自合否則不治彼忽之不早治後變勞證而歿蓋至陰之下血氣難到女人患此多因紮縛致血脈不通或被風邪所襲則無血氣榮養遂成死肉惟當壯脾胃行經絡生血氣則愈有成破傷風以致牙關緊急口眼喎斜者先與以玉真散一二服後投以生血通經之劑則可

一男子修傷足指色黑不痛而欲脫余曰此因陽氣虛不能運達於患處也急去之速服補劑以壯元氣否則死肉延足必不救矣不信果黑爛上脰而死大抵手足氣血罕到之地或生瘡或傷損若戕其元氣

邪氣愈甚潰爛延上必死不潰而色黯者亦死若骨斷筋皮尚連者急剪去之

趙子固母劉氏年六十左足面一瘡下連大指上延外踝以致臘骨每歲輒數發必兼旬累月昏暮痒甚抓搔移時出血如泉流呻吟痛楚始不可忍夜分卽漸已明日復然每一更藥則瘡轉大而劇百試不驗如是二十餘年淳熙甲辰仲冬之末先生爲大府丞一夕母病大作相對悲泣無計困極就睡夢四神僧默坐一室旁有一長榻子固亦坐因而發嘆一僧問其故子固答之以實僧云可服牛黃金虎丹又一僧云硃砂亦可服旣覺頗驚異試取藥半粒強服之良久大痛舉家相泣且悔俄而下礮魂物如鐵石者數升是夕瘡但微痒不痛而無血數日成痂自此遂愈其硃砂之說竟不復試先生因圖僧像如所夢者而記其事金虎丹出和劑局方本治中風痰涎壅塞所用牛黃龍腦膩粉金箔之類皆非老人所宜今乃取奇效意熱積臟腑而發於皮膚歲久根深未易洗滌故假涼劑以攻之不可以常論神僧之夢蓋孝感云

大尹陳汝鄰兩腿痠軟或赤或白足跟患腫或痛或痒後痛而或如無皮或如皺裂日晡至夜脹痛焮熱用補中益氣湯加八味丸料補其肝腎而愈

一男子足跟作痛熱渴體倦小便如淋誤用敗毒散致頭痛惡寒欲嘔不食吐痰咳嗽此足三陰虧損而藥復傷余用十全大補湯加減八味丸各五十餘劑而愈

後足跟作痛或用清熱除濕之劑更加發腫又服敗毒之藥焮赤痛甚恪用祛毒清熱潰裂翻張狀如赤櫻熱痛如錐內熱晡熱此因足三陰虧損朝用十全大補湯夕用加減八味丸外敷當歸膏兩月餘而愈其服消毒等藥而歿者不能枚舉

一男子亦患足跟瘡服消毒散搽追蝕藥虛證疊出其形體骨立自分必死余用十全大補湯加山茱萸山藥兩月餘而愈

朱佐向因失足劃然有聲坐立久則左足麻木雖夏月足寒如冰嘉靖己亥夏月因醉睡覺而飲水復睡遂覺右腹痞結以手摩之腹間漉漉有聲熱摩則氣泄而止每每加劇飲食稍多則作痛瀉求治於醫令服枳术丸固守無效甲辰歲求治於予曰此非脾胃病乃命門火衰不能生土虛寒使之然也若專主脾胃誤矣可服八味丸則愈敬服之果驗蓋八味丸有附子醫家罔敢輕用夫附子斬關奪旗回生起死非良將莫能用

楊錦衣脚跟生毒如豆許痛甚狀似傷寒予謂獵人被兔咬脚跟成瘡淫蝕爲終身之疾若人脚跟患瘡亦終不愈因名兔齧也遂以還少丹內塞散治之稍可次因納寵作痛反服攻毒藥致血氣愈弱腿膝痿軟而死蓋足跟乃二蹠發源之處腎經所由之地瘡口不合則蹠氣不能發生腎氣由此而泄故爲終身之疾况彼瘡先得於虛復不知戒雖大補氣血猶恐不及况服攻毒暴悍之藥以戕賊之乎

此足三陰虧損防患疽不信反服清熱化痰之藥更

加晡熱頭運又服四物黃藥知母日晡熱甚飲食漸少脚小面發疽余用補中益氣六味地黃丸百餘服

而愈其不信患疽以致不起者多矣

一婦人經候不調發熱晡熱曾膈不利飲食少思服

清熱寬中消導之劑前證益甚更兼肢體痠痛服除

濕化痰等藥經候兩三月一至服通經降火之劑足

跟足指作痛其熱如炙余以爲足三陰虧損用補中

益氣六味地黃丸兩月諸證漸退又用前湯并八珍

湯兩月而康

一婦人足跟患腫兩腿瘦軟或赤或白或痛或痒或如無皮或如皴裂日晡至夜脹痛焮熱此屬足三陰虛損用加減八味丸及逍遙散加熟地川芎百餘劑

而愈

一婦人勞則足跟熱痛余以爲足三陰虛用八珍而痊後偏身瘙痒誤服風藥發熱抽搐肝脈洪數此肝家血虛火盛而生風以天竺膽星爲丸用四物麥門

五味芩連炙甘草山梔柴胡煎送下而愈

一婦人兩足發熱足跟作痛日晡熱甚余以爲肝腎

血虛用加味逍遙散六味丸五十餘劑諸證悉愈

新都楊太僕年踰四十左足大指赤腫焮痛此脾經

積毒下注而然名曰脫疽也喜色赤而痛以人參敗

毒散去人參桔梗加金銀花白芷大黃二劑更以苦

棗金銀花甘草節四劑頓退再以十宣散去桔梗官桂加金銀花防己數劑而愈

韓判官亦患脫疽色紫赤不痛以隔蒜灸至五十餘壯尚不知痛又明灸百壯方知乃以敗毒散加金銀

花白芷數劑而愈

一婦人臂痛筋攣不能伸屈遇寒則劇脈緊細正陳良甫所謂肝氣虛爲風寒流於血脉經絡搏於筋筋

不榮則乾急而爲痛先以舒筋湯更以四物湯加牡丹皮澤蘭白朮治之而痊亦有臂痛不能舉或轉左

右作痛由中脘伏痰脾氣滯而不行宜茯苓丸或控涎丹治之

胡縣丞遍身走痛兩月後左腳面結腫未幾腿股又患一塊脈輕診則浮重診遲緩此氣血不足腠理不密寒邪襲虛而然以加減小續命湯四劑及獨活寄

生湯數劑疼痛頓去更以托裏藥倍加參芪歸朮百貼而愈

劉生手臂結核如粟延至頸項狀如瘰疬此風濕流注亦以前藥治之而愈

一婦人兩腿腕紫黯寸許搔破出水或用祛風砭血年餘漸開如掌許乃服草烏等藥遍身搔痒時出血水內熱體倦飲食無味月經三月一至脈洪而數按之則濇此燥劑愈傷脾血也先以補中益氣湯加芍藥川芎五味十餘劑乃與加味逍遙散加熟地鈞藤鈎二十餘劑再用歸脾湯加川芎熟地黃治之而不

發

有僧股內患腫一塊不痛不潰治以托裏藥二十餘劑膿成刺之作痛予謂腫而潰潰而反痛此氣血虛甚也宜峻補之彼云痛無補法予謂正氣不足不可不補補之則氣化而痛自除遂以參芪歸朮熟地黃治之兩月餘而平大凡瘡瘍先發爲腫氣血鬱積蒸肉爲膿故多痛膿潰之後腫退肌寬痛必漸減而痛愈盛者此氣血不足也亦丹溪河間虛甚之說

一人股外側患癰漫腫大痛以內托黃芪湯酒煎一劑少可更以托裏散數劑潰之而愈

一人年踰二十稟弱左腿外側患毒三月方潰膿水清稀肌肉不生以十全大補湯加牛膝二十餘劑漸愈更以豆豉餅灸月餘而痊

一人男子素有脚氣脅下作痛發熱頭運嘔吐腿痺不仁服消毒護心等藥不應左關脈緊右關脈弦此亦

甚余謂肝經血虛火內動復傷其血而瘡甚耳先用柴胡清肝散數劑又用四物山梔子治之諸證漸愈如絲此陽氣微也以四君子加炮附子一錢畏寒少止又四劑而止以六君子加桂數劑飲食頓進乃以

湯二劑稍愈又二劑而消

一人腿內患癰漫腫作痛四肢厥咽喉塞發寒熱諸

治不應乃邪鬱經絡而然也用五香連翹湯一劑諸證少退又服大便行二次諸證悉退而愈

丁蘭年二十餘股內患毒日久欲求內消診脈滑數知膿已成因氣血虛不潰遂刺之膿出作痛用八珍

湯稍可但膿水清稀用十全大補湯加炮附子五分服數劑漸愈仍服十全大補湯二十餘劑而痊丹溪云膿出反痛者虛也河間亦云

有僧股內患腫一塊不痛不潰治以托裏藥二十餘劑膿成刺之作痛予謂腫而潰潰而反痛此氣血虛

治之兩月餘而平大凡瘡瘍先發爲腫氣血鬱積蒸肉爲膿故多痛膿潰之後腫退肌寬痛必漸減而痛愈盛者此氣血不足也亦丹溪河間虛甚之說

一人股外側患癰漫腫大痛以內托黃芪湯酒煎一劑少可更以托裏散數劑潰之而愈

一人年踰二十稟弱左腿外側患毒三月方潰膿水清稀肌肉不生以十全大補湯加牛膝二十餘劑漸愈更以豆豉餅灸月餘而痊

一人男子素有脚氣脅下作痛發熱頭運嘔吐腿痺不仁服消毒護心等藥不應左關脈緊右關脈弦此亦

甚余謂肝經血虛火內動復傷其血而瘡甚耳先用柴胡清肝散數劑又用四物山梔子治之諸證漸愈如絲此陽氣微也以四君子加炮附子一錢畏寒少止又四劑而止以六君子加桂數劑飲食頓進乃以

十全大補湯及灸附子餅兩月愈  
一老人腿癰膿自潰忽發昏瞀脈細而微此氣血虛極也以大補之劑而甦

一人腿癰兼筋攀痛脈弦緊用五積散加黃藥柴胡蒼朮而痊

一婦左腿痛不能伸脈弦緊按之則濇以五積散二劑痛少止又二劑而止以神應養真而愈以脈弦緊濇屬寒故用五積散辛熱以散之

一人右腿赤腫焮痛診其脈沉數用當歸拈痛湯四支反痛乃濕毒壅遏又况下部藥力難達非藥不對證遂砭患處去毒血仍用前藥一劑頓減又四劑而消

一人年踰五十冬患腿癰脈數煩躁飲冷便祕腫痛焮甚此熱淫於內也宜用苦寒之藥投清涼飲倍加黃芩其熱頓退更以四物湯加黃芩而愈

一人年三十連得憂患作勞好色左腿外側紅腫如粟醫以大府實與承氣兩貼下之又一醫與大黃硃砂血竭三貼而脈大虛後果死此厥陰多氣少血故也

一人腿癰成鍼之出膿二椀許飲托裏藥一劑大發熱更用聖愈湯二劑而止翌日惡寒不食脈細如絲以人參一兩熟附三片薑棗煎服而愈但食少不寐更以內補黃芪湯而平

一人腿腫發熱惡寒以補中益氣湯治之彼以爲緩乃服芩連等藥熱愈盛復請治予以人參養榮湯二十餘劑而漬更以參芪歸木炙甘草肉桂月餘而斂夫火之爲病當分虛實芩連苦寒能鴻心肺有餘之

火若老弱或飲食勞倦而發者此爲不足當以甘溫之劑治之未嘗有實熱而畏寒虛熱而喜寒者此其驗

陳監生年踰三十左腿微腫而隱痛雖日久肉色如故不思飲食東垣云瘡瘍之證腫下而堅者發於筋骨此附骨疽也乃真氣虛濕氣襲於肉理而然蓋諸腫皆稟於胃食少則胃弱法當助胃壯氣遂以六君子湯加藿香當歸數劑飲食漸進更以十全大補湯而愈

一人遍身走痛兩月後在脚面結腫未幾腿股又患一塊脈輕診則浮重診浮緩此氣血不足腠理不密寒邪襲虛而然以加減小續命湯四劑及獨活寄生湯數劑疼痛頓去更以托裏藥倍加參芪歸木百貼而愈

南司馬王荆山腿腫作痛寒熱發渴飲食如常脈洪數而有力此足三陽經濕熱壅滯用檳蘇敗毒散一大黃等藥右腿股腫肉色如故頭痛惡寒喘渴發熱脈洪大而無力此勞傷元氣藥損胃氣而然耳用補中益氣湯四劑又用十全大補湯數劑喜其年少而愈

鴻臚翟少溪兩腫生瘡漸至遍身發熱吐痰口燥咽乾盜汗心煩溺赤足熱日晡益甚形體日瘦此腎經虛火也用六味丸不月諸證悉退三月元氣平復

一男子左腿腫肉色如故寒熱惡心飲食少思此脾氣不足而爲外邪所感也用六君加藿香桔梗川芎而寒熱止又用補中益氣湯而腫痛消

陳湖陸懋誠素因陰虛過飲入房發熱腿痛似瘻瘡用發表之劑兩腿腫黯熱氣如霧欲發瘡脈皆洪數兩尺尤大余曰屬足三陰虛酒濕所乘元氣損而邪益甚耳用十全大補加山藥山茱萸附子一劑脈證頓退却去附子又二劑全愈

一男子入房後患兩腿腫硬二便不通余謂腎開竅壯而形體健

一男子入房後患兩腿腫硬二便不通余謂腎開竅壯而形體健

膝而二便利用補中益氣湯而腫硬消喜其年少得生

一上舍腿痛如錐肉色如故面黃懶食痛甚作嘔此痛傷胃也用六君子以壯其脾胃用十全大補以助其腫而鍼之更用前湯倍加參芪歸麥門五味遠志貝母而瘡斂

一男子因負重飲食失節腎間作痛誤認爲瘡毒服大黃等藥右腿股腫肉色如故頭痛惡寒喘渴發熱脈洪大而無力此勞傷元氣藥損胃氣而然耳用補中益氣湯四劑又用十全大補湯數劑喜其年少而愈

鴻臚翟少溪兩腫生瘡漸至遍身發熱吐痰口燥咽乾盜汗心煩溺赤足熱日晡益甚形體日瘦此腎經虛火也用六味丸不月諸證悉退三月元氣平復

一男子左腿腫肉色如故寒熱惡心飲食少思此脾氣不足而爲外邪所感也用六君加藿香桔梗川芎而寒熱止又用補中益氣湯而腫痛消

陳湖陸懋誠素因陰虛過飲入房發熱腿痛似瘻瘡用發表之劑兩腿腫黯熱氣如霧欲發瘡脈皆洪數兩尺尤大余曰屬足三陰虛酒濕所乘元氣損而邪益甚耳用十全大補加山藥山茱萸附子一劑脈證頓退却去附子又二劑全愈



四肢門十一

醫案二

藝術典第二百十九卷

醫部彙考一百九十九

四肢門十一

醫案二

薛己醫案欽天薛循齋年六十一兩臍患風瘡膿水

淋漓發熱吐痰四年此腎臟風也與六味丸四生散而瘥年餘復作延及遍身日晡益甚痰渴盜汗脣舌生瘡兩日昏亦皆腎經虛火水汎爲痰用加減八味丸而愈三年後小便淋漓莖中濤痛此陰痿思色精不出而內敗用前丸及補中益氣加麥門五味而愈

州守張天澤左膝腫痛晝夜痛甚飲食少思時欲作嘔頭運痰壅塞日晡益倦此脾肺氣虛用葱熨法及六君加炮薑諸證頓退飲食少進用補中益氣加蔓荆子頭目清爽間與大防風湯十餘劑又用補中益氣三十餘劑而消

通府劉國威先筋攀骨痛右膝漫腫用化痰消毒之劑腫痛益甚食少體倦加祛風消毒等藥寒熱作嘔大便不實用一陳除濕之類腫起色赤內痛如錐余

診其脈滑數而無力此膿已成元氣虛而不能潰也也用六味丸爲主佐以八珍湯加牛膝杜仲間以補中益氣湯三月餘而消

一儒者腿筋弛張月餘兩膝腫痛此陰虛濕熱所乘膝風也用大防風湯二劑已退彼惑於附子有毒乃服治瘡之藥日漸消瘦虛證漸至復求治余曰倦怠消瘦脾胃衰而不能營運也小便不禁膀胱虛而不能約制也燥熱虛痞胃氣弱而不能化也恍惚健忘精神失而憒亂也惡證蜂集余辭之後果歿此證多患於不足之人故以加減小續命大防風二湯有效若用攻毒之藥必悞

一婦膝腫痛遇寒痛益甚月餘諸藥不應脈弦緊此寒邪深伏於內也用大防風湯與火龍膏而消

一男子左膝腫大三月不潰予謂體虛之人風邪襲於骨節使氣滯而不行故膝愈大而腿愈細名曰鶴膝風遂以大防風湯三十餘劑而消

張上舍患鶴膝風伏枕半載流膿三月云初服大防風湯去附子將潰服十宣散今用十全大補湯去肉桂俱不應予視脈證甚弱以十全大補湯每貼加熟附子一錢服三十餘劑少愈乃去附子五分服至三十餘劑將愈却去附子更三十餘劑而瘻夫立方之義各有所宜體氣虛弱邪入骨骼遏絕隧道非用附桂之辛溫開散關節腠理之寒邪通暢隧道經絡之氣血決不能愈且本草云附子治寒濕之聖藥桂通

血脈消瘀血堅骨節治風痹骨攀脚軟宣導諸藥十全大補湯以治前證不但不可去桂亦不可不加附子無此二味何以行參芪之功健芎歸之性而補助血氣使之宣通經絡扶大虛之證以收必捷之效哉况前證在骨節之間關鍵之地治之不速使血氣循環至此鬱而爲膿從此而泄氣血瀝盡無生之理亦有秋夏露臥爲寒折之怫熱內作遂成附骨疽有賊風搏於肢節痛徹於骨遇寒尤甚以熱熨之少減尤當用大防風湯更以蒜搗爛攤患處用艾鋪蒜上燒之蒜壞易之皮膚破無妨若經久不消及陰生陽潰而出水必致偏枯或爲漏證宜服內塞散及附子灸之或脈大發渴不治以其真氣虛而邪氣實也

居庸關王揮使臂腫一塊不痛不赤唯脈弱懶食時嘔以六君子湯加藿香酒炒芍藥治之嘔止食進再以八珍湯二十餘劑膿成刺之又以十全大補而愈次年傷寒後此臂仍腫微痛乃傷寒餘毒也然無表證但虛弱先用十宣散四劑取參芪歸芎扶助元氣防風桔梗白芷厚朴行散腫結肉桂引經破血腫退三四再以八珍湯膿潰而愈至冬臂復作痛因服祛風藥反筋攀痛甚予謂此血虛不能養筋筋虛不能束骨遂以加味十全大補湯百貼而愈

王文遠臂患腫作痛服寒涼藥遂致食少大便不實予以理中丸二服更以六君子湯加砂仁藿香治之再以托裏藥膿潰而愈大凡瘡痛甚者如稟厚有火之類在下加黃藥人肥而瘡作痛者宜用荆防羌獨活之類蓋取其風能勝濕也

一婦人年二十餘飲食後每因怒氣吞酸噯腐或兼脚跟脣腫服越鞠丸等藥不應此脾氣虛濕氣下陷而然也予以六君子湯香附砂仁藿香炮薑數劑少愈更以六君子湯數劑而愈

陳揮使年踰五十冬月腿患癰脈數煩躁引冷便祕腫痛譽甚此熱淫於內也法當以苦寒之藥投以清涼飲倍加黃芩治之其勢頓退更以四物湯加黃芩而痊

張甫北京人年踰三十素怯弱不能食冷臂患一毒脈虛弱予以托裏藥治之而潰但飲食少思或作脹或吞酸日漸羸瘦參苓等藥不應但右尺脈弱此命門火衰不能生土遂以八味丸補土之原飲食漸進而愈又有兩膝痛起以至偏身骨節皆痛婦人類血風男子類軟風此名風濕痹又名歷節宜以附子八物湯加減用之

一婦人患臂癰瘍口紫陷膿清不斂彼以爲毒未盡欲服攻毒之劑予謂瘍瘍之證腫起堅硬膿稠者實也腫下軟慢膿稀者虛也用附子餅灸之及飲十全大補湯百劑始愈

操江都憲張恆山左足次指患疔痛不可忍急隔蒜灸三十餘壯卽能舉步彼欲速愈自敷涼藥遂致血凝肉死毒氣復熾再灸百壯服活命飲出紫血其毒方解脚底通潰腐筋爛肉甚多將愈予考續北上又誤用生肌藥反助其毒使元氣虧損瘍口難斂予回用托裏藥補之喜其稟質且客處至三月餘方瘥表甥居富右手小指患疔或用鍼出血敷以涼藥掌指腫三四倍六脈洪大此真氣奪則虛邪氣勝則實

也先以奪命丹一服活命飲二劑勢稍緩余因他往或又遍刺出血腫延臂腕如大瓠手指腫大數倍不能消潰乃真氣愈虛邪氣愈盛余回用大劑參芪歸木之類及鴻鵠遍手腫勢漸消後大便不實時常泄氣此元氣下陷以補中益氣湯加補骨脂肉豆蔻吳茱萸五味子又以生脈散代茶飲大便漸實手背漸潰又用大補藥五十餘服而愈

鄰人蘇子遇之內左手指患疔麻痺寒熱惡心左半體皆麻脈數不時見余曰凡瘍不宜不痛不可大痛煩悶者不治今作麻痺尤其惡也用奪命丹二服不應又用解毒之劑麻痺始去乃作腫痛余曰勢雖危所喜作痛但毒氣無從而泄欲鍼之適值望日其家但言尻神不從勢愈腫甚余強鍼之諸證頓退又用解毒之劑其瘍全愈

一男子腿外側患癰漫腫大痛以內托黃芪酒煎湯二劑少可更以托裏散數劑潰之而愈

一婦人腿癰久而不愈瘍口紫陷膿水清稀予以爲虛彼不信乃服攻毒之劑虛證蜂起復求治令灸以附子餅服十全大補湯百餘貼而愈凡瘍膿清及不斂或陷下者皆氣血虛極也最宜大補否則成敗證一男子腰脛兼踝脚皆痙攣痛以加味敗毒而愈

一男子腰脛兼踝脚皆痙攣痛以加味敗毒而愈

一婦人兩腿痛脈濇而數此血虛兼濕熱先以蒼朮黃蘖知母龍膽草茯苓防風防己羌活數劑腫痛漸愈又以四物湯加二術黃蘖牛膝木瓜月餘而愈

一男子肢節腫痛脈遲而數此濕熱之證以荆防敗毒散加麻黃二劑痛減半以檳榔敗毒散四劑腫亦消更以四物湯加二術牛膝木瓜數劑而愈

一婦人脚脛腫痛寒熱脈浮數此三陽經濕熱下注爲患在表用加味敗毒散治之不應乃瘀血凝結藥不能及也於患處砭去瘀血仍用前藥二劑頓退以當歸拈痛湯四劑而愈楊大受云脚氣是爲壅疾治當歸拈痛湯四劑而愈楊大受云脚氣是爲壅疾治法宜宣通之使氣不能成壅也壅既成而甚者砭去惡血而去其勢經云蓄則腫熱砭射之後以藥治之一婦人兩腿痛遇寒則筋攣脈弦而緊此寒邪之證

多有此患乃腎乘心水寇火死不旋踵宜急服之一男子腿痛兼筋攣骨痛脈弦緊以大防風湯二劑攀少愈又二劑而腫消但內一處尚作痛脈不弦緊此寒邪已去乃所滯瘀濁之物欲作膿已成矣鍼之用托裏藥數劑腫發起脈滑數乃膿已成矣鍼之用十全大補湯月餘而安

一男子先腿痛後四肢皆痛遊走不定至夜益甚服

除濕敗毒之劑不應診其脈滑而濇此濕痰濁血爲患以二陳湯加蒼朮羌活桃仁紅花牛膝草烏治之而愈凡濕痰濕熱或死血流注關節非辛溫之劑開發腠理流通隧道使氣行血和焉能得愈

一男子腿痛每痛則痰盛或作嘈雜脈滑而數以二陳湯加升麻二木澤瀉羌活南星治之而安

一男子腰脛兼踝脚皆痙攣痛以加味敗毒而愈

一婦人兩腿痛脈濇而數此血虛兼濕熱先以蒼朮黃蘖知母龍膽草茯苓防風防己羌活數劑腫痛漸愈又以四物湯加二術黃蘖牛膝木瓜月餘而愈

一男子肢節腫痛脈遲而數此濕熱之證以荆防敗毒散加麻黃二劑痛減半以檳榔敗毒散四劑腫亦消更以四物湯加二術牛膝木瓜數劑而愈

一婦人脚脛腫痛寒熱脈浮數此三陽經濕熱下注爲患在表用加味敗毒散治之不應乃瘀血凝結藥不能及也於患處砭去瘀血仍用前藥二劑頓退以當歸拈痛湯四劑而愈楊大受云脚氣是爲壅疾治當歸拈痛湯四劑而愈楊大受云脚氣是爲壅疾治法宜宣通之使氣不能成壅也壅既成而甚者砭去惡血而去其勢經云蓄則腫熱砭射之後以藥治之一婦人兩腿痛遇寒則筋攣脈弦而緊此寒邪之證

以五積散對四物湯數劑痛止更以四物湯加木瓜

牛膝枳殼月餘而愈

一男子腿腫筋攣不能動履以交加散二劑而愈

一婦人患腿痛不能屈伸遇風寒痛益甚諸藥不應

甚苦先以活絡丹一丸頓退又服而瘳次年復痛仍

服一丸亦退大半更以獨活寄生湯四劑而愈

一男子素有脚氣又患附骨癰作痛服活絡丹一丸

二證並瘥

一婦人肢節腫痛脛足尤甚時或自汗或頭痛此太

陽經濕熱所致用麻黃左經湯二劑而愈

一婦人患血痔兼腿痠痛似癆此陰血虛不能養於筋而然也宜先養血爲主遂以加味四斤丸治之而愈

一老人筋攣骨痛兩腿無力不能步履以局方換腿丸治之而愈

一婦人筋攣痹縱兩腿無力不能步履以三因勝駿丸治之而愈

九治之而愈

一婦人患腿痛兼足脛攣痛服發散藥愈甚脈弦緊

此腎肝虛弱風濕內侵也以獨活寄生湯治之痛止

更以神應養真丹而弗攣矣

一男子素有腿痛飲食過傷痛益甚倦怠脈弱以六

君子湯加山楂神麴蒼朮芎歸升麻柴胡而愈

一男子每飲食少過會膈痞悶或吞酸兩腿作痛用導引丸二服頓愈更以六君子湯加神麴蒼朮麥芽二十餘劑遂不復作

金臺王時亨年踰四十臂患毒瘍痛作嘔服托裏消毒藥愈甚予以涼膈散二劑頓退更以四物湯加芩

連四劑而消按此所謂腫瘍熱毒攻心而作嘔也

邵黃門子手合骨處患一核半年後潰一小孔如粟

又年餘不合日出清膿數滴或止三四滴面上赤脈

數口乾夜則發熱晝則惡寒行履如故此氣血俱虛

也辭不治月餘後他處相會彼云小兒有不藥之功

矣余曰過火令方爲喜也已而果斃

一男子患腿癰膿已成予鍼之出二椀許飲以托裏藥一劑大發熱更以聖愈湯二劑而止翌日惡寒不食脈細如絲以人參一兩熟附子三片薑棗煎再服

而愈但少食不寐更與內補黃芪湯而平

山西宋琰年踰三十臂患癰潰而不痛膿稀脈弱丹溪云疽潰深而不痛者胃氣大虛而不知痛也東垣

云膿水清稀瘡口不合氣血俱虛也當以大補藥治彼不聽服消毒藥氣血虛甚遂不救丹溪云纔見腫痛參之脈證虛弱便與滋補氣血無虧可保終吉又云潰瘍內外皆虛宜以補接爲主

一女臂患腫潰久不斂寒熱交作五心煩熱飲食少

思月水不通以逍遙散月餘少可更服八珍湯加丹皮香附又月餘經通再加黃芪白薇兩月餘而愈

一人手臂結核如粟延至頸項狀似瘰疬此風濕流

注用加減小續命湯及獨活寄生湯更以托裏藥倍

加參芪歸术百貼而愈按此條有證無脈認作風濕

流注而治當時必有所見也後用補劑百貼而愈是終不離於虛也

一兒三歲臂患毒瘍痛服解毒丸搽神功散而消嘗

治臂毒便閉煩躁服五福化毒丹亦效若膿成急刺

用紙撲蘸麻油紙瘡內以膏藥貼之若兒安靜不必

服藥候有膿取去仍用紙貼

一人臂患疽脈數飲槐花酒一服熱頓退再與金銀

花黃芪甘草十餘服而平槐花治濕熱之功最爲神

速胃寒不宜過劑

尹老家貧形志皆苦自幼癩疝孟冬於手陽明大腸

經分出癩第四日稠膿臂外皆腫痛在手陽明左右

經中其脈俱弦按之洪緩有力此得自八風之變以

脈斷之邪氣在表飲食如常大小便如故腹中和口

知味知不在裏也不惡風寒只熱躁脈不浮知不在

表也表裏既和邪在筋脈之中故曰凝於血脉爲癩

是也癩出身半已上故風從上受因之爲八風之變

而瘡只在經脈之中法當却寒調和經脈中血氣使

無凝滯可愈矣宜以白芷升麻湯按此方舉一身而

言故陽明爲一身之中若以各經言之而陽明亦自

有表裏中三等之劑太陽亦有表裏中之方餘經皆

可以類推也

一人兩臂腫痛服托裏藥日盛予謂腫屬濕痛屬火

此濕熱流注經絡也用人參敗毒散加威靈仙酒黃

芩南星數劑漸愈更以四物湯加蒼朮黃芩桔梗二十餘劑而消按此托裏藥日盛故改作濕熱治也

一男子先患兩臘後及遍身生瘡似疥非疥時或膿

水淋漓兩腿爲甚肢體倦怠作痒煩熱年餘不愈余

作腎經虛火用加減八味丸而痊

奇效良方曰董守約苦脚氣攻注或敷以田螺數枚

槌碎傅兩股上便覺冷氣趨下至足而安蓋螺性能

泌別清濁故能療脚氣之濕熱也

毘陵有姓馬人醫酒宿患腎臟風一足發腫如瓠自

腰以下粗細通爲一律痛不可忍臥欲轉側用兩人挾持方可動或者用以鍼刀決之予用甘鼈散服之至五更初細嚼米飲下至辰巳時下膿如水晶者數升卽時痛止腫退一月尚拄拐而行予再以赤烏散塗貼其膝方愈後十年過毘陵率其子致謝云向脚疾至今不發腎臟風併已失去今健步不苦矣紹興府戒珠寺一僧病數年足不能行服立效丹而愈亨老亦傳此方

一人體充肥腳氣始發頭面渾身肢節微腫皆赤色足脛赤腫痛不可忍不敢扶策手近皮膚其痛轉甚坐而復臥臥而復起晝夜苦楚難以名狀乃北方高寒故多飲酒積久傷脾不能運化飲食下流之所致投以當歸拈痛湯一兩二錢其痛減半再服腫痛悉除止有右手指微赤腫以三棱鍼刺手爪甲端多出黑血赤腫全去不數日因食濕麪肢體覺痛又以枳實半錢大黃酒煨三錢羌活一錢半當歸身一錢水煎溫服利下兩行痛卽止矣

丁酉歲在臨安是時劇暑見吳寬夫用火踏上寘一布囊烘足叩其所以答云某舊有脚氣之疾近得一方用川椒二三斤實於疎布囊中寘火踏上趺足踏椒囊蓋椒氣性熱能辟去寒濕氣言甚有理用之月餘亦漸有效庚子歲在淳安寘夫經過因問其疾云愈之已久乃椒囊之力也不特某用之效傳之數親知皆無恙矣真奇方也壬寅再來臨安適於賓次中選返都司王成之見其用火踏亦有一布囊問之豈非椒乎云又添破開檳榔并熟艾各三分之一且云果是奇妙大抵足膝之病居下屬陰又加寒濕陰益

甚矣血氣爲冷凝結非至熱不可除今用川椒性熱復加以火蒸之自然寒濕俱去信乎處方之妙也醫方考曰唐柳子厚救死方云元和十二年二月得知人家號哭榮陽鄭洵美傳杉木湯服半食頃大乾脚氣夜成瘡絕左脣有塊大如石且死因大寒不下三次氣通塊散病蓋死矣會有救者因得不死恐他人不幸有類予病故以方傳焉

顧安中廣德人久患脚氣筋急腿腫行履不得因至湖州附船船中先有一袋物爲腿疼痛遂作腿閭之袋上微覺不痛及筋寬而不急乃問舟人袋中何物應曰宣瓜自此脚氣頓愈噫藥氣相感且能愈疾則用藥當病者從可知矣

外科正宗曰一男子年近五旬右足小指初生如粟米漸成白泡三日始痛請治頭已腐爛一指紫腫此脫疽也隨用艾火明灸十三壯始大痛乃止又用鍼刺灸頂以蟾酥餅貼灸上膏蓋本指腫上用鍼鍼擊刺七八處發泄毒血用蟾酥錠磨濃塗之腫外以真君妙貼散敷護良肉庶不外侵其時患者脈數身發寒熱惡心體倦先用人參敗毒散解其表證次用黃連內疏湯通其大便而惡心煩熱亦止又以托裏消毒散加金銀花牛膝數服早以八味丸晚用蠟簪丸以解藥毒如此調理三月而愈後人問之用妓者頂髮紮之何也予曰彼之頂髮乃心契之物也以髮靠肉雖疼而不疼彼又如在目前此釋情之意也

一婦人中年肥胖生渴三載右手食指麻痒月餘後節間生一小泡隨後本指漸腫疼脹不堪視之原泡山萸五味麥冬等藥調理月餘而愈此疽若不鍼灸發泄毒氣專假藥力數圍再加峻藥攻利必致傷其元氣能保毒不侵犯得安之理

一客商右足次指生一紫泡痒痛異常次日指甲俱

紫肉黑視之乃肝腎二經之毒彼曰何別也予曰甲乃肝之餘氣甲紫則肝受毒也骨乃腎之餘氣腎傷則骨黑此理甚明彼曰何以致之予曰凡人勞疲筋力傷於肝悞服熱藥傷於腎旁者曰情實有此因彼久居客旅交結私妓情懷最密極力承奉但夜並服興陽細丸期許常至立交戲謔有此二年矣前言正中其病此勞力熱藥傷腎傷筋之實也其病尤險欲辭不治彼哀告客途欲得生返再三求治予又斟酌先取妓者頂髮十餘根燃線纏紮患指盡隨將艾炷安於所禁上面紫色處排勻三處每灸七壯各放蟾酥餅膏蓋次後脹痛相忍不令解此紮髮過夜一指皆黑相量筋骨皮肉俱死仍用利刀順節取脫患指乃冰冷惡物預煎甘草湯浸洗良久候瘀血稍盡以止血散掺之次日灸上紫色不退恐其上延又以神燈照法照之候血散皮綴旋合蟾酥丸料多加海羊研爛敷之早晚二次腫不復作紫色變紅紅色潰瘍外用生肌止痛活血收斂之藥又熬參木地黃膏朝服接補真元午服健脾藥以回胃氣晚用金液丹以解藥毒如此調理三月而愈後人問之用妓者頂髮紮之何也予曰彼之頂髮乃心契之物也以髮靠肉雖疼而不疼彼又如在目前此釋情之意也

延壞人迅速詢問此婦先居富室無嗣每縱膏梁架烘爐炭又兼多服種子熱藥中年喪夫家業盡被嗣

人侵費致久懷憂鬱後與寡母同棲身耽寂寞此先富後貧所願不得又爲失榮證也辭不可治彼婦母子再三哀懇予亦無之奈何乃遵孫真人治法在肉則割在指則切此外無他彼願從之先用參養榮湯隨用軟絹條尺許纏裹黑色盡處好肉節上以漸收緊紮之庶不通行血絡次用利刀放準依節切下將手隨浸甘草溫湯中片時其血不大多其疼亦不大甚患者曰惟心之懼不知指之切下似神力之佑也予曰所嫌者切而不痛此爲氣血筋骨俱死此物雖脫其證未可得愈每以八味丸料加人參麥冬大劑煎服先救腎水次扶脾胃間用金液戊土丹以解藥毒後三日所紮指上漸漸放鬆以通血脈搽貼紅黑二膏生肉止痛次後手背手掌日漸發腫勢惡之甚惟不黑色此內毒已出之故仍用神燈照法兼以猪蹄湯淋洗後又腫上皆出數頭流去膿血不計幾許兩月外方得原腫稍退膿穢稍減又以參木膏人參養榮湯兼服半年外方妥其婦雖活五指失矣一男僕冬月嚴寒主使赤足履地不敢移隨後血水麻木次日十指俱紫又數日全變黑色麻木不痛請視之強用辛熱散寒活血薰洗等藥終至不應後必十指齊脫又延黑脚面骨節一段甚作疼痛彼主恐脫疽也予曰似是而本非後必不妨令患者常用桑木火灸之取其溫暖活血又能解散鬱毒其患漸腐漸脫自不走散內服健脾養血之藥調理外用生肌紅黑二膏培長肌肉百日外愈矣

月後流出臭水方解視之其雙足前半段盡皆黑腐請視之骨肉已死予曰此已壞者不能復活則救將來未壞者可也先煮參粥食之次煎葱湯令彼家侍婦將患足浸入湯內淋洗再換湯浸但腐黑不痛者逐一剪割連續知痛者又以花蕊石散搽之保將壞者復其生已壞者得其脫內服補中益氣湯接其勞外搽生肌玉紅膏長其肉後雖得愈但二足俱致跛躄終身

一男人右足小指縫中初生一點黃粟泡皮肉隨變紫色陰疼不腫常以鍼刺視其形色真脫疽也診其脈細數無力此腎經傷敗證也但患者生平大飲內有正副三人此必精力已竭縱治其功早強辭之後果延至脚面足底皆穿痛徹不已又飲食日少氣血日衰形體自削兩月後百苦而終

醫門法律曰徐嶽生軀盛氣充昔年因食指微傷見血以冷水濯之遂至血凝不散腫潰出膿血數升小筋脫出三節指廢不伸邇來兩足間纔至秋月便覺畏冷重綿蔽之外拊仍熱內揣獨覺其寒近日從踵至膝後筋痛不便遠行雲間老醫令服八味丸深中

庚辰冬於鼎翁公祖園中識先生半面竊見身體重

著步行艱難面色滯晦語言遲緩以爲有虛風卒中之候也因爲過慮辛巳秋召診間細察脾脈緩急不調肺脈勁大然肝木尚平陽氣尚旺是八風之邪未可易中而筋脈掣痛不能安寢者大率風而加之以濕交煽其虛所致以斯知尚可引年而施治何也風者肝之病天之氣也濕者脾之病地之氣也天氣迅疾故發之暴益以地氣之迂緩反有所牽制而不能

暴矣然氣別則病殊而氣交則病合有不可不明辨者病殊者在天氣則風爲百病之長其來微則隨相直中唯體虛之人患始不測焉在地氣則濕爲下體之患其來微則足跗腫大然得所勝亦旋消其來甚則害及皮肉筋脈以漸而上攻亦唯陽虛之人勢始騰越焉兩者一本之天一本之地病各懸殊治亦異法者也病合者天之氣入於筋脈地之氣亦入於筋脈時乎天氣勝則筋脈張而勁焉時乎地氣勝則筋脈蟬而緩焉兩者其源雖異其流則同交相醞結蔓而難圖者也先生房中之風始雖不可知然而所感則微也至若濕之一字既以醇酒厚味而釀之於內又爲炎蒸嵐瘴而襲之於外是以足患日熾雖週身筋脈舒展亦不自如究竟不若足間晝夜掣痛瘡瘍腫潰浸淫無已也夫春時之風也夏時之濕與熱也秋時之燥也三時之氣皆爲先生一身之患者也而一身之患又惟一隅獨當之亦良苦矣設內之風濕熱燥不攘足患其有寧宇乎所可嘉者惟冬月寒水司令勢稍減而醫者不識此意每投壯筋骨之藥酒以驅其濕不知此乃治寒濕之法惟冬月病增者方宜豈以風濕熱濕而倒行逆施寧不重其困耶况乎先生肺脈勁大三四日始一大便雖冬月亦喜形寒飲冷而不常近火何所見其爲寒濕也哉所以孫真人大小竹瀝等方風濕熱燥寒五治之藥具備籠統龐雜後人全不知用若識此義爲去取則神而明之之事矣然則不辨證而用方者幾何而不誤耶錢叔翁形體清瘦平素多火少痰邇年內蘊之熱蒸

濕爲痰及辛已夏秋間濕熱交勝時忽患右足麻木其冷有如冰石蓋熱極似寒如暑月反用冰雹之類醫者以其足跗之冷也不細察其爲熱極似寒悞以下元虛憊悞用桂附河車之屬補之以火濟火以熱益熱繇是腫潰膿水浸淫數月踝骨以下足背指踵廢而不用總爲悞治而至於如此其極耳其理甚明無難於辨若果寒痰下墜不過堅凝不散止耳甚者不過痿痺不仁止耳何至腫而且潰黃水淋漓腐肉穿筋耶彼不知爲醫藥所悞乃委咎於方隅神殺所致豈其然哉此與傷寒壞證熱邪深入經絡而生流注無少異也所用參膏但可穎理元氣而無清解濕熱之藥以佐之是以未顯厥效以元老之官不可以理繁劇設與竹瀝同事人參固其經竹瀝通其絡則甘寒氣味相得益彰矣徐太掖服人參以治虛風悞佐以附子之熱迄今筋脈短縮不便行持亦繇不識甘寒可通經絡也今用參膏後脾氣亦旣大旺健運有加矣此時儻能樽節飲食俾脾中所生之陽氣得顛力以驅痰驅熱則痰熱不留行而足患並可結局乃日食而外加以夜食雖脾氣之旺不爲食所傷然以參力所生之脾氣不用之運痰運熱止用之以運食誠可惜也今者食入亦不易運以助長而反得衰迺至痰飲膠結於胷中爲飽爲悶爲煩咳而痰不應總爲脾失其健不爲胃行津液而飲食反以生痰漸漬充滿肺竅咳不易出雖以治痰爲急然治痰之藥大率耗氣動虛恐痰未出而風先入也唯是確以甘寒之藥杜風消熱潤燥補虛豁痰乃爲合法至於辛

熱之藥斷不可再悞矣醫者明明見此輒用桂附無算想必因膿水易乾認爲辛熱之功而極力以催之結局耳可勝誅哉

受病實有較他人不同者蓋膽之腑原無輸瀉膽之熱他人可移於腦漏沸從鼻竅源源而出亦少殺其熱若小魯則陽分之陽過旺陽分之陰甚衰鬢髮全無直似南方不毛之地熱也極矣肯受膽之移熱乎幸其頭間多汗腦熱暗洩不爲大患乃膽熱既無可宣又繼以酒之熱時之燥熱淫內熾脈見促急幾何不致極憲耶故膽之熱汁滿而溢出於外以漸滲於經絡則身目皆黃爲酒癰之病以其滲而出也可轉驅而納諸膀胱從溺道而消也今獨攻環跳之穴則在膽之本屬無可驅矣且其步履素爲此穴所苦受傷已久氣離血散熱邪瀰漫留連服藥縱多有拒而不納耳何能取效卽欲鍼之此次傷之穴有難於祛瀉者設遇良工如古人輩將何法以處此乎吾更有慮焉有身以後全賴穀氣充養穀氣卽元氣也穀入素少之人又卽藉酒爲元氣今以病而廢飲何所恃爲久世之資耶吾諦思一法先搐腦中黃木出鼻次鍼膽穴之絡腦間者數處務期膽中之熱移從腦鼻而出庶乎環跳穴中結邪漸運而腸胃之枯槁漸回然後以瀉膽熱之藥入酒中每日仍痛飲一醉飲法同而酒性異始得陰行而妙其用蓋其以生平之偏造爲堅壘必藉酒轉爲鄉導乃克有濟也豈清金潤燥與下奪之法能了其局乎兩生蹊躍曰蒙誨治法令人心地開朗請筆之以誌一堂授受之快錄此付渠子令送商顧幼疏孝廉求救小魯竟阻之或以余言爲不然耶

黃鴻軒手臂忽生癰癧漫腫頭痛極莫耐外科醫者咸謂熱毒所致揆之平素淡泊明志寧靜居心絕無

生熱致毒之因究莫識其所起也尊公我兼謂昌善議病盍舍樽俎而一代庖人乎昌曰吾議此證請先生不正之時毒也起居傳染之穢毒也內因者醇酒厚味之熱毒也鬱怒橫決之火毒也治火毒與治諸毒原自天淵蓋火與元氣勢不兩立以寒涼折之則元氣轉滴矣鴻軒於四者總無其因不問知爲胎毒之餘也凡人稟受天地之氣有清濁之不同惟純粹以精之體其福澤壽算俱不可限量然從父母構精而有身未免夾雜慾火於形骸所賴者惟在痘瘡一舉暗將所藏慾火運出軀外復其粹精之恒體如鑛金相似必經紅爐煅煉而查滓與精瑩始分之爲兩吾嘗以此法觀出痘者之眸子七八日後眼開之時黑白分明者精金也赤筋紅膜包裹者混金也至於瞳人模糊神光不現則全非金也鴻軒幼時出痘太多元氣不能充灌又爲雜證所妨臟腑中之火毒雖盡而軀殼間之留滯猶存所以痘癰之發必於手足之委中曲池者則以零星小毒無處可容而潛避於呼吸難到之處耳今之癰癧正當委中之穴其爲痘毒何疑毒伏肘腋之下原無所害但粹精之體微有夾雜是亦寶鑑之纖塵白璧之微類也日者太和元氣充滿周身將十五年前之餘滓盡欲化爲膿血而出他人見之爲毒吾早已卜其爲興者機矣豈有暢於四肢而不發於事業者哉治法外用馬齒莧熬膏敷之速破內用保元湯托之盡出仍以痘癰門藥爲治卽日自當痊愈必不似瘡毒之曠日持久但不識證而以治瘡毒寒涼瀉火諸藥投之適以增楚貽患者耳

就謂外科小恙可無樽俎折衝之人耶如法治之潰出膿水甚多果不用生肌長肉而自愈

## 第二百二十卷目錄

醫部彙考二百

前陰門一

黃帝素問

篇 雜要精微論 終論 热論 風論 陰陽別論 五臟生成 診要  
 脈解篇 痰論 厥論 平人氣象論 大奇論  
論 四時刺逆從論 至真要大論 五常政  
 大論 本神篇 本臟篇

張機金匱要略

陰腫 溫 險病生死 食忌 痘

華佗中藏經

卵縮 驗病生死 痘脈

孫思邈千金方

陰癩 婦精瘡

朱肱活人書

囊縮

費漢卿瘡瘍全書

腎陰 險病 小腸流注 雖食清

劉完素六書

心病 小腸氣 陰瘤 盡病

張從政儒門事親

腫中痛 痘本肝經宜通勿下疳

李杲十書

隱曲不利 論病 論陰瘡

朱震亨心法

病痛 木腎 治法 囊瘡 陰

格致餘論

病氣論

羅天益衛生寶鑑

病 避暑

虞搏醫學正傳

病 痘氣論

戴思恭證治要訣

囊縮 小腸氣 瘡瘍

方賢奇效良方

囊縮 避暑 痘

樓英醫學綱目

運氣爲病

## 藝術典第二百二十卷

醫部彙考二百

前陰門一

黃帝素問

陰陽應象大論

註 人年六十已逾七八之期天癸竭腎氣大衰而陰事痿矣九竅爲水注之氣精水竭而精氣衰則九竅爲之不利也精竭於下水泛於上而涕泣俱出矣

陰陽別論

註 二陽之病發心脾有不得隱曲女子不月其傳爲風消其傳爲息責者死不治

厥陰終者

註 中熱嗌乾善溺心煩甚則舌卷卵上縮而終矣此厥陰經之所敗也

厥陰木火之氣欲絕故中熱嗌乾也肝所生病

厥陰

註 木火之氣欲絕故中熱嗌乾也肝所生病者遺溺肝氣下洩也心煩者包絡之氣上炎也肝者筋之合筋者聚於陰器而脈絡於舌本甚則舌卷囊縮而終矣此厥陰之所敗經氣之所終也

熱論

註 傷寒六日厥陰受之厥陰脈循陰器而絡於肝故煩滿而囊縮十二日厥陰病衰囊縱少腹微下大氣皆去病日已矣

厥陰

註 木火之氣故煩滿脈循陰器而絡於肝故煩滿而囊縮十二日厥陰病衰囊縱少腹微下大氣皆去病日已矣

註 木火之氣故煩滿脈循陰器而絡於肝故煩滿而囊縮十二日厥陰病衰囊縱少腹微下大氣皆去病日已矣

厥陰

註 木火之氣故煩滿脈循陰器而絡於肝故煩滿而囊縮十二日厥陰病衰囊縱少腹微下大氣皆去病日已矣

註 木火之氣故煩滿脈循陰器而絡於肝故煩滿而囊縮十二日厥陰病衰囊縱少腹微下大氣皆去病日已矣

厥陰

註 木火之氣故煩滿脈循陰器而絡於肝故煩滿而囊縮十二日厥陰病衰囊縱少腹微下大氣皆去病日已矣

也此臟腑皆病榮衛不行故經氣終而死也

風論

腎風之狀多汗惡風面癟然浮腫脊痛不能正立其色始隱曲不利脇在肌上其色黑

註 風邪干腎則水氣上升故面癟然浮腫風行則水洩也腎主骨故脊痛不能正立腎主藏精少陰

與陽明會於宗筋風傷腎氣故隱曲不利水氣上升故黑在肌上水乘土也

五臟生成篇

黃脈之至也大而虛有積氣在腹中有厥氣名曰厥

疝女子同法得之疾使四肢汗出當風

註 四肢汗出當風則風濕內乘於脾而爲積氣蓋風木之邪內干脾土濕與陰土同氣相感故留聚而爲積也脾氣不能灌溉於四旁則逆於中而爲厥氣矣名曰厥疝者氣逆而痛也

黑脈之至也上堅而大有積氣在小腹與陰名曰腎

辨得之沐浴清水而臥

註 尺以候腎黑脈之至上堅而大者腎臟有積而腎脈堅大也上堅者堅大在上而不沉也與陰者

小腹而兼於前陰也腎臟寒水主氣亦同氣相感也

脈要精微論

帝曰診得心脈而急此爲何病病形何如岐伯曰病

名心疝少腹當有形也帝曰何以言之岐伯曰心爲牡臟小腸爲之使故曰少腹當有形也

註 諸急爲寒心爲陽臟而畏寒故脈急心爲君主之官而不受邪故脈見於臟而形見於腑也

平人氣象論

寸口脈沉而弱曰寒熱及疝瘕少腹痛

註 寸爲陽沉爲陰寸口脈沉而弱此正氣虛而陽邪直入於裏陰陽相乘故主寒熱陽邪入裏故

又主疝瘕而少腹痛也

註 諸急爲寒故主疝瘕在內

大奇論

腎脈大急沉肝脈大急沉皆爲疝心脈搏滑急爲心

疝肺脈沉搏爲肺疝三陽急爲瘕三陰急爲疝

註 大則爲虛急則爲寒沉爲在下在裏故皆爲疝心疝之有形在少腹其氣上搏於心故心脈搏而滑急也肺脈浮而反沉搏是肺氣逆聚於內而爲肺疝矣瘕假也假物而成形疝字從山艮止高起之象故病三陽之氣者爲瘕三陰之氣者爲疝

脈解篇

厥陰所謂癲疝婦人少腹腫者厥陰者辰也三月陽

中之陰邪在中故爲癲疝少腹腫也

註 厥陰木火主氣故主於三月四月之交三月陽

盛之時而厥陰主氣故爲陽中之陰邪爲陰氣也

厥陰之氣在內而未得盡出故爲癲疝少腹腫也

所謂癲疝者曰陰亦盛而脈脹不通故曰癲

瘕也

註 陰亦盛者厥陰之氣亦盛於外而脈脹不通故癲瘕膿瘍也癲瘕者陰器腫而不得小便也

註 痘論思想無窮所願不得則肝氣傷矣前陰者宗筋

之所聚足厥陰之脈循陰股入毛中過陰器意淫於外則慾火內動入房太甚則宗筋縱弛陰痿白淫乃慾火盛而淫精自出也筋痿者又生於所願不遂而傷肝兼之使內入房之太甚也

陽明者五臟六腑之海主潤宗筋宗筋主束骨而利機關也

註 陽明爲水穀血氣之海五臟六腑皆受氣於陽明故爲臟腑之海宗筋者前陰也前陰者宗筋之所聚太陰陽明之所合也諸筋皆屬於節主束骨而利機關宗筋爲諸筋之會陽明所生之血氣爲之潤養故諸痿獨取於陽明

衝脈者經脈之海也主滲灌谿谷與陽明合於宗筋

註 衝脈起於胞中上循背裏爲經絡之海其浮而外者滲灌於谿谷之間與陽明合於宗筋是以宦者去其宗筋則傷衝任血瀉不復而鬚不生

註 陰陽總宗筋之會會於氣街而陽明爲之長少陰太陰陽明衝任督脈總會於宗筋循腹上行而復會於氣街氣街者腹氣之街在衝脈於脅左右動脈間乃陽明之所主故陽明爲之主也

故陽明虛則宗筋縱

註 陽明爲水穀之海主潤宗筋陽明虛則宗筋縱宗筋縱弛不能束骨而利機關則成痿躄矣故諸

痿獨取陽明

思想無窮所願不得則肝氣傷矣前陰者宗筋

之所聚足厥陰之脈循陰股入毛中過陰器意淫

於外則慾火內動入房太甚則宗筋縱弛陰痿白

淫乃慾火盛而淫精自出也筋痿者又生於所願

不遂而傷肝兼之使內入房之太甚也

前陰者宗筋之所聚太陰陽明之所合也

註宗筋根起於胞中內連於腎臟陰陽二氣生於

胃腑輸於太陰藏於腎臟太陰陽明合聚於宗筋

者中焦之太陰陽明與下焦之少陰太陽中下相

合而會合於前陰之間

厥陰之厥則少腹腫痛腹脹溼洩不利好臥屈膝陰

縮腫脅內熱

註足厥陰之脈內抵少腹挾胃屬肝絡膽故厥則

少腹腫痛而腹脹其下循陰股入毛中環陰器抵

少腹是以溼洩不利陰縮而腫肝主筋膝者筋之

會筋脈厥逆不能濡養筋骨故好臥而屈膝其脈

起於大指叢毛之際上循足脅厥陰木火主氣榮

俞厥逆故脅內腫熱也

玉機真臟論

風者百病之長也弗治脾傳之腎病名曰疝瘕少腹

冤熱而痛出白一名曰蠱

註邪聚下焦故少腹冤熱而痛洩出淫濁也蠱言

陰邪居下而壞事之極

骨空論

任脈爲病男子內結七疝女子帶下瘕聚

註七疝者其病各異其名不同瘕者假血液而時

下汁沫聚者氣逆滯而爲聚積也衝脈之血氣散

於脈外之氣分故病則逆氣裏急

督脈生病從少腹上衝心而痛不得前後爲衝疝

註其脈從少腹直上貫心故衝心而痛繞於前後

二陰之篡間故不得前後而爲衝痛之疝

四時刺逆從論

厥陰滑則病狐疝風少陰滑則病肺風疝太陰滑則病脾風疝陽明滑則病心風疝太陽滑則病腎風疝

註滑者陽氣盛微有熱氣病之謂疝氣盛而生熱

少陽滑則病肝風疝

註滑者陽氣盛微有熱氣病之謂疝氣盛而生熱

則爲疝痛所謂風者熱所生也

至真要大論

太陽在泉寒淫所勝民病少腹控睾引腰脊上衝心

痛血見隘痛領腫

註丑未之歲太陽在泉寒淫於下則膀胱與腎受

之膀胱居於少腹故少腹痛腎主陰器故控引睾

丸太陽之脈挾脊抵腰中絡心故引腰脊腎脈絡

心故上衝心痛心主血而寒氣逼之故血見隘痛

領腫乃小腸經病小腸者心之腑也亦水邪上侮

火臟火腑而然

陽明司天丈夫癲疝婦人少腹腫

註此亦厥陰之病也

癲疝少腹腫皆肝經之病

太陽之復少腹控睾引腰脊上衝心

註此亦厥陰之病也

太陽之勝清發於中左胠腋痛溏泄內爲隘塞外發

癰疝胷中不便隘塞而欬

註金氣寒肅故清發於中金勝則木氣受虧故爲

太陰在泉主勝則寒氣逆滿食飲不下甚則爲疝

註主勝則寒氣逆滿者水淫而上乘於土也四之

客氣乃厥陰風木食飲不下甚則爲疝者濕氣上

逆而病及厥陰之經也

五常政大論

太陰司天濕氣下臨腎氣上從胷中不利陰痿氣大衰而不起不用

註胷中不利水氣上逆也陰痿者腎氣衰於下也

夫陽氣生於腎陰而運用於膚表腎氣大衰故陰

器不起不用

靈樞經

邪氣臟腑病形篇

肝脈微大爲肝痹陰縮滑甚爲癆疝

註大主肝氣盛陰縮癆疝肝氣逆於下也

心脈微滑爲心疝引躋小腹鳴

註脾脈微大爲疝氣滑甚爲癆疝濶甚爲陽癆微濶爲

心脈微滑爲心疝引躋小腹鳴

註脾爲陰濕之土濕熱則爲疝氣虛而有寒則爲

腸癆脾臟多血少氣故下膿血

註脾爲陰濕之土濕熱則爲疝氣虛而有寒則爲

腎脈滑甚爲癃瘍大甚爲陰瘍

註腎有熱則爲癃瘍丸腫瘍者陰器瘻而不舉也

經脈篇

肝足厥陰之脈是動則爲腰痛不可以俛仰丈夫癰

疝婦人少腹腫是主肝所生病者狐疝

註腰痛不可以俛仰蓋厥陰從少陽中氣之化厥

陰之化氣病也癰疝少腹腫皆厥陰之本氣病也

足厥陰氣絕則筋絕厥陰者肝脈也肝者筋之合也

筋急則引舌與卵故脣青舌卷卵縮則筋先死庚篤

辛死金勝木也

註足厥陰之氣主筋故氣絕則筋絕厥陰者肝脈

於筋也聚於陰器者脈氣之會於宗筋也筋聚於陰器而絡於舌本故脈不榮於筋則筋急而舌卷卵縮矣厥陰氣絕則筋先死庚篤辛死金勝木而肝臟之木氣絕也

### 經筋篇

手少陰經筋之病寒則反折筋急熱則筋縱挺不收陰痿不用陽急則反折陰急則俛不伸猝刺者刺寒急也熱則筋縱不收無用燔鍼名曰季冬痹也

註手少陰其病在氣而爲經筋之病者寒則反折筋急熱則筋縱不收陽急則反折陰急則俛不能伸蓋少陰本陰而標陽故有寒熱陰陽之證少陰之從本從標也少陰主氣故爲季冬之痹

足厥陰之筋起於大指之上上循陰股結於陰器絡諸筋其病陰器不用傷於內則不起傷於寒則陰縮入傷於熱則縱挺不收治在行水清陰

註陰器乃宗筋之會而主筋故連絡於三陰三陽之筋也其病爲陰器不用傷於內則陰痿不用傷於寒則陰器縮入傷於熱則陰挺不收厥陰從中見少陽之火化故有寒熱之分夫金氣之下水氣治之復行一步木氣治之厥陰之木氣本於水故治在行水以清厥陰之氣也

### 五味篇

陰者積筋之所終也故酸入而走筋矣

註陰者前陰積筋者宗筋也宗筋者筋之主也酸入於宗筋故走筋蓋足厥陰肝經主宗筋而外合於通體之筋

### 五音五味篇

黃帝曰士人有傷於陰陰氣絕而不起陰不用然其鬚不去其故何也宦者獨去何也願聞其故岐伯曰宦者去其宗筋傷其衝脈血瀉不復皮膚內結脣口不榮故鬚不生

註宦者去其宗筋傷其衝脈血瀉而不復上榮於脣口故鬚不生此因割去前陰而傷其先天之精氣也

有天宦者此天之所不足也其任衝不盛宗筋不成有氣無血脣口不榮故鬚不生

註天宦者謂之天閹不生前陰卽有而小縮不挺不長不能生子此先天所生之不足也其衝任不

盛宗筋不成有氣無血脣口不榮故鬚不生

### 刺節真邪篇

莖垂者身中之機陰精之候津液之道也

註莖垂者乃宗筋之會腎者胃之機關主受藏津液夫腎臟所藏之津液從宗脈而上濡於空竅故曰莖垂者身中之機陰精之候津液之道也

### 本神篇

肝悲哀動中則傷魂魄傷則狂忘不精不精則不正當人陰縮而筋攣兩脅骨不舉毛悴色夭死於秋

註悲哀肺之情也如肝因悲哀動中則傷肝臟所藏之魂魄傷則狂忘不精蓋肝將軍之官謀慮出焉肝志傷則不能處事精詳矣膽爲中正之官決斷出焉臟氣傷則腑志亦不正而無決斷矣肝主筋而脈絡陰器陰縮筋攣脅骨不舉情志傷而及於形也

耳後陷者腎下腎下則爲狐疝註狐疝者偏有大小時上時下如狐之出入無時此腎臟之疝也

### 漢張機金匱要略

#### 陰腫濕

心水者其身重而少氣不得臥煩而躁其人陰腫腎水者其腹大臍腫腰痛不得溺陰下濕如牛鼻上汗其足逆冷面反瘦

註胃氣下泄陰吹而正喧此穀氣之實也膏髮煎導之

食忌

魚無腸膽者不可食食之三年陰不起女子絕生

### 疝

腹痛脈弦而緊弦則衛氣不行卽惡寒緊則不欲食邪正相搏卽爲寒疝寒疝連臍痛若發則白津出手足厥冷其脈沉緊者大烏頭煎主之

註寒疝腹中痛及脅痛裏急者當歸生薑羊肉湯主之寒疝腹中痛逆冷手足不仁若身疼痛灸刺諸藥不能治抵當烏頭桂枝湯主之

其脈數而緊乃弦狀如弓弦按之不移脈數弦者當下其寒脈緊大而遲者必心下堅脈大而緊者陽中

有陰可下之

趺陽脈當伏今反緊本自有寒疝腹中痛醫反下

註之下之卽曾滿短氣

陰狐疝氣者偏有小大時時上下蜘蛛散主之

少陰脈滑而數者陰中卽生瘡陰中瘡爛者狠牙陰蝕

湯洗之

華佗中藏經

卵縮

脾中寒足熱則皆使人腹中痛不下食又病其舌強語澀轉卵縮牽陰股中引痛

驗病生死

凡病舌卷卵縮者死

掌腫無紋臍腫出囊莖俱腫者死

疝脈

左手寸口陽絕則無小腸也六日死病則臍脾小腹中有疝瘕也

唐孫思邈千金方

癩有四種有腸癩卵脹氣癩水癩腸癩卵脹難瘥氣癩水癩針灸易治

妬精瘡

有人自少至長陰下常有乾癩者宜依癩方主之有五勞七傷而得陰下癩濕搔之黃汁出者宜用補丸散主之仍須傅藥治之亦有患妬精瘡者以妬精方治之夫妬精瘡者男子在陰頭節下婦人在玉門內並以疳瘡作白齊食之大痛瘡即不痛也

跌陽脈滑而數法當下重少陰脈滑而數婦人陰中生瘡

宋朱肱活人書

囊縮

傷寒六七日煩滿囊縮其脈尺寸俱微緩此足厥陰肝經受病也

脈浮緩必囊不縮外證必發熱惡寒似瘧爲欲愈宜桂枝麻黃各半湯若尺寸脈俱沉短者必是囊縮毒氣入臟宜承氣湯下之

大抵傷寒病臟腑傳變陽經先受病故次第傳入陰經以陽主生故太陽水傳足陽明土土傳足少陽木爲微邪也陰主殺故木傳足太陰土土傳足少陰水木傳足厥陰木至六七日當傳厥陰肝木必移氣尅於脾土脾再受賊邪則五臟六腑皆困而危殆營衛不通耳聲囊縮不知人而死矣速用承氣湯下之可保五死一生古人云脾熱病則五臟危又云土敗木賊則死若第六七日傳厥陰脈得微緩微浮爲脾胃脈故知脾氣全不再受客邪無所容否極泰來榮衛將復水升火降則寒熱作而大汗解矣

嚴用和濟生方

七疝

巢氏云疝者痛也皆由榮衛虛弱飲食寒溫不調致風冷邪氣乘虛入於腹中遂成諸疝發則小腹疼痛或繞臍或逆上搶心引心背痛甚則手足厥冷自汗嘔逆或大小便祕難大抵諸疝之脈當弦緊蓋弦者寒也緊者痛也疝有七證厥疝癓疝寒疝氣疝盤狀疝也緊者痛也何以言之厥疝則心痛足冷食已則吐癓疝腹中乍滿氣積如臂寒疝因寒飲食卒然脅下腹中痛氣疝腹中乍滿乍減而痛盤疝腹中痛引臍旁附疝腹痛連臍下有積聚狼疝小腹與陰相引而痛諸疝不愈邪氣留滯乃成積聚其爲病也或左或右脅下有如覆杯或臍上下如臂或腹大如盤令人羸瘦少氣酒漸寒熱嗜臥飲食不爲肌膚或

腹滿嘔泄或遇寒則痛其脈厥而緊浮而牢皆積聚之脈也但牢彊急者生虛弱急者不可治

陰癩

夫陰癩之證有四種一曰腸癩二曰氣癩三曰卵脹四曰水癩是也聖惠云腎氣虛風冷所侵流入於腎不能宣散而然也三因云陰癩屬肝係宗筋胃陽明養之考之衆論俱爲至當多由不自衛生房室過度久蓄憂思恐怒之氣或坐臥冷濕處或勞役無節皆能致之病則卵核腫脹偏有大小或堅硬如石或臍腹絞痛甚則膚囊腫脹多成瘡毒輕則時出黃水甚則成癰潰爛大抵卵脹腸癩皆不易治氣癩水癩灸之易愈也又有小兒有生以來便如此者乃宿疾也

四癩治法橘核丸用之屢驗

竇漢卿瘡瘍全書

腎癩

此毒年高者因宿有疝氣疾及感冒寒濕氣辛勤少壯爲因房事所得初起陰囊赤腫身發寒熱攻水道歸來二穴痛不可忍用手按之皮寬不急可用敗毒散加入當歸鬚川棟子發散用手按之急脹似火之熱急用陰囊毒之藥治之更服黃芩丸

倘或開刀須待其熟以油頭繩紮住腎子以小刀開海底穴其膿血即流盡矣外貼金絲等膏少勞戒色并避湯火風氣及諸毒物

陰囊毒即腎

此證因肝經濕熱不利遂流毒於膀胱腎經感冒寒暑邪氣偏盛於陰之經絡以致血氣凝聚寒濕不散陰囊上腫而痛或潰爛皮脫腎子懸挂宜用瀉肝清

熱湯服之外用鐵箍散圍之

此證腐壞急用烏金散敷之或潰爛飲食少思日晡發熱急服加味小柴胡湯痛甚加黃連小便不利加木通車前子口渴加天花粉麥門冬五味子

### 陰蝕瘡

陰蝕瘡之生皆由臟中虛怯腎氣衰少風邪入腑毒惡損傷榮衛或與有毒婦人交接不會洗淨故時痛時癢以漸成竅作疳膿水湧流若不早治命亦難保先用蛇牀子地骨皮桑槐枝煎湯溫洗內服清熱消疳解毒湯外用摻藥先用金絲膏後用紫金膏拔出毒水易能長肉

夫陰蝕瘡者卽下疳也陰汗臊臭故莖根生疳瘡乃肝經所屬之分野

內外疳身熱小便澀滯宜服小柴胡湯加龍膽草黃連車前子

### 左右便毒又名血症

夫便毒者生於小腹兩腿合縫之間或行路遠涉辛苦或上或下低閃肭氣或房事所傷或男女大慾不得直遂其志故敗精滯血留聚中途或夢寐之間而不洩或妄想不能忘情息念故結成毒然腎者作強之官伎巧所出一有所感精血凝滯此證遂生初起之時寒熱交作兩腿牽絆腫起不能屈伸乃證之漸也急服龍膽湯

### 小腸流注

此證受在心經伏熱結聚成毒也當用敗毒流氣飲再服清心流氣飲治之時服蠟礬丸

金匱完素六書

## 癩疝

癩疝少腹挫卵腫急絞痛也寒主拘縮寒極而土化婦人少腹腫皆肝足厥陰脈之爲病經註曰寒氣聚而爲疝也又按難經言五臟皆有疝但脈急也註言

脈急者寒之象然寒則脈當短小而遲今言急者非急數而洪也由緊脈主痛急爲痛甚病寒雖急亦短小也所以有痛而脈緊急者脈爲心之所養也凡六氣而痛則心神不寧而緊急不得舒緩故脈亦從之而見欲知何氣爲其痛當適其緊急相兼之脈而可知如緊急洪數則爲熱痛之類又經言脾傳之腎病名曰疝瘕少腹煩冤而痛出白液一名曰蠱註言少腹痛溲出白液也一作客熱內結銷鑠脂肉如蟲之食故名曰蠱也然經之復言熱爲疝瘕則亦不可止言爲寒當以脈證別之

### 小腸氣

甲乙經云小腸病結於腰上而不下痛衝心肺邪所系茴香棟實丸主之

### 陰疝

足厥陰之脈環陰器抵小腹腫或痛腎虛寒水涸宜瀉邪補脈爲治疾藜湯主之

### 蠱疝

脾風傳腎一名疝氣小腹痛出白液名曰蠱左傳云以喪志名爲蠱病乃真精不守也大建中湯主之心脈急小腹有形心不受邪必傳於腑故小腹有形心氣逆不順則痛不已當兼心氣治不止爲有寒邪

所中木香散主之  
元張從政儒門事親

### 莖中痛

莖中痛者先宜清劑寒劑奪之後以淡劑甘劑分之

### 疝本肝經宜通勿塞論

疝有七前人論者甚多非靈樞素問銅人之論余皆不取非余好異也但要窮其源耳七疝者何寒疝水疝筋疝血疝氣疝狐疝癩疝是謂七疝俗工不識因立謬名或曰膀胱或曰腎冷或曰小腸氣小兒曰偏氣立名旣謬併喪其實何哉醫者旣斷爲膀胱腎冷小腸氣又曰虛寒所致其藥之用也不鹿茸巴戟杜仲菟絲不附子烏頭則乾薑官桂不棟實蘆薈則金鈴補骨脂朝吐暮餌曾無殊效三二十年牢不可去間因微病稍似開通執此微芒浸成大錯標旣不除本必歸甚處處相傳曾無覺者豈知諸疝皆歸肝經其奈通流歸之小腸脾囊夫膀胱水腑專司滲泄小腸水道專主通流腎爲少陰總統二水人之小溲自胃入小腸滲入膀胱膀胱者脬囊也氣化則水出莖端此常道也及其爲疝乃屬足厥陰肝經蓋環陰器而上入小腹者足厥陰肝經也夫肝腎皆屬於下與衝任督相附然靈樞經言足厥陰肝經病則有遺溺癃閉狐疝專主腎與膀胱小腸三經則不言疝是受疝之處乃肝之部分也且內經言男子宗筋爲束骨之會而肝專主筋匿者囊中之丸雖主外腎非厥陰環而引之則玉莖無由伸縮在女子則爲篡戶其內外爲二其一曰廷孔其二曰窈漏此足厥陰與衝任督之所會也靈樞言足厥陰之經筋聚於陰器

其病傷於寒則陰縮入傷於熱則縱挺不收治在行水清陰氣故陽明與太陰厥陰之筋皆會於陰器惟厥陰主筋故爲疝者必本之厥陰靈樞又言足厥陰之別名曰蠡溝去內踝五寸別走少陽循胫上畢結於莖其病氣逆畢腫卒疝實則挺長虛則暴痒取之所別也豈非厥陰爲受病之處耶靈樞又言邪在小腸連畢系屬於腎貫肝絡肺心系氣盛厥逆上衝腸胃熏肝散於肓結於臍故取之肓原以散之取太陰以平之取厥陰以下之取巨虛下廉以去之按其所過之經以調之此其初雖言邪在小腸至其治法必曰取厥陰以下之乃知諸疝關於厥陰可以無疑以脈考之素問云厥陰滑爲狐風疝少陽滑爲肺風疝太陰滑爲脾風疝陽明滑爲心風疝太陽滑爲腎風疝少陰滑爲肝風疝凡此六疝雖見於他脈中皆言風疝者足厥陰肝經之氣也靈樞亦曰心脈微滑爲心疝肝脈滑甚爲癆疝腎脈滑甚爲瘻瘍凡此三臟脈之疝亦以滑爲疝也素問又云脈大急皆爲疝心脈滑傳爲心疝肺脈沉傳爲肺疝三陰急爲疝三陽急爲瘕王太僕云太陽受寒血凝爲瘕太陰受寒氣聚爲疝此言太陰受寒傳之肝經可以溫藥逐之而不可以溫藥補之若補之者是欲病去而強挽留之也歷考素問三陽爲病發寒熱其傳爲癩疝此亦言膀胱非受病之處必傳於厥陰部分然後爲疝也又言病在少腹腹痛不得大小便病名曰疝得之寒言脈急者曰疝瘕少腹痛凡言少腹者豈非厥陰之部分耶又言脾風傳胃名曰疝瘕此謂非肝木不能爲風氣名曰疝蓋脾土虛而不能制水又爲肝木所

凌也又言督脈爲衝疝蓋厥陰與衝任督俱會於前陰也豈不明哉至如運氣中又言歲太陽在泉寒溼所勝民病少腹控睾蓋寒客於小腸膀胱則肝木縮而不得伸此母傳之子也陽明司天燥溼所勝丈夫癩疝婦人少腹痛此言肝氣不得上行爲金所抑鬼賊故也又言太陰在泉土勝則寒氣逆滿飲食不下甚則爲疝此亦言寒客太陰濕土土不勝水水傳之肝經也又嘗徧閱銅人俞穴亦相表裏如背上十三椎俞肝經言寒疝腹部中行惟陰交一穴言寒疝任脈之所發也關元一穴言暴疝小腸之募足三陰任脈之會也中極一穴言疝瘕膀胱之募亦足三陰任脈之會也曲骨一穴言癰疝任脈足厥陰之會也其腹部第二行肓脈二穴言寒疝衝脈足少陰之會也四滿二穴言疝瘕衝任脈足少陰腎之會也其腹部第三行大巨二穴言癰疝足陽明脈氣之所發也氣衝二穴言癩疝莖中痛兩丸寒痛亦足陽明脈氣之所發也其腹部第四行府舍二穴言疝痛足太陰厥陰陰維之交會也衝門二穴言陰疝足太陰厥陰之會也其在側脅者五樞二穴言寒疝陰邪上入少腹帶脈下三寸也其在足六經者足厥陰穴十名言疝者七謂大敦行間太衝中封蠡溝中都曲泉足少陽穴十四名言疝者一謂陰陵泉也足陽明穴十五名言疝者一言疝者一謂陰陵泉也足太陽穴十八名言疝者二謂金門合陽也由是言之惟厥陰言疝獨多爲疝之主也照海交信築賓也足太陽穴足太陽穴十五名言疝者二謂金門合陽也由是言之惟厥陰言疝獨多爲疝之主也其他經穴雖亦治疝終非受疝之地但與足厥陰相

連耳或在泉寒勝木氣攣縮禁於此經或司天燥勝木氣抑鬱於此經或忿怒悲哀憂抑頓挫結於此經或藥淋外固閉尾縮精壅於此經其病差別如此不知世間之方多熱補信俗方則素問靈樞銅人非也信素問靈樞銅人則俗方非也嗚呼余立於醫四十餘歲識練日久因經識病然後不惑且夫遺溺閉癃陰痿脬癆精滑白淫皆男子之疝也不可妄歸之腎冷血涸不月月罷腰膝上熱足墮嗌乾癃閉少腹有塊或定或移前陰突出後陰痔核皆女子之疝也但女子不謂之疝而曰瘕若少年得之不計男子婦人皆無子故隱蔽委曲之事了不干脬腎小腸之事乃足厥陰肝經之職也俗方止言脬腎小腸殊不言肝木一句惑人甚矣且肝經乙木也木屬東方爲心火之母也凡疝者非肝木不受邪則肝木自甚也不可便言虛而補之難經所謂東方實西方虛瀉南方補北方此言瀉火木自平金自清水自旺也昔審言爲蔡之參軍也因坐濕地疝痛不可堪諸藥莫救余急以導水丸禹功散瀉三十餘行腫立消痛立減又項關一男子病卒疝暴痛不任倒於街衢人莫能動呼予以余引經證之邪氣客於足厥陰之絡令人卒疝故病陰丸痛也余急瀉大敦二穴大痛立已夫大敦穴者乃足厥陰之二穴也殄寇鎮一夫病瘡瘍發渴痛飲蜜漿劇傷冰水醫者莫知瀉去其濕反雜進薑附濕爲燥熱所壅三焦閉溢水道不行陰道不興陰囊腫墜大於升斗余先以導水百餘丸少頃以猪腎散投之是夜瀉青赤水一斗遂失痛之所在又一夫病卒疝赤腫大痛數日不止諸藥如木投石余以導

水一百五十九令三次咽之次以通經散三錢空腹

淡酒調下五更下臟腑壅積之物數行痛腫皆去不三日平復如故內經曰木鬱則達之謂吐之令條達也肝積本當吐然觀其病之上下以順爲貴仲景所謂上宜吐下宜瀉也

### 七疝病形

寒疝久而無子其狀囊冷結硬如石陰莖不舉或控睾丸而痛得於坐臥濕地或寒月涉水或置兩雪或坐臥磚石或風冷處使內過勞宜以溫劑下之

水疝其狀腎囊腫痛陰汗時出或囊腫而狀如水晶或囊痒而燥出黃水或少腹中按之作水聲得於飲水醉後使內過勞汗出而遇風寒濕之氣聚於囊中故水多令人爲卒疝宜以逐水之劑下之有漏針去水者人多不得其法

筋疝其狀陰莖腫脹或潰或膿或痛而裏急筋縮或莖中痛痛極則痒或挺縱不收或白物如精隨溲而下得於房室勞傷及邪術所使宜以降心之劑下之血疝其狀如黃瓜在大腹兩旁橫骨兩端約中俗云便癰得於重感春夏大燠勞動使內氣血流溢滲入肝囊留而不去結成癰腫膿少血多宜以和血之劑下之

氣疝其狀上連腎區下及陰囊或因號哭忿怒則氣鬱之而脹怒哭號罷則氣散者是也有一治法以鍼出氣而愈者然鍼有得失宜以散氣之藥下之或小兒亦有此疾俗曰偏氣得於父已年老或年少多病陰痿精怯強力入房因而有子胎中病也此疝不治惟築賓一穴言之

狐疝其狀如瓦臥則入小腹行立則出小腹入囊中

狐則晝出穴而溺夜則入穴而不溺此疝出入上下往來正與狐相類也亦與氣疝大同小異今人帶鉤鈴是也宜以逐氣流經之藥下之

癩疝其狀陰囊腫絕如升如斗不痒不痛者是也得宜以去濕之藥下之女子陰戶突出雖亦此類乃熱則不禁固也不可便謂虛寒而溫之燥之補之本名曰瘕宜以苦下之以苦堅之王冰云陽氣下墜陰氣上爭上爭則寒多下墜則筋緩故睾垂縱緩因作癩疝也已上七疝下去其病之後可調則調可補則補各量病勢勿拘俗法經所謂陰盛而腹脹不通者癩疝也故不可不下

### 便癰

夫便癰者乃男子之疝也俗呼爲便癰言於不便處害一癰故名便癰便癰者謬名也難素所不載然足厥陰肝之經絡是氣血行流之道路衝任督脈亦屬肝經之旁絡難經曰男子有七疝是也便癰者血疝也治之以導水丸桃仁承氣湯或抵當湯投之同瘀

血不散而治大作劑料峻瀉二二十行次以玉燭散

和氣血通經絡之類則是世只知多用大黃牡蠣而

已間有不愈者是不知和血通經之道也

### 下疳

夫下疳久不愈者俗呼曰臊疳是也先以導水禹功先瀉肝經外以木香散摻之日上三兩度然後服淡粥一二日則止

李杲十書

### 隱曲不利

經曰二陽之病發心脾有不得隱曲女子不月經之者謂男子則脾受之而味不化故少精女子則心受之而血不流故不月分心脾爲男女各受立說竊獨謂不然夫二陽陽明也胃與大腸之脈也腸胃有病心脾受之發心脾猶言延及於心脾也雖然脾胃爲合胃病而及脾理固宜矣大腸與心本非合也今大腸而及心何哉蓋胃爲受納之府大腸爲傳化之府食入於胃濁氣歸心飲入於胃輸精於脾者以胃之能納大腸之能化也腸胃既病則不能受不能化心脾何所資乎心脾既無所資則無所運化而生精血矣故腸胃有病心脾受之則男爲少精女爲不月矣心脾當總言男女不當分說至隱曲不月方可分說耳若如釋者之言則男之精獨資於脾而不資於心女之血獨資於心而不資於脾有是理耶蓋男女之精血皆由五臟之相養而後成可謂之男精資於脾女血資於心乎經本曰男女皆有心脾之病但在男子則隱曲不利在女子則月事不來耳

### 論疝

前陰分大寒大熱囊垂縮陰陽別論云三陽爲病發寒熱下爲壅腫及爲痿厥腫痙其傳爲索澤又傳爲癩疝夫熱在外寒在內則囊垂此九夏之氣也寒在外熱在內則卵縮此三冬之氣也足太陽膀胱之脈逆上迎手太陽小腸之脈下行至足厥陰肝之脈不得伸其任脈並厥陰之脈逆則如巨川之水致陽氣下墜是風寒濕熱下出囊中致兩睾腫大謂之曰疝大甚則爲癩足厥陰之脈與太陽膀胱寒水之脈同

至前陰之末傷寒論云足厥陰肝經爲病煩滿囊縮急下之宜大承氣湯以瀉大熱靈樞經筋篇云足厥

陰肝傷於寒則陰縮入前說囊縮爲大熱此說爲大寒又說囊縮垂畢下引癲疝脚氣爲大寒風濕盛下垂爲寒與上二說不同何也曰以平康不病人論之

夏暑大熱囊卵累垂冬天大寒急縮收上與前三說

又不同何也曰傷寒家囊卵縮大熱在內宜承氣湯急下之與經筋說陰縮入大寒在外亦是熱在內與

傷寒家同故再引平康人以證之冬天陽氣在內陰氣在外人亦應之故寒在外則皮急皮急則囊縮夏天陰氣在內陽氣在外人亦應之故熱在外則皮緩

皮緩則囊垂此癲疝之象也三說雖殊皆一理也

論陰瘡

夫陰瘡者大槩有三等一者濕陰瘡二者妬精瘡三

者陰蝕瘡又曰下疳瘡蓋濕瘡者由腎經虛弱風濕相搏邪氣乘之癢痒成瘡浸淫汁出如疥癬者是也妬精者由壯年精氣盈滿久曠房室陰上生瘡赤腫作害妨悶痒痛者是也陰蝕瘡者由腎臟虛邪熱結下焦經絡否瀝氣血不行或房勞洗浴不潔以致生

瘡隱忍不醫焮腫尤甚由瘡在裏措手無方疼痛注悶或小便如淋陰丸腫痛是也或經十數日潰爛血膿肌肉侵蝕或血出不止以成下疳若身體壯熱煩渴惡寒宜急治之以大豆甘草湯漬之潰毒之湯洗浴之服五香連翹湯漏蘆湯等疏之更以截疳抵聖

散乾摻之四畔用摩風膏溫潤之後以將護忌慎之渴不止者服竹葉黃芪湯大便軟者宜服托裏茯苓湯調治之夫如是則無不差矣

### 朱震亨心法

#### 疝痛

疝痛濕熱痰積流下作病大槩因寒鬱而作即是痰飲食積并死血

專主肝經與腎經絕無相干大不宜下

疝濕多成疝氣宜灸大敦穴在足大指爪甲後一韭葉聚毛間是穴

食積與死血成痛者梔子桃仁山楂枳子枳實一作吳茱萸並炒以生薑汁順流水煎湯調服一方加茴香附子

亦有水氣而腫痛者

又有挾虛者當用參木爲君佐以疏導之藥其脈沉緊豁大者是

按之不定者屬虛必用桂枝山梔炒烏頭細切炒爲末薑汁糊丸每服三四十九薑湯下大能効痛

按戴思恭云疝本屬厥陰肝之一經余常見俗說小腸膀胱下部氣者皆妄言也

#### 木腎

木腎者心火下降則腎水不患其不溫真陽下行則

腎氣不患其不和既溫且和安有所謂木強者哉夫惟嗜慾內戕腎家虛憊故陰陽不相交水火不相濟

而沉寒痼冷凝滯其間脹大作痛頑痹結硬勢所必

至矣不可純用燥熱當溫散溫利以逐其邪邪氣內

消榮衛流轉如寒谷回春蓋有不疾而速不行而至

者矣

#### 治法

凡治七疝多用熱藥而獲效者卽內經從治之法耳須用寒涼藥監制之不可純用大熱之劑如烏頭附子之類令人久服多服必變劇不可治矣但宜以二陳湯加枳實橘核梔子山楂等藥煎入生薑汁熱辨飲之

恐有瘀血作痛者本方加延胡索桃仁泥

如有氣作痛者本方加木香茴香棟實等藥

如六脈沉細手足厥冷者本方加附子乾薑肉桂之類以佐之

如睾丸痛甚者加荔枝核乳香沒藥爲細末調入本方煎藥內或另用順流水調服亦可

如木腎腫大如升斗者本方去甘草加海藻昆布荔枝核茴香川棟子等藥爲末順流水調服作丸子服亦可

#### 囊癰

外科精要云癰疽入囊者死囊屬厥陰今以死言之將以爲屬少陰腎經邪乎親見入囊者七八人悉以濕熱入肝經施治而用補陰藥佐之雖膿潰皮脫睾丸懸掛可畏者皆不死但不知下虛年老者如何耳

囊癰濕熱下注也有作膿者此濁氣潤下將流入滲道因陰道或虧水道不利而然膿盡自安不藥可也惟在善於調攝耳又有因腹腫漸流入囊屢甚而囊自裂開睾丸懸掛木出以杉木炭末傅外以紫蘇葉包裹仰臥養之

大抵此證屬陰道虧濕熱不利所致故滋陰降濕藥不可缺常治腫痛小便祕滯者用除濕爲主滋陰佐之腫痛已退便利已和者除濕滋陰藥相兼治之欲

其成膿用托裏爲主滋陰佐之候膿成卽針之仍用托裏滋陰若濕毒已盡者專用托裏如膿清或更多或斂遲者用大補之劑或附子餅灸之

### 陰瘡

男子陰瘡又名恥瘡或痛在莖之竅或痛在莖之標皆手足太陽經不利熱毒下傳入於足厥陰經故變紫黑色作蝕瘡毀其莖而死宜以子和泄水丸散導濕毒無不愈者若已成瘡先泄其根次從標而治外以葱白黑豆汁渫洗拭乾以黃連木香密陀僧乾臘脂之類細末擦之如內潰膿不出以追膿散上之又用子和泄水丸如後竅膿少可用黃連木香臘脂等貼之

### 格致餘論

#### 疝氣論

疝氣之有甚者羣丸連小腹急痛也有痛在羣丸者有痛在五樞穴邊者皆足厥陰之經也或有形或無形或有聲或無聲有形如瓜有聲如蛙自素問以下歷代名醫皆以爲寒蓋寒主收引經絡得寒故收引不行所以作病理固然也有得寒而無疝者又必有說以通之可也予嘗屢因門戶雪上有霜沒臍之水踢冰徒步不會病此以予素無熱在內也因而思之此證始於濕熱在經鬱而至久又得寒氣外束則濕熱之邪不得疏散所以作痛若只作寒論恐爲未備或曰厥陰一經其道遠其位卑鬱積濕熱何由而致予曰大勞則火起於心醉飽則火起於胃房勞則火起於腎大怒則火起於肝本經火積之既久母能令子虛濕氣便盛厥陰屬木係於肝爲將軍之官其性

急速火性且又暴今旣爲寒所束宜其痛之大暴也愚見有用烏頭梔子等分作湯用之其效亦敏捷後因此方隨證與形加減用之無有不應然濕熱又須分多少而施治但濕者腫多癩症是也又有挾虛而發者當以參木爲君而以疏導藥佐之診其脈有甚沉緊而豁大無力者是也其痛亦輕惟覺重墜牽引耳

下部癩氣不痛之方細思非痛斷房事與厚味不可若徒恃用藥惟促其壽若蒼朮神麴白芷山楂川芎枳實半夏皆要藥人視其藥皆鄙賤之物以啓慢心又不能斷慾以愛護其根本非徒無益而反被其害者多矣且其藥宜隨時月寒濕更按君臣佐使加減大抵癩疝屬濕者多

#### 羅天益衛生寶鑑

至真要大論云小腹控羣引腰脊上衝心唾出清水及爲白淫甚則入心善悲忘甲乙經曰邪在小腸也小腸病者小腹痛引腰脊貫肝肺其經虛不足則風冷乘間而入邪氣既入則厥其誤上衝肝肺客令散於胷結於臍控引羣丸上而不下痛而入腹其衝心胷蓋其經絡所屬所系也

### 胞痹

痹論云胞痹者小腹膀胱按之內痛若沃以湯溫於小便上爲清涕夫膀胱者爲州都之官津液藏焉氣化則能出矣今風寒濕邪氣客於胞中則氣不能化出故胞滿而水道不通其證小腹膀胱按之內痛若沃以湯溫於小便以足太陽經其直行者上交顛入

絡腦下灌鼻竅則清涕也  
明虞搏醫學正傳

### 疝氣論

愚按子和論七疝病源至爲詳悉但其處方一以攻下之法爲主治不能使人無疑耳旣曰多由房勞致虛而作其可一例施之以攻下之法乎大抵七疝爲病若非房勞所致卽是遠行辛苦涉水履冰熱血得寒而凝滯於小腸膀胱之分或濕熱乘虛而流入於足厥陰之經古方一以爲寒而純用烏附等熱藥爲治我丹溪先生獨斷爲濕熱此發古人之所未發者也夫熱鬱於中而寒束於外宜其有非常之痛故治法宜驅逐本經之濕熱消導下焦之痰血而以寒因熱用之法立方處治卽邪易伏而病易退也其攻下之法愚故未敢試而行之以俟識者

#### 王綸明醫雜著

### 陰痿

男子陰痿不起古方多云命門火衰精氣虛冷固有之矣然亦有鬱火甚而致痿者經云壯火食氣譬如人在暑熱而倦怠痿弱遇冬寒而堅強也予嘗親見一二人腎經鬱火而有此證令服黃蘖知母清火堅腎之藥而效故須審察不可偏認作火衰也

註

陰莖屬肝之經絡蓋肝者木也如木遇湛露則

森立遇酷熱則萎悴若因肝經濕熱而患者用龍膽瀉肝湯以清肝火導濕熱若因肝經燥熱而患者用六味丸以滋腎水養肝血而自安

### 陰虛疝

若陰虛兼有疝氣病者補陰丸加蒼朮鹽水炒一兩

半黃連薑汁炒山梔炒各六錢川芎一兩吳茱萸炒  
青皮去穰各五錢

**註 痘證專主肝**

註 痘證專主肝經者多如運氣或在泉寒勝木氣  
攣縮禁於此經或司天燥勝木氣抑鬱於此經或  
忿怒悲哀憂抑頓挫結於此經或藥淋外固閉尾

縮精壅於此經其病差別如此且夫遺溺閉癃陰  
痿脬癆精滑白淫皆男子之疝也不可妄歸之腎  
冷血涸不月月罷腰膝上熱足躄隘乾癃閉少腹  
有塊或定或移前陰突出後陰痔核皆女子之疝  
也但女子不謂之疝而謂之瘕若年少而得之不  
計男子婦人皆無子故隱蔽委曲之事了不干脬  
腎小腸之事乃足厥陰之證也竊謂前證若因肝  
經濕熱當用炒山梔茯苓黃芩澤瀉川芎當歸吳  
茱萸黃連山楂若肝脾二經陰虛濕熱宜補中  
益氣加炒山梔炒黑黃連吳茱萸蓋疝名有七形  
證所因不同治法亦異

腎小腸之事乃足厥陰之證也。竊謂前證若因肝

經濕熱當用炒山梔茯苓黃芩澤瀉川芎當歸吳

茱萸黃連山楂若肝腎二經濕熱當用六味地黃丸料加柴胡山梔若肝脾二經陰虛濕熱宜補中益氣加炒山梔炒黑黃連吳茱萸蓋疝名有七形證所因不同治法亦異

方賢奇效良方

此厥陰經證其筋脈循陰器絡舌本厥陰經受病其筋脈動急故舌捲囊縮者難治治用當歸四逆湯吳

茱萸生薑湯治之

巢氏病源論疝者痛也其名曰厥曰癥曰寒曰盤曰氣曰附曰狼此七者疝之名也其厥逆心痛足寒嘔吐飲食不下曰厥疝腹中氣乍滿心下盡痛氣積如臂曰癥疝因寒飲食卽脅下腹中盡痛曰寒疝腹中

乍滿乍減而痛曰氣疝腹中痛在臍旁曰盤疝腹中臍下有積聚曰附疝小腹與陰相引而痛大便難曰狼疝其證發則可驗又有石疝血疝陰疝妬疝氣疝者其名不同病則大同小異世俗呼爲小腸氣膀胱疝病其名有別也至於張子和論七疝曰寒疝水疝筋疝血疝狐疝氣疝癲疝之名又與諸論不同且如癲疝者外腎堅腫也痛者爲陰腫不痛者爲木腎一邊墜下者爲偏墜疝諸論立名雖多且異靈樞經云邪在小腸連睪系屬腎貫肝絡肺系心氣盛厥氣上衝也內經又云任脈爲病男子內結七疝女子帶下瘕聚衝脈逆爲氣裏急然則任脈雖稱病有七疝之名而無七疝之狀而任脈者是疝病之本源各經是病疝之支流也又云厥陰脈滑爲狐疝少陽脈滑爲肝風疝太陰脈滑爲脾風疝少陰脈滑爲心風疝太陽脈滑爲腎風疝陽明脈滑爲肺風疝此風非外入之風乃肝木陽臟氣動之風也此六疝者應乎六經在於五臟何謂疝病皆屬肝病生於陰起於下陰者內之太陰脾厥陰肝少陰腎皆足之陰經也下者地下寒氣也足常履地蓋天地之風寒皆入於地人之風濕皆從足起或因經虛聚於脬囊小腹兩陰相併二氣相搏則爲疼痛矣或冷飲過情水流歸腎或坐臥處濕寒搏留陰以寒攻陰則爲疝痛經曰痛者通也疝氣作痛宜通不宜塞宜溫不宜涼通謂瀉其實不瀉其虛塞謂補其虛不補其實者邪氣也虛者正氣也若正氣虛極則先溫而後瀉若邪氣盛極則

戴思恭證治要訣

舌捲囊縮不特陰中之陰有之陽明之熱陷入厥陰亦有之蓋陽明主宗筋宗筋爲熱風所吹故弗榮而急引舌與卵是以舌捲囊縮當瀉陽以救陰宜大承氣湯

厥陰舌捲囊縮宜急下如此等證當速用利下之劑  
苟或當下而不下則熱毒轉深遂致失下不可救療  
豈可一以下藥宜遲爲說

氣因寒聚爲疝血因寒聚爲瘕卽是疝氣今謂之橫  
弦豎弦繞臍走注小腹疼痛宜蟠葱散吞下茱萸內  
消丸或鹽酒調異功散

不問何證皆可用生料五苓散加炒茴香半錢或一錢服藥未效大痛攻刺不已陰縮手足厥冷宜香附子仍炒鹽乘熱用絹裹熨臍下若大小腑不甚通者

五苓散加桂下青木香丸

初發或頭疼身熱或憎寒壯熱並宜參蘇飲加木香氣逆上攻心下不覺痛而見心疼者宜以生韭搗取自然汁和五苓散爲丸苟香湯下亦於心痹疼證中互言之有腎氣纔動心氣亦發上下俱疼者宜異功散吞茱萸內消丸或且專治下下痛定則上痛定矣

痴痴

**一核偏墜或俱腫脹或**一核縮入小腹痛不可忍用  
手按捺方得還舊是爲癩氣宜蟠葱散吞下茱萸內

**消丸**者未愈華澄丸散下大茴香丸  
若大小腑不通宜木香丸半貼以通

若大小便不通宜木香丸半貼以通潤之却以蟹螯  
十箇去頭足翅剝碎同炒去蟄出火毒濃煎燈心湯  
調五苓散下五七十丸或用燈心葱入水酒內煎去  
燈心葱調五苓散若痛入腹逆上攻心至成嘔逆先  
用鹽酒下養正丹次用生料五積散加吳茱萸茴香  
桃仁延胡索各炒入半錢有因登高擗傷外核以致  
腫疼或小便出血或小便不通宜五苓散和復元通  
氣散服

有陰癩大如斗諸藥不能效者宜當歸四逆湯加生薑茱萸曾用之效

樓英醫學綱目

運氣爲疝

疝痛屬足厥陰肝經也小腹亦肝經也故疝痛與小腹痛同一治法所謂疝者睪丸連小腹痛也其痛有獨在睪丸者有獨在小腹偏於一邊者有睪丸如升斗者癩疝是也又立臥出入往來者狐疝是也

**運氣小腹痛有二**一曰肝病小腹引脅痛是也經云

厥陰之復少腹堅滿裏急暴痛是風氣助肝盛而然治法當瀉肝也又云歲金太過民病兩脅下痛小腹痛又云歲木不及燥乃大行民病中清胠脅痛小腹

病引小脢者是燥邪攻脢虛而然汗法當補脢津  
全也又寒氣客於厥陰之脈則血泣脈急故脅與小  
腹相引痛者治法亦同也

二曰小腸其病小腹引睾丸腰脊痛是也經云少陰之脈心下熱善饑臍下痛又云少陰之復燠熱內作小腹絞痛者是熱助小腸盛而然治法當瀉小腸也又太陽在泉寒淫所勝與太陽之復皆病小腹控睾引腰脊上衝心痛及太陰司天大寒且至病小腹痛者是寒邪攻小腸虛而然法當補小腸瀉寒邪也三曰膀胱其病小腹痛腫不得小便是也經云太陰在泉病小腹痛腫不得小便是也濕邪攻膀胱虛而在泉病小腹痛腫不得小便是濕邪攻膀胱虛而然治法當補膀胱瀉濕土邪也

夫滑脈關已上見者爲大熱蓋陽與陽併也故大熱滑脈尺部見爲大寒生癩疝滑脈者命門包絡之名也爲丙丁火熱併於下蓋丙丁不勝壬癸故從寒水

之化而生癲癇

**運氣癲疝有一經云陽明司天燥淫所勝丈夫癲疝婦人小腹痛又云陽明之勝外發癲疝者是燥邪攻肝氣虛而然治法當補肝瀉燥金也**

樓英醫學綱目

運氣爲疝

疝痛屬足厥陰肝經也小腹亦肝經也故疝痛與小腹痛同一治法所謂疝者睪丸連小腹痛也其痛有獨在睪丸者有獨在小腹偏於一邊者有睪丸如升斗者癩疝是也又立臥出入往來者狐疝是也

**運氣小腹痛有二**一曰肝病小腹引脅痛是也經云

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第二百二十一卷目錄

醫部彙考二百一

前陰門二

李梴醫學入門瘡瘍便毒

楊梅 茎中痔 茄精

諸瘡陰

張三錫醫學準繩六要前陰諸病

薛己醫按懸瘻便毒

囊瘻下疳

諸瘡治

李中梓醫宗必讀瘡論治法

龔信古今醫鑑瘡病治法

徐春甫古今醫統陰腫瘡木腎

下疳

王肯堂證治準繩瘡論懸瘻毛際瘻便毒陰瘡

吳崑醫方考七瘡方論

陳實功外科正宗腎囊風陰疊下疳

魚口便毒

喻昌醫門法律瘡論看法治法

王肯堂證治準繩瘡論看

藝術典第二百二十一卷

醫部彙考二百一

前陰門二

明李梃醫學入門

醉飽勞役房慾忿怒動火火鬱久則生濕津液凝爲

痰濁流入肝經肝性急速又暴爲外寒所束是以痛甚有專言寒者論其標耳大要熱者遇熱則發二便

赤溫小腹肛門俱熱外腎累垂玉莖挺急寒者遇寒

則發二便皆利脅腹清冷外腎緊縮又有冷熱不調者外腎小腹或冷或熱二便或閉或利

局方多以爲小腸氣膀胱氣腎氣者亦自其標末而言其實主於肝也蓋肝環陰器而上入小腸又肝腎

皆屬於下與衝任督相附腎與膀胱爲臟腑其氣相

通運爲外腎系於睪丸此三經相連相會然肝主筋

睪丸雖名外腎非厥陰環而引之則玉莖無由伸縮

在女子則爲篡戶經云邪在小腸連睪丸屬於腎貫

肝絡肺心系氣盛厥逆上衝腸胃熏肝散於肓結於

臍惟取厥陰以下之及論三臟脈皆以滑爲疝每云

風疝者非外風也乃肝木陽臟氣動之風論三陽疝

發寒熱言膀胱非受病之處必傳於肝而後爲疝又

明堂穴法治疝皆取厥陰部分可見疝主肝經

小腸多氣少血之經忿怒憂思起於肝而心氣因之

鬱結心與小腸爲表裏膜外氣聚無出攻及膀胱腎

納氣房勞過度敗精蓄爲邪水氣滯入裏胞絡真氣

膀胱氣脹然皆肝所主也所以病發不特外腎小腹

作痛或攻刺腰脅或遊走胷背或搶心痛或遷臍痛

冷汗流不止者難治

男子遺精女人不月令人羸瘦少氣洒淅寒熱食少

嘔吐吞酸久則遂成暴吐甚則角弓反張咬牙戰汗

水疝有睪丸痛者有連小腹痛者感冷觸怒則塊物逆

上囊根心和氣平則塊物自循營系歸入囊中

水疝囊腫如水晶或囊痒而流黃水陰汗自出小腹

按之作水聲得於醉酒行房遇外邪結於囊中

筋瘤如黃瓜在小腹兩旁俗云便毒得於春夏大燠

氣勞於使內血滲入脬囊結氣癰腫

氣疝上連腎俞下及陰囊得於號哭忿怒氣鬱而脹

或勞役坐馬致核腫脹偏有大小者難治

狐疝狀如仰瓦臥則入小腹如狐之晝出穴而溺夜

入穴而不溺亦與氣疝大同

寒疝囊冷結硬如石陰莖不舉或控睪丸而痛得於

寒濕使內過勞久而無子此七疝之名從經旨也餘

皆謬妄不取凡疝久則成積盤附臍之上下左右爲

寒疝囊冷結硬如

腰膏

疝雖濕熱然生於陰起於下四氣每先傷足三陰部分所以遇外感而發。風證小腸陰筋走注痛甚有汗身痛烏頭桂枝湯遺泄者四君子湯加羌活附子。

寒證心痛筋縮肢冷食已則吐古梔附湯五積散加吳萸小茴及食鹽少許四製茱萸丸硫荔丸。

暑證小腹脹急溺澀香茹飲加瞿麥木通。

濕證身重小便不利大便或溏五苓散最妙濕熱入裏暴痛難當者加減柴苓湯加減八正散濕盛者導水丸三白散或復元通聖散加黑丑虛者十味蒼蘿散在表有寒熱者柴胡桂枝湯。

七情疝乍滿乍減濕熱者氣疝飲古萸連丸寒冷者蟠葱散生料木香勻氣散。

通用五苓散猪苓澤瀉分陰陽以和心與小腸白朮利腰臍間濕及死血茯苓利膀胱水木得桂則枯故用以伐肝木風換桂枝寒加紫蘇生薑鹽少許暑加白芍濕加白朮小腸氣加小茴膀胱氣加金鈴子橘核腎氣加檳榔木通少許。

凡疝痛走注無形屬氣痛有常處有形乃濕痰食積瘀血下聚而成。

痰疝海石香附二味薑汁調服痰飲食積守效丸。

食積瘀血者梔桃枳楂散失笑散食積挾熱者積疝丸食積挾虛者八味茴香丸。

虛疝暴痒四君子湯加川棟子茴香枳實山楂山梔按之不痛者加肉桂薑汁按之不定者用桂枝烏頭

山梔爲末薑汁糊丸薑湯下大能却痛久者三黃內

消丸凡虛疝不宜預補經云邪之所湊其氣必虛留而不去其病則實必先瀉其所蓄之熱而後補之是以諸方多借巴豆氣者此也虛甚上爲吐逆下有遺精者危要知濕熱爲病俱宜瀉南方補北方不可妄

用劑  
久成癥瘕腹滿氣積如臂者白葱散或理中湯加阿魏腹痛有塊盤臍旁者聚香飲子壺盧巴丸腹痛有塊附臍下者去鈴丸欲作奔豚者茯苓桂甘湯奔豚疝痛者大七氣湯加炒牽牛。

通用二陳湯加薑汁積加枳實山楂熱加山梔痛加橘核瘀血加延胡索桃仁鬱加木香茴香川棟子痛甚加乳香沒藥荔枝核大如斗加茴香青皮昆布海藻爲丸服水疝加豬苓澤瀉以逐水筋疝加黃連白朮茯苓以降火血疝合四物湯以調血不愈清肝益榮湯或清暑益氣湯氣疝加柴胡青皮香附行氣狐疝加青皮香附蒼朮逐氣流經更以蜘蛛十四枚桂枝五錢爲末蜜丸米飲下癩疝加吳萸薑桂溫散。

常用辛平破血消痰積之劑橘核散辛溫散氣溫散之劑五炒川棟丸四炒川棟丸金鈴丸四味茴香散古延蠍散辰砂一粒丹神聖代針散選用路岐。

腫痛者內服單蜘蛛方外用炒葱熨三五次後以消毒消腫藥加大黃木鼈子南星草烏敷之破者用生肌散其證小兒患之多因食積痰滯。

陰瘡

陰瘡由腎虛風濕相搏邪氣乘之瘡痒成瘡浸淫汁

出狀如瘡癬

姤精

姤精瘡因久曠房室思色動慾以致敗精流入莖內初發如粟赤腫潰爛作白痛痒妨悶。

陰蝕

陰蝕瘡因久曠房室思色動慾以致敗精流入莖內交合房室後又未洗浴男子腎虛邪穢滯氣遂令陰莖連睾丸腫痛小便如淋。

楊梅

經久潰爛侵蝕肌肉血出不止以成下疳瘡久不愈乃成楊梅瘡宜服仙遺糧湯預防之。

身體煩熱壯熱惡寒宜急治之陰血虛而有熱者小柴胡湯加參木芎歸腫痛發熱者四物湯加柴胡山梔濕熱腫痛破裂寒熱者小柴胡湯加膽草黃連青皮熱勝二便祕者八正散濕熱甚則腫痛澁澀及莖縮縱作痛或出自白津者龍膽瀉肝湯如氣虛者補中益氣湯加膽草山梔煩渴不止者竹葉黃芪湯腫潰後氣血虛而有火者八物湯加柴胡山梔無火大使軟者托裏散內托十宣散大要此證肝經陰虛爲本腫痛寒熱爲標宜常服腎氣丸若專治肝則誤矣。

莖中痒

莖中痒出自白津多因脾土軟弱不能滋生金木以致肝經血虛火燥宜補中益氣湯與清心蓮子飲間服蓋脾胃爲肝腎之源心實主之。

諸瘡治法

外治濕陰瘡藥蛤散銅綠散姤精瘡津調散蘆腦散陰蝕瘡鳳衣散下疳瘡旱螺散玉華破裂腫痛者鵝

管散爛臭成瘻者截疳散或用洗藥莖上生瘻久不合口者用經布燒灰蜜調塗上卽愈有陰毛間生蟲作痒者搗桃仁泥塗之

陰囊兩旁生瘻濕痒甚者牡蠣丹或連兩腿上生風濕瘻者硫磺散

### 囊癰

初起腫赤脹痛小便澀滯寒熱作渴當清肝火分消濕熱以泄之宜黑龍湯吞滋腎丸如或因入房囊腫大如斗許小腹脹悶濁發熱口乾痰壅命在反掌宜腎氣丸料加車前子牛膝煎吞滋腎丸滲利濕熱後仍腫痛者宜補陰托裏以速其膿而針之若膿焮而便祕者熱毒壅滯也宜托裏消毒散或又不減者熱毒未解也宜清肝益榮湯膿已成者活命飲

膿潰皮脫翠丸懸掛或內見筋一條不消陰囊悉腐

玉莖下面貼囊者亦腐如半邊筆管只宜托裏散加

故紙黃芪五味子菟絲子或四物湯加參木吞腎氣丸兼服補中益氣湯倍黃芪歸朮大補氣血脾胃切忌寒冷攻伐及淡滲損陰之藥外塗白蠟膏囊莖旬日可復雖曾去陰子亦無害

### 便毒

俗云便毒實血瘀也生腿膀小腹之間乃厥陰肝經及衝任督三脈隧道乃精氣出入之路也

或入房忍精或思色不遂或當泄不泄敗精凝滯爲瘀腫痛在膀胱之間先用五苓散利去敗精便祕加大黃有寒熱者小柴胡湯加山梔澤瀉後用腎氣丸

以補精兼逐瘀血

內有濕熱外被寒邪相拒敗瘀不得散治宜清肝火

活瘀血滲利腎經邪水體實二便難者兩解湯八正散挾鬱怒者流氣飲子或復元通氣散加花粉白芷青木香腫痛甚者活命飲濕熱壅滯者龍膽瀉肝湯體薄大便易小便澀者小柴胡湯加芎歸知藁澤瀉

或神效苦藺湯加柴胡山梔痛甚者活命飲去大黃濕熱因勞倦氣滯者補中益氣湯潰後俱宜托裏散八物湯加柴胡或十全大補湯久欲成漏者蠟蠍丸

單方用紫花地丁擂酒服最妙  
便毒左右兩邊俱發或先有瘻瘍而發或卒然起核疼痛而發用藥同前古方初起宜國老膏入皂角炭少許主之外用鳳尾草煎湯洗淨以明松香爲末日三次乾擦自愈愈後仍戒房室行動

### 張三錫醫學準繩六要

#### 前陰諸病

陰痿證方書云男子精盛而思室內經曰男子二八

精氣盛陰陽溢泄若夫斲喪太過精液枯竭則陽道痿弱不舉中年人雖舉亦不得壯者皆精力乏所致昧者悉指爲陽虛妄投桂附鎖陽菟絲助邪火煎熬真陰卒至毒發中風暴亡莫之能悟朱子曰有子

後一點不宜虧泄誠保命良方也人惟知慾而不知

重命鞭馬於危途良可太息倘無子而有此須大補氣血滋陰助精佐以鹿茸鹿角膠菟絲子一二味以兼補命門相火鼓舞元陽又須審氣血虛實肥人大補氣集靈膏瘦人大滋陰八味丸爲主

### 疳

陰痛宜舒鬱和血四物加香附紅花千金方有人陰冷漸漸入陰囊腫滿晝夜疼悶不已用上好川椒爲末帛包裹囊如不覺熱烘熱更妙以知爲度內煎大薊湯汁服妙陰冷兩丸如水出汗兩脚痿弱宜補肝湯

瘦人六味地黃丸加枸杞菟絲五味鹿角膠大效陰痿責之精衰斲喪太過所致經曰足厥陰之經傷於內則不起是也仲景八味丸特妙甚者加人參鹿

膠鹿茸或加蕤茇瓊陽枸杞是兼補右腎相火也按前論雖有不可妄投桂附等藥煎熬真陰之戒苟果屬真陽虧損卽當益火之源而又何必規規於斯論哉

陰汗陰臭俱屬下焦濕熱酒麪厚味過度而然龍膽瀉肝湯妙虛者內服青娥丸外用爐甘石蛤粉撲或密陀僧和蛇牀子研末撲之

陰汗多者二陳二木加風藥以勝之防風羌活藁本

之類

陰縮謂前陰受寒入腹內也陰縱謂前陰受熱挺長不收也經曰足厥陰之筋傷於寒縮入傷於熱則挺

縱不收

陰痒亦是肝家濕熱瀉肝湯妙瘦人燥痒屬陰虛坎離爲主外用蛇牀子煎湯洗之疊瘡同治要分虛實耳

陰莖痛足厥陰經氣滯兼熱用甘草梢蓋欲緩其氣耳若病淋而痛似難一槩治必用清肺氣而清濁自分氣虛六君血虛四物各加黃藥知母滑石石葦琥珀

### 珀

病後動淫卵痛大傷氣血而然八珍加肉桂附子病後陰腫連小腹及腿屬脾腎兩虛少食大便不實責之脾補脾爲先小水短少責之腎腎氣丸主之妙

在桂附

薛己醫按

懸癰

焮痛或發熱者清肝解毒

腫痛者解毒爲主

不作膿或不潰者氣血虛也宜補之

懸癰謂生於玉莖之後穀道之前屬足三陰虧損之

證輕則爲漏瀝盡氣血而亡重則內潰而卽隕若初

起濕熱壅滯未成膿而作痛或小便澀滯用龍膽瀉

肝湯腫焮痛甚仙方活命飲並以製甘草佐之如此

雖患亦輕雖潰亦淺若不能成膿或膿成不潰者八

珍散補之若膿已成者急針之欲其生肌收斂腎虛

者六味地黃丸血虛者四物加參木氣虛者四君加

芎歸脾虛者補中益氣湯氣血俱虛者八珍湯并十

全大補湯若用寒涼消毒則誤矣

懸癰原係肝腎二經陰虛惟一於補初起不治或膿

成而又尅伐不死何待常治初起腫痛或小便赤澀

先以製甘草一二劑及隔蒜灸更飲龍膽瀉肝湯若

發熱腫痛者以小柴胡加車前黃蘗芎歸膿已成卽

針之已潰用八珍湯加製甘草柴胡梢酒炒黃蘗知

母小便澀而脈有力者仍用龍膽瀉肝湯加製甘草

小便澀而脈無力者用清心蓮子飲加製甘草瀉清

不斂者用大補劑間以豆豉餅或久而不斂者亦用附子餅灸並效

水穀道前後生癰謂之懸癰乃肛門前陰囊後生核

出者其苦不可言近亦數月遠至一二年亦愈須是作核未痛以前以甘草膏治之不過一二服便自消此病初發如松子大漸如蓮子數十日後始覺赤腫如桃李卽破若破則難治服此藥雖不能急消過二十餘日必消盡矣投兩服亦無害大抵此證屬陰虛故不足之人多患之寒涼之劑不可過用恐傷胃氣惟製甘草一藥不損氣血不動臟腑其功甚捷可過用恐傷胃氣惟製甘草一藥不損氣血不動臟腑其功甚捷

便毒

內蘊熱毒外挾寒邪者解散之

勞役而患者補之

不遂交感或強固精氣致敗精而結者解之

濕熱而致者清肝導濕

便癰屬厥陰肝經內熱外寒或勞倦過度或房慾不

節或慾心不遂或強固其精或肝經濕熱而致治法

內熱外寒者雙解散勞倦過度者補中益氣湯房慾不

節者六味丸料慾心不遂者先用五苓散加大黃

疏其精滯後用地黃丸以補其肝腎強固其精或濕

熱壅滯者宜龍膽瀉肝湯疏肝導滯夫便癰血疝也

屬厥陰肝經之絡脈衝任督脈之隧道婦人患此多

在兩肋腫痛或腹中結塊小便澀滯苟治者得法患

者又能調攝何難斂之有若概用大黃等劑以求其

內消或令膿從便下損其氣血及不慎起居飲食者

皆爲不治

大抵便癰者血疝也俗呼爲便毒言不便處患之故

也乃足厥陰肝經絡及衝任督脈亦屬肝之旁絡也

是氣血流通之道路今壅而腫痛此則熱毒所致宜先疏導其滯更用托裏之劑此臨證制宜也

囊癰

腫痛未作膿者疏肝導濕

腫硬發熱者清肝降火

膿成腫痛者急針之更飲清毒之劑

已潰者滋陰托裏

膿清不斂者大補氣血

囊癰屬肝腎二經陰虛濕熱下注若小便澀滯者先

分利以泄其毒繼補陰以令其自消若濕熱退而仍

腫痛宜補陰托裏以速其膿膿焮而便祕者熱毒壅

閉也先用托裏消毒散後用針以泄之膿去卽解若

膿去而腫痛不減者熱毒未解也用清肝養榮湯口

乾而小便數者腎經虛熱也六味丸內熱晡熱者肝

經血虛也四物加參木體倦食少者脾氣虛熱也十全大補湯此

證雖大潰而羣丸懸露治得其法旬日肉漸生而愈

若專攻其瘡陰道益虛則腫者不能潰潰者不能斂

少壯者多成痼疾老弱者多致不起亦有患痔漏久

而患及於囊者當兼治其痔切忌寒藥尅伐虧損胃

氣

下疳

腫痛或發熱者肝經濕熱也清肝除濕

腫痛發寒者邪氣傳表也發散之

腫痛小便赤澀者肝經濕熱壅滯也疏肝導濕

下疳瘡屬肝經濕熱下注或陰虛火燥治法腫痛發熱者血虛而有熱也四物湯加柴胡山梔腫痛寒熱

者肝經濕熱也小柴胡湯加龍膽草黃連腫痛便濕者濕熱壅滯也龍膽瀉肝湯腫痛腐潰者氣血虛而有火也八物湯加山梔柴胡日晡熱甚者陰血虛而有熱也小柴胡湯加參术芎歸日晡倦怠者陽氣虛而下陷也補中益氣湯其經久不愈而發寒熱者腎水不能生肝木也用六味丸若筋縮縱或爲痙攣或出自津此筋病也用龍膽瀉肝湯氣虛者補中益氣加炒山梔炒龍膽陰虛火燥者用六味丸莖中痒出白津用補中益氣湯與清心蓮子飲間服蓋此證肝經陰虛爲本腫痛寒熱等證爲標須用六味丸以生肝血凡脾土虛不能生金水而見一切肝證者當佐以補中益氣湯加麥門冬以滋化源

李中梓醫宗必讀

### 疝論

愚按內經所謂任脈爲病內結七疝合言疝證之原也所謂衝疝狐疝癩疝厥疝瘕疝癓疝分言七疝之狀也巢氏不能詳考內經原具七疝乃強分厥疝寒氣盤附狼自附於內經之七疝不亦妄乎宜張子和非之曰此俗工所立謬名似矣及其立論但辨陰器與小腸膀胱腎了不相干專屬肝經受病竟不知任脈爲七疝之原亦不知經文自有七疝散見於各論之中又添寒水筋血氣狐疝之七種此其疝謬與巢氏未有以異也若言疝爲筋病皆挾肝邪則可若言止在厥陰一經不亦與內經相戾耶且執病在下者引而竭之不問虛實槩與攻下其禍有不可勝言者豈待下後始補而可回其生乎學者但當以內經爲正不當惑於多岐丹溪以爲疝證皆始於濕

熱蓋大勞則火起於筋醉飽則火起於胃房勞則火起於腎大怒則火起於肝火鬱之久濕氣便盛濁液凝聚并入血隧流於厥陰肝性急速爲寒所束宜其痛甚此亦補前人未備之一端不可守爲揆度也故夫治法寒則多痛熱則多縱濕則腫墜虛者亦腫墜在血分者不移在氣分者多動蓋羣丸有兩左丸屬水水生肝木木生心火三部皆司血統納左之血者肝也右丸屬火火生脾土土生肺金三部皆司氣統納右之氣者肺也是故諸寒收引則血泣而歸肝下注於左丸諸氣積鬱則濕聚而歸肺下注於右丸且羣丸所絡之筋非盡由厥陰而太陰陽明之筋亦入絡也故患左丸者痛多腫少患右丸者痛少腫多此確然者耳

巢氏七疝證厥疝者厥逆心痛吐食癥疝者氣乍滿心下痛氣積如臂寒疝者寒飲食脅腹盡痛氣疝者乍滿乍減而痛盤疝者臍旁作痛附疝者臍下有積氣狼疝者小腹與陰相引痛大便難

小腸氣乃小腸之病小腹引羣丸必連腰脊而痛小腸虛則風冷乘間而入邪氣既入則厥而上冲肝肺控引羣丸上而不下

治療法  
膀胱氣乃小腹腫痛不得小便是也

狐疝者臍則入腹立則出腹是也仲景治狐疝時上

時下者蜘蛛散或用牡蠣六兩鹽泥固濟炭三斤煅至火盡取二兩乾薑一兩焙爲細末二味和勻水調得所塗痛處小便大利即愈

癩疝者陰囊腫大如升如斗甚而如栲栳大者三層

茴香丸荔枝散宣胞丸地黃膏子丸木腎不痛南星半夏黃芩蒼朮枳實山楂白芷神鞠滑石茱萸昆布酒糊丸空心鹽湯下雄楮葉不結子者曬乾爲末酒糊丸鹽湯下又用馬鞭草搗塗效

厥疝者脾受肝邪氣逆有積肝邪甚者當歸四逆湯川苦棟散木香棟子散

瘕疝者脾傳腎少腹熱痛出自即巢氏之癩疝子和之筋疝也丹溪所謂內鬱濕熱者與此疝相似烏頭梔子湯或加橘核桃仁吳茱萸丹溪云陽明受濕熱傳入太陽發熱惡寒小腹閉痛梔子桃仁枳實山楂

等分同煎加生薑汁

癓疝乃足陽明筋病內有膿血即巢氏之附疝子和之血疝也宜用桃仁延胡索甘草茯苓白朮枳實山楂橘核荔枝核

癰瘍疝者內有膿血小便不通加味通心散或五苓散加桃仁山楂

氣上冲心二便不通巢氏狼疝略似宜用木香散龔信古今醫鑑

### 疝病治法

寒疝宜以溫劑下之禹功散加味五苓散下青木香丸或五積蟠忽之類水疝宜禹功散三花神祐丸導藥下之蕩疝丸或蟠葱散主之狐疝宜以逐氣流經之劑下之癓疝宜去濕之劑下之三花神祐丸之類元神虛弱受寒作小腸疝氣滾痛以蟠葱散加故紙小茴川棟子木香之類體壯實小腸氣痛或小便不

通以八正散加破故紙小茴香川棟子

陰腫

夫陰腫者皆由膀胱蘊熱風濕相乘或濕熱流注或  
疝氣攻作或暴風客熱及小兒啼叫怒氣結聚或蟲  
蟻吹毒所致詳其所因施以方治

疝

疝脈緊急洪數則爲熱痛經言脾傳之腎病名曰疝  
瘕少腹煩冤而痛出自名曰蠱註言少腹痛溲出自  
液也一作客熱內結銷鑠脂肉如蠱之食故名曰蠱  
然經復言熱爲疝瘕則不止爲寒當以脈證辨之  
辨疑錄云每見男子小腸疝氣痛不可忍陰囊腫大  
或偏墜一邊發作之時小腸捫之聲如青蛙狀如桃  
李木爪衝上則面黑墜下則仆地病者不勝痛苦諸  
醫治療莫測其機有云疝本肝經與腎經絕無相干  
恐爲未備之說原夫疝氣肝經屬本心腎屬標疝者  
多濕熱怒氣傷肝房勞過度心腎包絡鬱結小腸皮  
裏膜外氣聚無出以致如斯或曰以心腎爲標今以  
房勞過傷是獨言其腎也譬如小兒偏墜無房勞斯  
疾何由而作也曰小兒因稟父母濕熱氣鬱小腸而  
成偏墜皆不作疼痛至於中年房勞過度戕其真氣  
作寒氣或作鬱結而治每用香燥及用大黃牽牛巴  
霜利其大便元氣轉傷而病愈甚予考小腸多氣少  
血之經心氣鬱結則腑受邪肝氣一盛則子亦盛矣  
故二氣攻入小腸膀胱而痛病者但以手捫之可忍  
殊不知皮膜漸寬其氣愈熾服藥不能避忌年遠根  
深故難救治每用五苓散內加行氣之藥獲效者多

利小便以出邪者鮮矣按藥性猪苓澤瀉分理陰陽  
以和心與小腸之氣白朮調脾并利臍腰間濕及死  
血茯苓淡利膀胱之水桂能伐肝邪茴香善治小腸  
之氣金鈴子橘核去膀胱之氣檳榔下氣少加木通  
以爲導引小腸之邪出也屢用屢驗

木腎是濕熱頑癆結硬如痰核之類反不痛是也治

宜溫散疏利以逐之

王肯堂證治準繩

疝論

或問疝病古方有以爲小腸氣者有以爲膀胱氣者  
唯子和丹溪專主肝經而言其說不同何以辨之曰  
小腸氣小腸之病膀胱氣膀胱之病疝氣肝經之病  
三者自是不一昔人以小腸膀胱氣爲疝者誤也殊  
不知足厥陰之經環陰器抵少腹人之病此者其發  
睪丸脹痛連及少腹則疝氣之係於肝經可知矣小  
腸氣俗謂之橫弦豎弦遶臍走注少腹攻刺而膀胱  
氣則在毛際之上小腹之分作痛與疝氣之有形如  
瓜有聲如蛙或上於腹或下於囊者不同也但小腸  
膀胱因經絡並於厥陰之經所以受病連及於肝則  
亦下控引睪丸爲痛然止是二經之病不可以爲疝  
也

趙以德曰此條本爲睪丸之證立名然內經以疝者  
痛也有腹中臟腑之痛一以疝而名者故通叙於此  
其腹中五臟之疝得以就此而考焉有睪丸之痛內  
經謂任脈爲病男子內結七疝女子帶下瘕聚衝脈  
爲病逆氣裏急然稱任脈有七疝之名而無七疝之  
狀及按諸篇以雙字命其名曰癰疝者以三陽爲病

發寒熱瘻厥其傳爲癰疝及陽明司天陽明之勝肝  
是動病足陽明筋病皆爲癰疝謂厥疝者面黃脈之  
至大而虛有積氣在腹中有厥氣名曰厥疝謂疝瘕  
以脾邪傳之腎病名疝瘕少腹冤熱而痛出自一名  
曰蠱謂衝疝者以衝任督生病上衝心痛不得前後  
謂卒疝者邪客厥陰之絡則卒疝暴痛與厥陰之別  
蠡溝氣逆亦睪丸卒痛謂癰瘻疝者厥陰之陰盛而  
脈不通謂狐疝者肝所生病也殆非及此雙字之  
名者由任脈行諸經之會而有七疝者歟此外獨稱  
一字疝者則有太陰在泉主勝則寒氣逆滿甚則爲  
疝有太陽在泉少腹控睪上引心痛有少腹痛不得  
大小便名曰疝得之寒有足太陰經病陰器紐痛上  
引臍有心疝脈急小腸爲之使少腹當有形有腎脈  
大急滑皆爲疝心脈搏滑急爲心疝肺脈沉搏爲肺  
疝三陰急爲疝靈樞有謂心脈微滑爲心疝肝脈滑  
甚爲癰疝脾脈微大爲疝氣腹中裹大膿血在腸胃  
之外滑甚爲癰瘻疝脈甚爲癰瘻諸脈之滑者  
爲陽氣甚盛微有熱夫如是者名爲七疝中分邪氣  
之寒熱者也內經又云厥陰滑則病狐疝風少陰脈  
滑病肺風疝太陰脈滑病脾風疝陽明脈滑病心風  
疝太陽脈滑病腎風疝少陽脈滑病肝風疝所言風  
者非外入之風由肝木陽臟自動之風也故經云脈  
滑曰風然連以疝稱者蓋腎肝同居下焦而足厥陰  
佐任脈之生化因肝腎之氣並逆所以任之陰氣爲  
疝肝之陽氣爲風所以風疝連稱也李東垣謂脈滑  
者爲丙丁火熱併於下不勝壬癸從寒水之化故生  
癰疝亦用熱治內經亦不專主尺部而言也豈不爲

外寒鬱內熱之故乃曰熱火從寒化恐理未當而經更有莖垂者身中之機陰陽之候津液之道也或飲食不節喜怒不時津液內溢下流於睪血道不通日久不休俛仰不便趨翔不能此病榮然有木不上不下若此者亦癩疝之一也張仲景言疝皆由寒邪得之亦同內經之云脈緊者當溫散之或曰內經言疝似若各從諸經脈所生今子何爲盡屬於任脈乎曰任脈是疝病之本源各經是疝病之支流何以言之蓋腎臟以四方分部者言則屬五行之寒水以居在下位者言則屬地道之陰陰形偶故腎有兩其形兩則地道之剛柔立焉包居兩形之間出納腎臟之精血以行坤土之化生成百骸萬象及夫生長壯老已之天癸與作強技巧之用悉在於斯然而坤土居尊不自司其職司其職者乃衝任二脈起於胞中者行其化也是故五臟六腑之經皆受氣於六脈因以海名之所以二脈貴乎流通而惡閉塞流通則天之陽絕故地之陰亦結而百病作矣故疝是二者所致也任脈之病者若剛柔自相勝負與內外邪之感傷皆得使其陰陽不和陰偏勝則寒氣衝擊陽偏勝則熱氣內入陰反之外悉致任脈爲疝縱其邪不自任脈而起初由各經所受而得者亦必與任脈相犯故也所犯者何或所勝之經脈相傳或受不以次所乘或任脈過處與受邪之經相會或六經受氣之際挾邪犯其海則皆足以感動任脈內含結固不化之陰上擊臟腑則爲腹中之疝下入厥陰會於陰器則爲睪九之疝蓋疝自立名獨爲任脈所職在地之陰特然起

擊者而命之也若諸經受邪不與任脈相干則不名爲病矣不然何內經舉痛篇靈樞百病始生篇專爲發明經脈腹中諸痛者乃無一字名其疝也此可見任脈者是疝病之本源諸經所云疝者是其支流餘裔耳若夫巢氏所叙七疝曰厥癓寒氣盤附狼及言諸疝之候止以陰氣積於內爲寒氣所加使榮衛不調血氣虛弱故風冷入於腹內而成疝也小兒疝者陰核腫大由啼哭腹氣不止動於陰氣結聚不散所致者也觀於五疝皆是痛在心腹之疝獨舉癩疝屬小兒病後人述其說更舉內經謂脾風傳之於腎名曰蠱疝瘕少腹煩冤而痛一名曰蠱者謂之蠱病又立陰疝條卽癩疝也將以足七疝之數此言五條爲之如靈樞謂小腸病者小腹痛腰脊控睪丸而痛之外證之可辨若果有膀胱小腸之證者又安得不從類論治法亦然因病在下必先下之更不問虛弱之人於首尾不可下者下之有不旋踵之禍豈待下後始補而可回其生乎然而戴人之書其詞直其義明讀之使人豁然以去胷中之茅塞誠是諸醫書之冠及乎詳究之則少溫潤反覆之意且夫陰陽變化生病於無窮治法亦無窮非一人所能究學者當因其已明益其未至然後得爲善用其書者丹溪先生嘗論睪丸連小腹急痛者或有形或無形或有聲或無聲人皆以爲經絡得寒收引不行而作痛不知此病始於濕熱鬱遏至久又感外寒濕熱被鬱而作痛也其初致濕熱之故蓋大勞則火起於心醉飽則火起於胃房勞則火起於腎大怒則火起於肝火鬱之久濕氣便盛濁液凝聚并入血隧流於厥陰肝屬木性急速火性又暴烈爲寒所束宜其痛甚而暴也此論亦就厥陰受病處發明戴人之未至者也誠有功於後學蓋癩疝不離此三者之邪熱則縱寒則痛濕則腫須分三者多少而治之兩丸俱病固然也設有偏於一者予又不能無其說焉腎有兩分左右其左腎

厥陰部分受病之原立說所以不及於任脈然已三見於論中矣其間引治疝之穴多與任脈所會一也又稱衝任督與厥陰會於曲骨環陰器二也復言凡精滑白淫皆男子之疝也血涸不月月罷腰膝上熱溢乾少腹有塊女子之疝也但女子不謂之疝而謂之瘕卽任脈內結之病尤明三也凡戴人辨論之詞強直專主其一則不復顧其二在癩疝中有無六經外證之可辨若果有膀胱小腸之證者又安得不從之如靈樞謂小腸病者小腹痛腰脊控睪丸而痛之外證之可辨若果有膀胱小腸之證者又安得不從類論治法亦然因病在下必先下之更不問虛弱之人於首尾不可下者下之有不旋踵之禍豈待下後始補而可回其生乎然而戴人之書其詞直其義明讀之使人豁然以去胷中之茅塞誠是諸醫書之冠及乎詳究之則少溫潤反覆之意且夫陰陽變化生病於無窮治法亦無窮非一人所能究學者當因其已明益其未至然後得爲善用其書者丹溪先生嘗論睪丸連小腹急痛者或有形或無形或有聲或無聲人皆以爲經絡得寒收引不行而作痛不知此病始於濕熱鬱遏至久又感外寒濕熱被鬱而作痛也其初致濕熱之故蓋大勞則火起於心醉飽則火起於胃房勞則火起於腎大怒則火起於肝火鬱之久濕氣便盛濁液凝聚并入血隧流於厥陰肝屬木性急速火性又暴烈爲寒所束宜其痛甚而暴也此論亦就厥陰受病處發明戴人之未至者也誠有功於後學蓋癩疝不離此三者之邪熱則縱寒則痛濕則腫須分三者多少而治之兩丸俱病固然也設有偏於一者予又不能無其說焉腎有兩分左右其左腎

屬水水生肝木木生心火三部皆司血統納左之血者肝木之職也其右屬火火生脾土土生肺金三部皆司氣統納右之氣者肺金之職也是故諸寒收引則血泣所以寒血從而歸肝下注於左九諸氣膚鬱則濕聚所以濕氣從而歸肺下注於右丸且夫睪丸所絡之筋非盡由厥陰而太陰陽明之筋亦入絡也往往見人偏患於左丸者則痛多腫少偏於右丸者則痛少腫多此便可驗也

### 懸癰

懸癰生於篡間謂前陰之後後陰之前屏翳處也卽會陰穴屬任脈別絡俠督脈衝脈之會癰生其間人起立則若懸然故名懸癰

### 便毒

鬼遺云腿脛兩旁處起爲便毒膀胱兩臂尖下穀道前水道後成懸癰皆是虛極若近穀道左右亦名痔癰宜急補脾臟及發處貼藥卽用發穴散破後用抽膿膏膿盡用合瘡口散慎勿過冬卽成冷漏難治便毒生於小腹下兩腿合縫之間初發寒熱交作腿間腫起疼痛是也夫腎爲作強之官所藏者精與智男女大慾不能直遂其志故敗精搏血留聚經隧乃結爲便毒矣蓋合縫之間精氣所出之路也或觸景而動心或夢寐而不洩既不得偶合陰陽又不能忘情念故精與血滯而成腫結也初起切不可用寒涼之藥恐氣血愈滯不得宣通反成大患惟當開鬱散氣清利熱毒使精血宣暢則自然愈矣

前論爲思想無窮所願不遂者設而意猶未完果如此論當僧尼婦宮人曠夫多有此患然予目擊商

賈中野合不潔淫妓便構此疾或疳瘡或楊梅者亦由慾火淫熾一旦交合不潔爲淫火冲動膚腠開通是以受毒初發之時慎不宜以敗毒之藥瀉之何也毒邪非虛不入若復虛胃氣則毒邪下陷治之非彌年累月不愈也捷法只宜發汗其次利小便膚腠所

感之邪易散也陰莖腿縫皆肝經絡肝腎主下焦又肝主小便使毒邪從小便中出所治皆順也故治之不旬日便可奏功若曾已發汗利小便體厚邪固而不得宣通者乃以破毒活血調氣之劑攻之俟毒氣宣通隨以補劑托之亦不失先後著也

### 陰瘡

陰器屬足厥陰肝經任脈之會素問云厥陰之脈絡陰器繫於肝靈樞曰筋者聚於陰器而脈絡於舌本肝者筋之會也又屬督脈素問曰督脈者其絡循陰器合篡間是也至於足太陽外合清水內屬膀胱而通水道手太陽外合淮水內屬小腸而水道出焉則又屬手足太陽也腎主水則又屬足少陰也飲入於胃游溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱則又屬手太陰也素問又謂前陰者宗筋之所聚太陰陽明之所合則又屬脾與胃矣癰瘡生其間須細心求而責之不可專主一厥陰肝經而惟清肝導濕之爲事斯無誤矣

毛際瘍或問小腹至陰之下玉莖之根痒極沸湯沃之稍止證爲腎臟風瘡生於陰頭爲陰頭癰生於竅口爲下府瘡今但生於陰莖者皆爲下疳姑從之

而復作有三四竅黃水淋漓何如曰此廣瘡結毒也詢之幼時會生惡瘡旬日後大痛腫甚飲食少進作結毒治之

### 吳崑醫方考 七瘡方論

痘隱疾也證有七皆有虛實今考七方誌七瘡耳若虛實之辨則在夫人之變通也

寒瘡腰痛牽引睪丸屈而不伸尺內脈沉遲者吳茱萸加附子湯主之夫七瘡寒水筋血氣狐癩也寒瘡之由是寒客下體如坐於卑冷涉於寒淵所致寒氣自外入內束其少火鬱其肝氣故令腰痛痛而牽引睪丸者肝之經絡環陰器也寒主收引故屈而不伸尺內主腰以下脈沉遲陰脈也寒亦明矣故用吳茱萸附子之辛熱以溫其寒生薑大棗之辛溫以和其氣邪傷之後其正必虛人參之補以去其虛

水瘡者腎囊腫大陰汗不絕升陽除濕湯主之子和云水瘡者得之飲水醉酒勞於使內其言當矣蓋飲水醉酒則濕氣勝勞於使內則腎氣虛腎氣虛則濕勝而流坎也故令腎囊腫大如水晶陰汗下漑如鱗漏內經曰下者舉之又曰風能勝濕是方也柴胡羌活蒼朮防風升麻葛本蔓荆獨活皆味辛而氣清風藥也升藥也故可以勝濕升陽而黃芪之甘可使托其陷下之氣甘草之溫可使培其防水之土當歸之潤可使調榮血於風藥之隊也胃苓湯亦可酌用外腎因撲損而傷睪丸偏大有時疼痛者此中有死筋瘤者甘草梢黑豆湯主之夫筋瘤者莖筋掣痛挺

脹不堪也子和云此以邪術得之邪術者房術春方

之類也治宜解毒緩急故用甘草梢黑豆以主之

氣疝者拂鬱則睪丸腫大悲哀則不藥而消虎潛丸

主之蓋邪之所湊常乘其虛拂鬱而睪丸腫大者肝

氣乘腎之虛也悲哀不藥而消者氣有所泄也夫肝

腎之病同一治故知藥熟地芍藥牛膝當歸瑣陽味

厚之品補腎補肝龜得天地之陰氣最厚虎得天地

之陰氣最雄以血氣中之陰類以補陰欲其同氣相

求耳陳皮者取其能推陳腐之氣羊肉者取其能補

五臟之陽也或問何以不用橘核枳實細辛川棟子

青皮之輩余曰此皆破氣藥也昔醫固多用之然而

治標云爾况蹈重虛之戒乎氣實者用之可也

狐疝者晝則氣出而腎囊腫大令人不堪夜則氣入

而腫脹皆消略無疾苦補中益氣加黃蘆知母湯主

之病愈而止夫狐之爲物也晝則出穴而溺夜則入

穴而不溺以斯證肖之故曰狐疝夫晝陽也夜陰也

晝病而夜否者氣病而血不病也故用人參黃芪白

朮甘草以益氣方內有升麻柴胡則能舉其陷下之

陽方內有黃蘆知母則能益夫不足之坎當歸味辛

可以活其壅滯之血陳皮氣芳可以利其陳腐之氣

或問何以不主辛香流氣之劑余曰本以氣不足而致疾復以流氣之劑主之非惟無益而又害之矣

癩疝者頑疝也睪丸雖大而無疾苦也此以父子相傳得於有生之初已然非若有生之後三因所致之

疾也故不必主治或有先是癩疝後來疼痛疾苦者

此兼前件六證也宜於前方消息之

陳實功外科正宗

腎囊風 腎囊風乃肝經風濕而成其患作痒喜浴熱湯甚者吉宜銀杏無憂散津調擦之內服六味地黃丸每斤加蜜炒黃蘆一兩薑薑五錢以清化源愈後不發

### 陰蝨

陰蝨又名八脚蟲也乃肝腎二經濁氣而成生此不吉宜銀杏無憂散津調擦之內服六味地黃丸每斤加蜜炒黃蘆一兩薑薑五錢以清化源愈後不發

### 下疳

下疳者邪淫慾火鬱滯而成其來有三一由男子慾念萌動陽物興舉淫火猖狂而未經發泄者以致敗精濁血流滯中途結而爲腫者一也二由婦人陰器

瘀精濁氣未淨接與交媾以致淫精傳襲而成者二也三由房術熱藥塗抹玉莖洗搽陰器興助陽火煽動陰精僥倖不衰久頓不泄多致火鬱未發而成者

三也男子萌念火鬱之證初起先必澀淋小便溺痛

次流黃濁敗精陽物漸損甚則腫痛腐爛法當疏利

肝腎邪火如八正散清肝導滯湯之類是也婦人陰

器不潔初起皮膚腫光亮甚則如水晶皮破流水腫

痛日生痒麻時發治當解毒消風如龍膽瀉肝湯

陽方內有黃蘆知母則能益夫不足之坎當歸味辛

可以活其壅滯之血陳皮氣芳可以利其陳腐之氣

或問何以不主辛香流氣之劑余曰本以氣不足而致疾復以流氣之劑主之非惟無益而又害之矣

癩疝者頑疝也睪丸雖大而無疾苦也此以父子相

傳得於有生之初已然非若有生之後三因所致之

疾也故不必主治或有先是癩疝後來疼痛疾苦者

此兼前件六證也宜於前方消息之

### 看法

初起不紅不腫睡不舉陽玉莖微損小水自利者輕時興舉治當瀉火解毒如黃連解毒湯蘆薈丸之類是也外以銀粉散珍珠散人中白散選用又有先發時瘡悶用熏條擦藥結毒於此者詳結毒門

初起不紅不腫睡不舉陽玉莖微損小水自利者輕已成微熱腫皮色光亮小便赤色更兼白濁者平

已損肉色紅活焮熱堅腫小便不疼大便不祕者易初起小便淋漓傷損陽物堅硬作疼腐爛漸開者險已成腐潰內攻傷損玉莖色紫無膿疼如針刺者重

### 治法

初起腫痛發熱小水澀滯肝經濕熱也宜瀉肝滲濕腫痛堅硬焮發寒熱口燥咽乾大便祕者通利二便玉莖腫痛小便如淋自汗盜汗時或尿血清心滋腎莖竅作痒時出白濁發熱口乾津液少者益腎清心瀉後腫痛小便赤澀日則安靜夜則痛甚滋陰瀉火

瀉爛不已腫硬又作疼痛日深穢氣不回清肝解毒魚口便毒

夫魚便者左爲魚口右爲便毒總皆精血交錯生於兩胯合縫之間結腫是也近之於小腹之下陰毛之間結腫名曰橫痃又名外疝是也得之入房忍精強固不洩或慾念已萌停而不遂以致精血走動凝滯結而爲腫治當散滯行瘀通利大小二便九龍丹山甲內消散是也七日已後服之根本堅固恐其作膿宜用火針法刺之亦妙已出膿者十全大補湯服之庶易收斂遲則恐生別證難愈

### 看法

初起結腫不紅微熱行走稍便無寒熱交作者爲輕已成紅赤腫痛發熱焮疼舉動艱辛至夜尤甚者易已潰爛稠肉色紅活腫消痛止新肉易生作痒者順初起結腫堅硬如石硬強刺疼起坐不便寒熱者重已潰肉爛腫痛不減膿水清稀孔深口大不斂者險

初起漫漫結腫疼痛兩胯牽強身發寒熱宜散表邪

### 治法

已成堅硬發熱疼痛內熱口乾大小便祕宜通利之發散疏利之後腫痛仍作欲其作膿宜用托裏消毒

焮腫發熱疼痛日久急脹苦甚內膿已成宜急開之

已潰之後膿水不乾新肉生遲不斂健脾胃補氣血

### 囊癰

夫囊癰者乃陰虛濕熱流注於囊結而爲腫至潰後

犀丸懸掛者猶不傷人以其毒從外發治當補陰清利濕熱取效者十有八九近時人悞用疝家熱藥多致熱甚爲膿後難收斂初宜龍膽瀉肝湯稍久滋陰內托散外敷如意金黃散俱可內消又一種水瘤皮色光亮無熱無紅腫痛有時空囊聚水宜用針從便處引去水氣則安如腫痛日久內膿已成脹痛者可速針之內服十全大補湯加山茱萸牡丹皮澤瀉治之間以六味地黃丸服之亦愈

### 看法

初起不紅微腫腎子引痛不作寒熱起坐自便者輕已成紅腫發熱形色光亮疼痛有時飲食有味者順已潰膿稠腫消痛止新肉漸生不痛作痒收斂者吉潰後腐爛囊皮脫落甚者犀丸突出能食不疼者可初起堅硬紫色日夜痛甚小水不利大便瀉泄者重已成堅而不潰頭腐無膿疼痛無時常流血水者重潰後膿口開張腫痛不減身發寒熱睡臥不寧者險

### 治法

初起寒熱交作腎子腫痛疼連小腹者宜發散寒邪已成紅腫發熱口乾焮痛小水不利大便祕者利之已潰疼痛不減膿水清稀朝寒暮熱者宜滋陰內托潰後不能收斂日晡發熱飲食減少者宜養血健脾

潰後犀丸懸掛不能收斂者當外用生肌內加補托

### 懸癰

夫懸癰者乃三陰虧損濕熱結聚而成此穴在於穀道之前陰器之後又謂海底穴也初生狀如蓮子少

痒多痛日久漸如桃李赤腫焮痛欲潰爲膿破後輕則成漏重則瀝盡氣血變爲瘍瘵不起者多矣初起

時元氣壯實宜用九龍丹瀉去病根稍虛者內消沃雪湯利去濕熱亦有可消者十中三四如十餘日後

腫勢已成不得內消宜托裏消毒散加山甲皂角刺服之自破如腫高光亮膿熟不破頭者用針急破之穢膿一出其患易安如膿出之後朝服六味地黃丸

午服十全大補湯加丹皮澤瀉溫補滋陰如厚味膏梁氣體壯實者初服龍膽瀉肝湯潰後滋陰八物湯以清蘊熱體瘦房勞氣血虛弱者初服八珍湯加澤瀉製甘草潰後十全大補湯加丹皮熟附子脾弱者

補中益氣湯以滋化源日久成漏者國老膏化湯吞服蠟礬丸首尾悞服寒涼損胃傷脾冰凝氣血以致患孔漸開穢膿不止者定變成虛羸瘍瘵終爲難愈

### 看法

初起如松子漸大若梅李紅赤腫痛光亮發熱者輕已成高腫作痛根脚不散皮薄易破膿成脹痛者易已潰膿稠而黃氣味不臭焮腫易消痛止作痒者順初起色紫堅硬根脚漫腫痛連脣膝二便不利者重已潰瘍如黃瓜紫斑腐爛穢水無膿痛甚氣息者難

### 治法

初起寒熱如瘡喜覆衣被口乾好飲熱湯宜發散已

成焮熱作痛內熱口乾喜冷大便祕澀者微利之日久內膿已成不破頭而脹痛者急針之法當補托潰後膿水清稀虛熱不退腫痛不消者宜滋陰健脾胃口不斂飲食減少餘腫不消新肉不生峻補脾胃

### 醫門法律

臣喻昌著

凡治水腫病遇少腹素有積塊疝瘕誤行發表攻裏致其人濁氣上衝督脈大嘔大逆痛引陰筋卒死無救者醫殺之也

發明金匱腹痛脈弦而緊弦則衛氣不行卽惡寒緊則不欲食邪正相搏卽爲寒疝寒疝繞臍痛若發則自汗出手足厥冷其脈沉弦者用大烏頭煎絲內經心疝之名推之凡腹中結痛之處皆可言疝不獨犀丸間爲疝矣然寒疝繞臍痛其脈陽弦陰緊陽弦故衛氣不行而惡寒陰緊故胃中寒盛不殺穀邪卽胃中之陰邪正卽胃中之陽氣也論胃中水穀之精氣與水穀之悍氣皆正氣也今寒入榮中與衛相搏則榮卽爲邪衛卽爲正矣繞臍腹痛自汗出手足厥冷陽微陰盛其候危矣故用烏頭之溫合蜜之甘入胃以建其中而緩其勢俾衛中陽旺榮中之邪自不能留亦不使虛寒自下而上之微旨也

### 看法

初起如松子漸大若梅李紅赤腫痛光亮發熱者輕已成高腫作痛根脚不散皮薄易破膿成脹痛者易已潰膿稠而黃氣味不臭焮腫易消痛止作痒者順初起色紫堅硬根脚漫腫痛連脣膝二便不利者重已潰瘍如黃瓜紫斑腐爛穢水無膿痛甚氣息者難

### 治法

初起寒熱如瘡喜覆衣被口乾好飲熱湯宜發散已

前陰門三

張介賓景岳全書

陰器縱痿 下疳 痘論 論治

陳士鐸石室祕錄

強陽不倒 痰陽不振 狐

方一	固真湯	升陽除濕湯	龍膽瀉肝湯
陰汗	溫腎湯	補肝湯	清震湯
燒散	濕痒方	蟠葱散	大蒜丸
湯	鴟肝清熱湯	烏金散	銅綠散
湯	摻藥	加味小柴胡湯	隔紙膏
湯	洗方	又方	防風羌活
茯苓	補心湯	補心養胃湯	乳香黃芩
散	水黃膏	一抹散	托裏流氣
散	敗毒散	洗方	麻黃
散	疳瘡散	又方	當歸四逆
湯	羊內湯	葱白散	神聖代
內消丸	牡蠣丹	加減柴芩湯	金鉢
散	蕩痛丸	天台烏藥散	立去
散	三疝湯	橘核散	桂附
鈴丸	加味通心飲	蠲痛丸	桂附
效散	茱萸內消丸	楊氏麝香丸	桂附
散	加減內消丸	金鈴子丸	桂附
香	安腎湯	川楝散	桂附
烏龍丸	加減香芩散	馬蘭花丸	桂附
丸	加減內消丸	吳茱萸湯	桂附
浴毒湯	同春散	四味茴香散	桂附
十全大補湯	助陽散	活血散	桂附
香附通氣湯	四炒川棟丸	乳香龍骨散	桂附
香附通氣湯	十味蒼蘋散	木香金鉢	桂附
香附通氣湯	全蠍散	牡蠣散	桂附

凡男子陽痿不起多由命門火衰精氣虛冷或以七情勞倦損傷生陽之氣多致此證亦有濕熱熾盛以致宗筋弛縱而爲痿弱者譬以暑熱之極則諸物綿萎經云壯火食氣亦此謂也然有火無火脈證可別但火衰者十居七八而火盛者僅有之耳  
凡思慮焦勞憂鬱太過者多致陽痿蓋陰陽總宗筋之會會於氣街而陽明爲之長此宗筋爲精血之孔道而精血實宗筋之化源若以憂思太過抑損心脾則病及陽明衝脈而水穀氣血之海必有所虧氣血虧而陽道斯不振矣經曰二陽之病發心脾有不得隱曲及女子不月者卽此之謂  
凡驚恐不釋者亦致陽痿經曰恐傷腎卽此謂也故凡遇大驚卒恐能令人遺失小便卽傷腎之驗又或於陽旺之時忽有驚恐則陽道立痿亦其驗也  
命門火衰精氣虛寒而陽痿者宜右歸丸贊育丹石刻安腎丸之類主之若火不甚衰而止因血氣薄弱者宜左歸丸斑龍丸全鹿丸之類主之  
凡思慮驚恐以致脾腎虧損而陽道痿者必須培養心脾使胃氣漸充則衝任始振而元陽可復也宜七福飲歸脾湯之類主之然必大釋懷抱以舒神氣庶能奏效否則徒資藥力無益也其有憂思恐懼太過者每多損抑陽氣若不益火終無生意宜七福飲加

桂附枸杞之類主之

凡肝腎濕熱以致宗筋弛縱者亦爲陽痿治宜清火以堅腎然必有火證火脈內外相符者方是其證宜滋陰八味丸或丹溪大補陰丸虎潛丸之類主之如火之甚者滋腎丸大補丸之類皆可用

### 痘論

痘氣病者凡小腹睾丸爲腫爲痛止作無時者皆是也但痘證不一如內經所謂狐痘者以其出入不常也有言癩痘者以其頑腫不仁也有衝痘者以其自少腹上衝而痛也有厥痘者以結氣在陰而氣逆爲痘也有痘瘻者以少腹冤熱而痛出自一名曰蠱也有六經風痘者如四時刺逆從論所言者是也有小腸痘者如邪氣臟腑病形篇所言者是也凡此七者總皆痘之爲義然痘之爲病不獨男子有之而婦人亦有之經曰有積氣在腹中有厥氣名曰厥痘女子同法又曰厥陰所謂癩痘婦人少腹腫也至若衝痘瘕之屬亦皆男婦之所同病者然惟睾丸之病獨在男子而他則均當詳察也觀張子和曰夫遺溺閉癃陰痿脬痹精滑白淫皆男子之病也若血涸不月月罷腰膝上熱足蹠隘乾癰閉少腹有塊或定或移前陰突出後陰痔核皆女子之病也但女子不謂七痘而謂之瘕若年少而得之不計男子婦人皆無子此說誠非謬也然今人但言男子之痘而全不知婦人之痘殊失之矣

痘氣所屬本非一經如內經所云任脈爲病男子內結七痘女子帶下瘕聚督脈生病從少腹上衝心而痛不得前後爲衝痘又曰脾傳之腎病名曰痘瘕又

曰三陽爲病發寒熱其傳爲癲癥又曰邪在小腸者連繫系屬於脊又曰邪客於足厥陰之絡令人卒疝暴痛又如心肝脾肺腎五疝之脈各有所辨此素問言諸經之疝也又經筋等篇言足陽明之筋病癰疝腹筋急足太陰之筋病陰器紐痛下引臍兩脅痛足厥陰之筋病陰器不用等義此靈樞言諸經之疝也自張子和云疝有七前人論者甚多其非靈樞素問銅人之言予皆不取乃引靈樞之論曰足厥陰之筋聚於陰器故陽明與太陰之筋皆會於陰器惟厥陰主筋故爲疝者必本之厥陰此子和之意以疝爲筋病而筋主於肝故爲疝必厥陰似亦有理而實則不然觀內經諸論之如前者謂非靈素之言而子和皆可不取乎且筋雖主於厥陰然散見諸經卽爲諸經之筋矣若病在諸經固可因筋而廢經乎矧如厥論曰前陰者宗筋之所聚太陰陽明之合也又痿論曰陰陽總宗筋之會會於氣街而陽明爲之長此亦可以不取乎然則小腹前陰之經則厥陰少陰太陰陽明少陽太陽以至衝任督脈皆有所涉今考銅人經治疝之法則諸經皆有俞穴若謂止屬厥陰則諸經皆廢矣卽子和亦歷指諸經之穴謂諸穴雖亦治疝然終非受疝之地此何說也自後丹溪遂因子和之言謂經有七疝寒水筋血氣孤癰也專主肝經與腎經絕無相干再至戴原禮又因丹溪之說云疝本屬厥陰之一經余嘗見俗說小腸膀胱下部氣者皆妄言也嗚呼此等議論皆後學臆見果堪信乎果堪法乎醫失真傳類多如此故非靈素銅人之言余誠不敢取也

疝氣之病有寒證亦有熱證然必因先受寒濕或犯生冷以致邪聚陰分此其肇端之始則未有不因寒濕而致然者及其病鬱既久則鬱而成熱者有之或以陽臟之人火因邪聚而濕熱相資者亦有之故在內經言疝則寒熱皆有所論如曰病在少腹腹痛不得大小便病名曰疝得之寒曰陰亦盛而脈脹不通故曰癲癰疝也曰肝脾得之寒濕與疝同法曰太陽太陰陽明之勝復皆有疝氣是皆言疝之寒也又如曰脾風傳腎名曰疝瘕少腹冤熱而痛出自一名曰

盡曰足厥陰之筋病陰器不用傷於寒則陰縮入傷於熱則縱挺不收是皆言疝之熱也此內經之言寒言熱未嘗偏廢者如此觀丹溪曰自素問而下皆以爲寒蓋寒主收引經絡得寒則引而不行所以作痛者然亦有踢冰涉水終身不病此者無熱在內故也大抵此證始於濕熱在經鬱而至久又得寒氣外束不得疏散所以作痛若只作寒恐未爲備此丹溪之論如此故其治多從火而倍用山梔黃藥之屬余則不能無言也觀內經之言疝者如前原非只作寒論第言寒者較多於熱亦自疝家之正理不可易也矧不得疏散所以作痛若只作寒恐未爲備此丹溪之論如此故其治多從火而倍用山梔黃藥之屬余則不能無言也觀內經之言疝者如前原非只作寒論第言寒者較多於熱亦自疝家之正理不可易也矧

凡治疝之法當察所由此雖以受寒受濕因而成疝然或以色慾或以勞損或以鬱怒或以飲食酒濕之後不知戒慎致受寒邪則以陰求陰流結於衝任血氣之海而下歸陰分遂成諸疝故其爲病則有遇寒而發者有鬱久成熱遇熱而發者有疲極則傷筋怒而發者有濕因寒滯遇濕而發者有疲極則傷筋遇勞苦而發者有虛邪在少陰厥陰遇酒酪而發者至其久也則正氣陷而不舉邪氣留而不去而爲癲爲木難於愈矣故治此者必當因其所因辨而治之則無不隨手可愈若茫然混然徒執一偏之見而至老不寤者卽與之談終無益也

治疝必先治氣故病名亦曰疝氣非無謂也蓋寒有寒氣熱有熱氣濕有濕氣逆有逆氣氣在陽分則有氣中之氣氣在陰分則有血中之氣凡氣實者必須破氣氣虛者必須補氣故治疝者必於諸證之中俱當兼用氣藥如疝之暴痛或痛甚者必以氣逆宜先用荔枝散氣實多滯者宜寶鑑川棟散或天台烏藥

散非有實邪而寒勝者宜緩肝煎主之。寒疝最能作痛多因觸冒寒邪或犯生冷所致凡喜煖惡寒脈弦細鼻尖手足多冷大小便無熱之類皆是也。寒微者宜芳香散緩肝煎腎氣丸神應散丁香棟實丸之類主之。寒甚者宜醫林四神丸百一選方十補丸壺盧巴丸沉香桂附丸之類主之一法以五積散加鹽炒吳茱萸小茴香各一錢薑五片葱白五寸同煎空心熱服大治氣痛不可忍。

熱疝大能作痛凡火邪聚於陰分而爲痛者必有熱證。熱脈或大便祕結或小水熱閉不通或爲脹爲滿而煩熱喜冷者是也。宜大分清飲或茵陳飲加茴香川棟子之類或以加味通心飲葵子湯之類主之。又有腎本不虛而肝經濕熱火旺莖中作痛筋急縮或痛或痒或腫或挺縱不收白物如精隨溺而下者此筋疝也宜龍膽瀉肝湯主之。

濕疝多爲重墜脹滿然亦有痛者宜以前寒熱證參而治之。有不痛而久墜不愈者是卽癩疝之屬單宜治濕理氣以加味五苓散或局方守效丸或蒼朮散或二層茴香丸之屬主之一云。凡治癩疝非斷房事厚味不能取效。

疝病遇酒而發者多因濕熱當先去其濕濕而熱者大分清飲加茴香川棟之屬濕兼寒者宜加味五苓散主之或以葛花解醒湯加減用之。

血結少腹間者是爲血疝但察其非氣非食小腹鞭而有形大便祕結而黑小水利者必血積血疝之屬宜桃仁膏或桃仁煎或玉燭散之類下之。疝遇色慾而發者是必陰虛之屬若陰虛兼動相火

者宜以六味地黃湯加黃芩知母山梔茴香川棟之類主之。若陰虛無火或兼有寒而痛精虛者宜理陰煎或八味地黃湯加茴香枸杞之類或用緩肝煎主之。疝久者必多虛證或以元氣本虛而偶患者或不耐勞苦而微勞卽發者當以脈證辨之。凡治虛疝當察其虛在陰分或在陽分陰分者輕則緩肝煎八味地黃湯甚則理陰煎補陰益氣煎之類酌而用之。若陽虛者宜溫胃飲歸脾湯補中益氣湯之類主之。若陽虛至甚者必用桂附椒薑或以六味回陽飲之類主之。若虛中挾滯者宜以前法爲主而加以疏導之藥如川棟子茴香枳實山楂梔子之屬酌其宜而佐用之。

### 疝有邪實當下者詳張子和論中

按子和七疝之治雖各有不同然無非用下則不能無偏故劉宗厚徐用誠皆疑而議之亦謂其太過耳非謂盡不可用也。再觀丹溪之法則曰：治疝大不宜下是又相左之甚矣。余因考子和治按如治蔡參軍因坐濕地疝痛不堪用導水丸下之而愈又治一人因瘧渴過飲漿水病疝醫進薑附爲燥熱所壅以致陰囊重墜大如升斗乃先以導水丸後用猪膚散大下之而愈又如一夫病卒疝赤腫大痛數日不止諸藥如石投水遂以導水丸次以通經散大下之而愈若此類者豈皆不可下乎故但宜酌其虛實緩急如遭淫毒而患者爲最多每每先起下疳下疳未已便毒卽當於本證條下求法治之。

者則不得不攻此子和之法亦自有必不可廢者是不可不察也。

### 陰瘡

凡治此之法若腫痛內外俱潰者宜芍藥蒺藜煎爲最佳或四物湯加梔子丹皮膽草荆芥或用加味道遙散。

若濕痒者宜芍藥蒺藜煎或歸脾湯加柴梔丹皮淋漓者宜龍膽瀉肝湯加白朮丹皮。

腫而墜毒者補中益氣湯加山梔丹皮可洗者用百草煎。

下疳

下疳一證本肝腎濕熱證也。若無外因而病者不過去其濕熱或滋真陰濕熱既清其瘡自愈無足慮也。惟感觸淫毒而患者毒有淺深則病有微甚皆宜用百草熏洗外以螵蛸散敷之則輕者自愈若濕熱甚而爲腫爲痛者宜用芍藥蒺藜煎兼而治之。如毒甚者必用草薢湯亦可。

若感觸淫邪毒自少陰直入精宮者不易愈卽治之前法然不見便毒廣瘡發出而後下疳始愈旣見瘡毒卽當於本證條下求法治之。

### 便毒

便毒論治如薛氏之法固已詳矣。然又惟交感不潔遭淫毒而患者爲最多每每先起下疳下疳未已便毒繼之此濕熱穢毒之爲患也。凡初起腫痛尚未成熟而元氣尚強者速宜先去其毒惟會膿散或牡蠣散或導水丸三花神祐丸禹功散之類皆所當用。蓋邪盛而急勢不可當有非行氣利水等劑所能及

散爲最善若已成膿則或針或創惟速去其膿隨因

證調補使速收口爲善

若初起一核其痛微其腫漫者此有二證一以邪輕一以元氣虛弱毒深而然若邪輕者只用會通膏加麝香貼之無有不散或降癰散亦可若元氣虛弱而毒深者既不肯散又不早潰愈久必愈甚最爲可畏及其潰後多不能收輕則爲瘻重則殞命此惟大補

元氣方不致害

若焮腫痛甚膿已將成勢不能消宜用降癰散留頭圍之則勢可斂痛可解膿可速成而潰也

石室祕錄臣陳士鐸著

強陽不倒

強陽不倒此虛火炎上而肺金之氣不能下行故爾若用黃藥知母二味煎湯飲之立時消散然而自倒之後終歲經年不能重振亦自苦也方用元參麥冬各三兩肉桂三分水煎服卽倒此方妙在元參以瀉腎中浮遊之火尤妙肉桂三分引其入宅而招致其沸越之火同氣相求火自回合况麥冬又助肺金之

氣清肅下行以生腎水水足火自息矣

痿陽不振

至於痿而不振者乃過於琢削日泄其腎中之水而腎中之火亦日消亡蓋水去而火亦去必然之理如

一家人口廚下無水又何以煮爨而生烟必汲其泉源而後取其薪炭可以鑽燧取火以煮飲食否則空鑄安爨也方用熟地一兩山茱萸四錢遠志巴戟天杜仲肉蓯蓉各一錢人參枸杞子各三錢茯神肉桂各二錢白朮五錢水煎服一劑起二劑強三劑妙老

人倍加此方用熱藥於補水之中則火起而不愁炎燒之禍自然煮湯可飲煮米可餐斷不致焦釜沸乾或虞爆碎也

陽倒不舉方用熟地一斤黃芪二斤巴戟天當歸各

六兩肉桂柏子仁去油覆益子草冬各三兩白朮八

兩各爲末蜜爲丸每日白滾湯送下一兩自然陽旺不倒矣

狐疝

男子與女子之治原無分別然而亦有殊處男子與婦人殊者疝病陽強不倒瘻而不舉然而疝病與婦人異者止狐疝不同耳餘俱相同狐疝者日間縮在囊之上夜間垂在囊之下也此乃寒濕又感陰陽不正之氣乘於交感之際或在神道之旁或在風濕之際感而成之也方用杜若五錢搗汁以涼水洗之取

汁一椀加沙參一兩肉桂桂枝小茴香橘核各一錢水煎服一服卽伸出二服卽消三服全愈

方一

固真湯東垣十書下同

治陰汗濕痒正月內定此方

升麻 柴胡 羌活各一錢 炙甘草 澤瀉各一錢半 草龍膽炒 知母炒 黃藥各二錢

右剉如麻豆大水三盞煎至一盞稍熱空心服以

美膳壓之

升陽除濕湯

治兩外腎冷兩髀樞陰汗前陰痿弱陰囊濕痒脹

澤瀉 升麻各一錢半 紅花少許 生甘草 氣  
黃藥酒製各二錢 草龍膽 當歸梢 羌活

麻黃根 柴胡 漢防己 白朮各一錢

五味子二十粒

右水三大盞煎至一盞稍熱服食前忌酒濕麪房事

龍膽瀉肝湯

治陰部時復濕痒及臊臭

柴胡梢 澤瀉各一錢 車前子 木通各五分

當歸梢 龍膽草 生地黃各三分

右咬咀水三大盞煎至一盞空心稍熱服更以美

膳壓之

溫腎湯

治前證二月定此方

麻黃 柴胡梢各六分 澤瀉一錢 防風根

蒼朮各一錢半 白朮 猪苓 升麻 白朮各

黃藥酒炒各一錢

右件分作二服每服水二大盞煎至一盞稍熱服

食前天晴明服之候一時辰許方食

補肝湯

治前證

黃芪七分 人參 白朮 葛根各三分

甘草炙 蒼朮各五分 猪苓 升麻各四分

知母 柴胡 羌活 陳皮 歸身 黃藥炒

防風 澤瀉 神薑末 連翹各二分

水二大盞煎一盞稍熱空心食前服忌酒濕麪

清震湯

治前證十二月定此方

羌活 酒黃藥各一錢 升麻 柴胡 蒼朮

黃芩各五分 防風 猪苓 麻黃根各三分

藁本 甘草炙 當歸身各二分 紅花一分

澤瀉四分

水二盞煎一盞臨臥服忌同前

大蒜丸

治陰汗濕痒

大蒜不拘多少

右煨剝去皮爛研同淡豆豉末搜丸如梧子大朱

砂爲衣每服三十九棗子燈心煎湯送下

陰汗濕痒方

爐甘石二錢半 真蛤粉一錢二分半

右爲粉撲傅

蟠葱散和劑

治男子婦人脾胃虛冷攻築心腹脅肋刺痛胃膈

痞悶背膊連項拘急疼痛不思飲食時或嘔逆霍

亂轉筋腹冷泄瀉膀胱氣刺小腸及外腎腫痛及

治婦人血氣攻刺癥瘕塊硬帶下赤白或發寒熱

胎前產後惡血不止臍腹疼痛一切虛冷

延胡索三兩 蒼朮泔浸一宿 甘草鹽各半斤

白茯苓 蓬木 三稜煨 青皮各六兩 丁皮

縮砂仁 檳榔各四兩 肉桂 乾薑炮各二兩

右搗羅爲末每服二錢水一盞連根葱白一莖煎七分空心食前稍熱服

又方

桃仁湯浸去皮尖雙仁麸炒微黃 苦棟子

懷香子 没藥各一兩

右爲細末每服二錢食前熱酒調服

銅綠散

醫學入門下同

治男女陰濕瘡蟲蝕瘡

五倍子五錢 白礬一錢 乳香 銅綠各五分

輕粉二分半

右爲末先以藥水洗後擦之

蟬蛻散

治脬囊忽腫多因坐臥濕地或爲蟲蟻吹著

蟬蛻半兩

右用水一椀煎湯洗再溫再洗仍與五苓散合三

痘湯加燈心煎服

鴻肝清熱湯

瘡瘍全書下同

龍膽草酒拌炒 當歸梢 車前子炒 澤瀉

生地 茄葉 黃連 黃藥 知母 淡竹葉

木通 防風各一錢 甘草梢五分

木通 防風各一錢 甘草梢五分

右作一劑水二椀煎八分食前服

烏金散

治前證腐壞用此敷之

右爲細末香油調搽乾擦亦可

加味小柴胡湯

治前證潰爛飲食少思日晡發熱

柴胡 人參 黃芩 川芎 白朮 黃芪

當歸 甘草 黃藥 知母各一錢 半夏  
白芍各五分  
右水煎服

治前證  
摻藥

輕粉 孩兒茶各二錢 紅絨灰一錢五分  
飛丹 雞內金煅存性 爐甘石煅各一錢

冰片三分 真珠五分 麝香一分  
右爲極細末摻瘡上

清濕瀉肝湯

升麻 羌活 柴胡 知母 黃藥 澤瀉  
青皮 川芎 生地 蒼朮 木通 龍膽  
生甘草

右咬咀水煎服

右咬咀黃芩

小便不利加車前子

虛加人參

治氣弱無力莖根下生瘡膿水不止

人參 黃芪 當歸 柴胡 升麻 甘草梢

黃藥 知母 紅花 白芍 黃芩 龍膽草

右咬咀水煎服

治下疳

防風 羌活 荆芥 獨活 製黃芪

山梔 甘草 木通 蒼朮 車前子

牛蒡子 天花粉

右咬咀水煎服

洗方

治下疳

冬青葉四五片 甘草 黃蘗 防風

右咬咀煎湯洗之

摻藥

治下疳

孩兒茶 輕粉 黃蘗 冰片 橄欖核殼各一錢

右爲末摻之

又方

治內外痔瘡并小便一切疳疾

蒼朮 黃蘗 滑石各二錢 秦艽一錢

右咬咀水煎服

如小便澀滯疼痛加甘草節蒲黃

又方

黃芪 白蒺藜 羌活 白附子各二錢

治前證

右末之用猪腰子一副竹刀切破入藥在內線紮

定白酒煮熟空心服之

隔紙膏

治小便疳瘡大爛者

麪粉 白蠟各一兩 黃蠟八錢 冰片一錢

先用麻油三兩火上熬化二蠟隨下麪粉次下冰

片爲隔紙膏貼之五日後痛即止肉即生矣

茯苓補心湯

治一切妬精陰瘡

白茯苓 乾葛 前胡 桔梗 甘草 陳皮

白芍 紫蘇 人參 半夏 當歸 熟地

川芎 枳殼

右咬咀薑三片棗肉二枚燈心二十莖水二鍾煎

服

補心養胃湯

治前證

陳皮 半夏 茯苓 甘草 白术 黃連

當歸 生地 青皮 白芍 檳榔 烏藥

遠志 滑石 山梔 車前子 延胡索 川芎

右咬咀水煎服

內補托裏流氣飲

治前證

茯苓 澤瀉 猪苓 紫蘇 山梔 甘草節

黃連 白朮 川芎 當歸 生地 白蒺藜

白芍 人參 黃芪 木通 青皮 香附子

苦參

右咬咀水煎服

水黃膏

治前證

黃連二兩水二椀文武火煎至一椀濾去渣再重湯

慢火煎至一酒杯 加冰片三分 麝香三分

輕粉五分 硫黃末一錢

右俱研末以黃連汁調和用鵝毛潤患處立效

一抹散

治前證

黃連末 鹿角灰 雞內金灰各一錢 紅絨灰

黃連末 鹿角灰 雞內金灰各一錢 紅絨灰

黃連末 鹿角灰 雞內金灰各一錢 紅絨灰

麝香三分

右爲細末乾摻患處

洗方

治陰蝕瘻瘍

川椒五分 蛇牀子半斤 白礬三錢 桃枝

柳枝各七枝 輒艾 苦參各一兩

右用米泔水五六椀煎滾去渣乘熱熏洗之

治前證

又方

雄黃一錢 硫黃五分 木鼈子一枚去殼剉片

桃仁五粒

治前證

艾五錢入前藥在內作條放在馬桶熏之其蟲即

死

麻黃湯

治陰腫或瘡或爛

麻黃 黃連 蛇牀子各五錢 輒艾三錢

烏梅三枚 大戟 防風

白礬各八錢

右剉煎湯熏洗再用孩兒茶一錢輕粉冰片杏仁

灰各五分爲末摻之

黃芩湯

治妬精陰瘡

當歸 黃芩 川芎 大黃 白礬各二錢

黃連三錢

右剉水五椀煎熏洗洗後敷雄黃硫黃輕粉末

右剉水五椀煎熏洗洗後敷雄黃硫黃輕粉末

右剉水五椀煎熏洗洗後敷雄黃硫黃輕粉末

右爲細末乾摻上

又方

治陰瘡與男子妬精瘡略同

黃丹 枯礬 蘭蓄 藥本各一兩 硫黃五錢

蛇蛻一條燒灰

右爲細末搽之如不乾再用芍藥末摻之

龍膽湯

治左右便毒

龍膽草一錢 木鼈子三枚 大黃二錢 桃仁

紅花 當歸鬚各等分 苦蔞一枚

右咬咀薑一枚水煎服

空心溫服行利十餘次

荆防敗毒散

治前證

穿山甲 甘草 紅花 羌活 當歸 金銀花

天花粉 赤芍 防風 生地黃 木通 枳殼

川芎 烏藥各一錢 槐花末二錢 牛膝五錢

右水煎服

敗毒流氣飲

治小腸流注

紫蘇 桔梗 枳殼 甘草 香附 防風

川芎 羌活 獨活 白芷 白芍 檳榔

茴香 澤瀉 延胡索

右咬咀薑三片棗一枚水煎空心服

清心流氣飲

治前證

白朮 茯苓 猪苓 澤瀉 麥冬 青皮

防風 柴胡 羌活 赤芍 香附 生地黃

川芎 紫蘇 甘草

右咬咀薑三片棗一枚水煎服

小便不利加車前子滑石木通

乳香散

傷寒  
事親

乳香 沒藥 輕粉 黃丹 龍骨 烏鰲骨

黃連 黃芩 銅綠各等分 麝香少許

右爲細末先以溫漿水洗過摻瘡瘍上

疳蝕散

蝦蟆 木香 硫黃 鐵精等分

右五月五日爲末入麝香少許摻敷患處

青木香丸

醫學  
入門

治寒疝及膀胱疝氣腫氣

破故紙 菖澄茄 檳榔各二兩 青木香一兩

黑丑頭末三兩

右爲末水九梧子大空心鹽湯下五十九

又方

青木香丸二百粒 蟬蟇七箇

右同炒令微香以磁器盃之候冷去蟇每五十九

茴香酒吞下蓋疝屬肝故借蟇以治風

當歸四逆湯

醫學  
綱目

治寒疝臍下冷痛

當歸一錢二分 附子 肉桂 茴香各一錢

右剉作一貼水煎空心服

羊肉湯

金匱  
要略

治寒疝臍腹脹痛手不敢近

羊肉一斤 生薑五兩 當歸三兩

右水八升煮取三升每服七合日三服

葱白散

三因  
方

治寒冷氣入膀胱作痛

川芎 當歸 枳殼 厚朴 蓬朮 三稜

肉桂 乾薑 人參 神麴 麥芽 青皮

茴香 木香 熟地黃 白芍藥 赤朮茶

川棟肉各五分

右剉作一貼葱白二莖鹽一匙煎服

四神丸

丹溪  
心法

治冷疝脹痛

吳茱萸一半酒浸一半酢浸焙乾 菖澄茄

青木香各五錢 大香附一兩

右爲末糊丸梧子大鹽湯下七八十九

祕傳茱萸內消丸

直指

治疝氣及陰癰偏大或生瘡出黃水

吳茱萸半酒半酢浸一宿焙乾 山茱萸 肉桂

馬蘭花酢浸焙 木香 黑丑頭末 茴香鹽炒

延胡索炒 川棟肉 青皮 陳皮並去白

海藻洗去鹹焙 桃仁炒 白蒺藜炒各五錢

右爲末酒糊丸梧子大鹽湯或溫酒下五七十九

牡蠣粉 黃丹各二兩 枯白朮四兩

治陰囊生瘡出水其痒甚苦搔之無足後必痛

右爲末遇夜用手捏藥於痒處擦之連擦三四次

自然平復

加減柴苓湯

治諸症因濕熱腫痛出水

柴胡 澤瀉各一錢 半夏 赤茯苓 荔枝核

白朮 猪苓 山楂 梔子各七分

右剗作一貼水煎服無荔枝核則代以橘核

神聖代鍼散

醫學正傳

治血積疝痛及諸疝刺痛服之神效

乳香 没藥並去油研 當歸 白芷 川芎

羌青製各一錢

右爲末每服一字甚者五分先點好茶一盞次摻

藥末在茶上不得吹攬立地細細呷之

蕩疝丸

古今醫鑑

蓬术 木香各四錢 黑丑頭末 破故紙炒

茴香炒 川棟子炒各一兩 青皮 陳皮各三錢

右爲末酒糊和丸梧子大空心酒下五七十九

氣瘤飲

醫學入門

治氣瘤

黃連以吳茱萸煎水浸炒二錢 甘草三分

人參 白朮各一錢 白芍藥 陳皮各七分

右剗作一貼薑三片水煎服

治氣瘤腫痛

山茱萸 吳茱萸 食茱萸各二兩 川棟一兩

破故紙炒一兩七錢 蟹螯十四箇同炒赤去螯

黑丑頭末炒一兩 青鹽 青皮 茴香炒各三錢  
右爲末酢麪糊和丸梧子大先嚼桃仁十五粒以溫酒或鹽湯下三五十九

聚香飲子

醫學入門

治七情所傷遂成疝氣

乳香另研 沉香 白檀香 木香 蘿香葉

丁香各八分 延胡索 薑黃 烏藥 桔梗

桂心 甘草各四分

右剗作一貼薑三片棗二枚水煎服

二香丸

丹溪心法

治狐疝上下出入作痛或疝痛作則腹內塊痛止

木香 香附于各三兩 山楂肉二兩 三稜

蓬术並酢煮 神鞠 薑黃 南星各一兩

黃連與吳茱萸同炒 蘿蔔子 桃仁 梔子仁

橘核炒各五錢

右爲末薑汁浸蒸餅丸梧子大白湯下五七十九

天台烏藥散

東垣十書

治小腸氣

川棟子十箇以巴豆十四粒同麸炒黑色去豆麸

烏藥 木香 茴香炒 良薑 青皮各五錢

右爲細末每一錢溫酒調下痛甚炒薑熱酒下

救命通心散

醫學綱目

治小腸氣痛

川烏一兩以青鹽一錢酒一盞浸一宿去皮尖焙

川棟子肉一兩以巴豆肉二十粒同炒黑去豆

茴香五錢 右燕一對火煅醋淬 土狗五枚  
芥子一錢六分

右爲末每三錢入羊石子內濕紙裹煨熟夜半時

好酒半斤入鹽細嚼石子以酒嚥下不得作聲小

便大利其病卽去

去鈴丸

醫學入門

大治小腸疝氣

茴香一斤以生薑一斤取自然汁浸一宿約薑汁盡

入茴香然後入青鹽二兩同炒赤取出焙燥

右爲末酒糊丸梧子大每三五十九溫酒米飲任

一發散而無疏導之害服之累效

加味通心飲

得效方

治小腸疝氣熱痛小便不通

瞿麥 木通 梔子 黃芩 連翹 枳殼

川棟子 甘草各一錢

右剗作一貼燈心三十莖車前草五葉同煎服

蠲痛丸

直指方

治小腸膀胱氣痛

延胡索一兩 川棟子肉 茴香炒各五錢

白丑頭末炒 當歸 良薑 青皮 木香

右爲末薑汁浸蒸餅和丸梧子大燒綿灰調酒送

下三五十九

消疝丸

集略

治小腸疝氣

蒼朮一斤泔浸切片 川椒微炒 白茯苓

# 古今圖書集成

中華書局影印

茴香炒各四兩 葱白一斤切鹽一兩同炒黃去葱

右爲末酒糊和丸梧子大空心溫酒下五十九

立效散資生方

治小腸氣痛

全蠍七箇 縮砂三七枚 茴香一錢

右爲末分三貼熱酒調下空心卽效

茱萸內消丸醫學入門

治膀胱腎虛結成寒疝偏墜引痛及小腸奔豚症

癖等證

山茱萸 吳茱萸 川棟子 馬蘭花 茴香

青皮 陳皮 山藥 肉桂各二兩 木香一兩

右爲末酒糊和丸梧子大酒下五十九

楊氏麝香丸直指方

能尋諸處痛凡膀胱氣脅下痛最難治此藥主之

木香 胡椒各一兩 全蠍炒 巴豆各四錢

右爲末蒸餅和丸麻子大硃砂爲衣熟水下五十

丸

金鈴散直指方

治膀胱小腸氣腫痛

大川棟肉三十枚切片以巴豆肉三十粒作片同炒

焦去巴豆 茴香炒與川棟肉等分 木香一錢半

右爲末每二錢水酒各半煎葱白湯調下空心

三疝湯集成方

治膀胱氣腫痛

車前子二錢四分 茴香一錢六分 沙參八分

葱白一錢二分

右剉作一貼水煎服

橘核散丹溪心法

治四種癰痘久者用橘核丸新者用橘核散

橘核一錢半 桃仁十五枚 梔子仁一錢

川烏炮 吳茱萸各五分

右各炒爲麩末作一貼水煎服入門曰按橘核單

止痛烏頭散寒鬱山梔除濕熱又引烏頭速下不

令胃中停畱用之甚捷

三白散得效方

治膀胱氣蘊熱陰囊腫脹大小便不通

白丑頭末一兩 桑白皮 白朮炒 木通

陳皮各二錢半

右爲末每服二錢薑湯或葱白湯調下

四味茴香散醫學入門

治囊莖抽痛不可忍俗名小腸氣

烏藥酒浸一宿焙 良薑 茴香 青皮各一兩

右爲末每二錢發時熱酒調下

金鈴子丸濟生

治疝氣偏墜痛不可忍

川棟子肉五兩剉作五分 一用蟹螯十箇同炒去

蟹螯 二用茴香三錢鹽半錢同炒去鹽留茴香

三用黑丑三錢同炒去黑丑 四用破故紙三錢同

炒留故紙 五用蘿蔔子一錢同炒去蘿蔔子

右爲末酒糊和丸梧子大溫酒下三十九

三疝湯集方

治陰瘻偏大腎囊腫脹或生瘻瘍時出黃水

川棟肉一兩半 大腹皮 五味子 延胡索

海藻各一兩一錢半 木香七錢 桔梗 青皮  
山茱萸各一兩 川烏炮 吳茱萸 食茱萸

茴香 桂心 桃仁各五錢

馬蘭花丸醫學正傳

治瘻瘍偏墜及婦人陰瘻小兒偏墜無有不效

橘核丸 加馬蘭花一兩 檳榔五錢

右服法同橘核丸

茴香安腎湯古今醫案

治左邊偏墜丸如雞子大

人參 白朮 白茯苓 茴香 破故紙 檳榔

烏藥 香附童便製 縮砂 荔枝核各八分

黃藥 澤瀉各六分 木香 延胡索各四分

升麻 甘草各二分

右剉作一貼煎服

加減香苓散

治偏墜氣初起壯熱憎寒乃發表分利藥也一服

枳殼 陳皮 蒼朮 麻黃 猪苓 香附子

澤瀉 木通 滑石 三稜 蓬朮 車前子

川棟子 延胡索 甘草各七分

右剉作一貼人生薑三片葱白二莖水煎服

川棟散直指方

治木腎外腎脹大麻木痛硬并奔豚疝氣偏墜

川棟子四十九箇先切七箇取肉以茴香二錢半同炒併留 又切七箇以破故紙二錢半同炒併留 又切七箇以黑丑二錢半同炒併留 又切七箇以

鹽一錢同炒併留 又切七箇以蟹螯十四箇同炒

去蝥 又切七箇以巴豆肉十四箇同炒去巴豆

又切七箇以蘿蔔子二錢半同炒去蘿蔔子乃入下

藥 茴香炒 木香各五錢

桂枝二錢半

右爲末酒麪糊和丸梧子大空心鹽酒下三十五丸

瘀血木腎以此方加延胡索五錢略炒劑之以

沒藥末和溫酒吞下

九仙靈應散

萬病回春

治男子陰濕陽痿每逢不舉

附子炮 蛇牀子 紫梢花 石菖蒲 海螵蛸

遠志

丁香 木鼈子各二錢 片腦一錢半

右爲麞末每五錢水三椀煎至一椀半溫洗濕處

井陰囊日二次畱水再溫洗多洗尤好

加減內固丸

醫學入門

治命門火衰腎寒陰痿元陽虛憊

巴戟 肉蓯蓉 山茱萸 菟絲子各三兩

破故紙二兩半 銕石斛 胡蘆巴各二兩

茴香一兩 附子五錢

右爲末蜜丸梧子大溫酒或鹽湯下五十九

十補丸

丹溪心法

治寒疝陰冷及小腸膀胱奔豚等證

附子 防風各一兩剉豆大 鹽四兩 黑豆一合

四味同炒附子裂去諸藥只用附子 胡蘆巴

川棟肉 巴戟 肉桂 延胡索 破故紙炒

木香 草澄茄 茴香炒各一兩

右爲末糯米粉酒打糊和丸梧子大硃砂爲衣酒

下五十九丸

吳茱萸湯

醫學正傳

治厥疝上逆陰冷囊寒

川烏 細辛各七分半 吳茱萸五分 良薑

當歸 乾薑 肉桂各二分半

右剝作一貼水煎服

清魂湯

東垣十書

治外腎冷前陰痿陰囊濕痒

柴胡 黃芩酒炒 甘草生各一錢 升麻

澤瀉各七分半 當歸梢 羌活 麻黃根

草龍膽 防己 赤茯苓各五分 紅花一分

五味子九粒

右剝作一貼水煎服

回春散

古今醫鑑下同

治陰冷如神

歌曰一錢白芥八分丹

黃丹二分胡椒細細研焰硝

一分共四味好酢調和手內攤男左女右合陰處渾

身是汗濕衣衫此方用者如神效不義之人不可傳

助陽散

治急陰冷

乾薑 牡蠣各一兩

右爲末以燒酒調稠搽手上用雙手揉外腎婦人

揉兩乳

陰瘡膏

治男女陰瘡

米粉一酒杯許 芍藥 黃芩 牡蠣 附子

白芷各七錢半

右六味爲咬咀以不入水猪膏一斤微火上煎三

上三下候白芷黃膏成絞滓去內白粉和取敷瘡

活血驅風散

直指方下同

治腎臟風囊下濕癢脚生瘡癬

白蒺藜炒 當歸 川芎 白芷 細辛 桃仁

半夏 槐潤 白芍 五靈脂 甘草生各六分

蒼朮 杜仲 慧苡仁 桂皮 天麻 橘紅

檳榔 厚朴 枳殼各二分

右剝作一貼薑五片棗二枚水煎入乳香末少許

空心服之乳香以佐心氣使心腎相交也

蒺藜散

治瘻風上攻耳鳴目眩下注陰濕瘡癬

草烏水浸三日夜逐日換水取出去皮曬乾

白蒺藜炒各五錢 白芷 白附子生 蒼朮炒

荆芥穗各二錢半

右爲末米糊和丸梧子大鹽酒下三十九

四生散

局方

治腎臟風脚下生瘡癬或兩耳鳴痒

白蒺藜 黃芪 獨活 白附子各等分

右爲末薄荷酒調下或以猪腰批開入藥

末二錢合定裏煨香熟空心細嚼以鹽酒送下卽

瘥

乳香龍骨散

東垣十書

治外腎濕痒淫爛

龍骨 石膏生 五倍子各二錢半 白芨

乳香 黃丹各一錢二分半 麝香少許

右爲末先以苦參大腹皮紫蘇葉煎湯溫洗後捲

敷

烏龍丸本事方

一名烏頭丸治腎臟風下注生瘡癬

川烏

草烏各一兩以黑豆半升煮透軟去皮臍切  
大白附子 天麻 地龍各五錢

驪乾

右爲末酒糊和丸梧子大空心鹽湯吞下三五十

丸

椒粉散東垣十書

治陰囊濕痒

麻黃根二錢 黑狗脊即貴衆 蛇牀子各一錢

川椒 當歸梢 猪苓各六分 蟬蟇四枚

輕粉 紅花各少許

右爲末乾摻避風冷

茴香棟實丸丹溪心法

治男子七疝婦人帶下瘕聚痛不可忍皆任脈所  
主治法同焉

川棟子炒 茴香 山茱萸 吳茱萸 食茱萸

青皮 陳皮 馬蘭花 芫花各一兩

右爲末酢糊和丸梧子大溫酒下五十九

木香金鈴丸古今醫鑑

治諸般疝氣及外腎腫脹痛一服立應

乳香 沒藥 木香 附子炮 茴香鹽炒

川棟肉 延胡索 全蠍炒 人參各等分

右爲末酒糊和丸梧子大空心黃酒下百丸

丁香棟實丸綱目醫學

治男子七疝女子瘕聚帶下

當歸 附子炮 川棟肉 茴香各一兩並剉好酒

三升煮酒盡爲度焙作細末每末一兩入丁香  
木香各二錢 全蠍十三箇 延胡索一兩

右並爲末與前藥拌勻酒糊和丸梧子大空心酒

下百丸凡疝氣帶下皆屬於風全蠍治風之聖藥

川棟茴香皆入小腸經當歸延胡索和血止痛疝

氣帶下皆積寒邪於小腸之間故以附子佐之丁

香木香爲引導也有人患疝痛三年服此三劑良

愈

四炒川棟丸醫學門下同

治一切疝氣腫痛縮小久服斷根

川棟肉一斤作四分一分用麸一合蟹螯四十九枚

同炒一分用麸一合巴戟一兩同炒一分用麸

一合巴豆四十九枚同炒一分用鹽一兩茴香一

合同炒

並以麸黃色爲度揀去同炒藥只取川棟肉再加

木香破故紙炒各一兩爲末酒糊和丸梧子大每

五十九鹽湯下日三服

五炒川棟丸

治諸疝

川棟肉五兩將一兩蟹螯三箇同炒一兩茴香三

錢五分同炒一兩黑丑三錢同炒一兩破故紙

三錢同炒一兩蘿蔔子一錢同炒

揀去同炒藥只畱茴香破故紙川棟肉爲末酒糊

和丸梧子大溫酒下五十九

烏附通氣湯

治新久疝病四氣七情疝皆效

烏藥 香附子 當歸 白芍藥 山楂肉

橘皮各一錢 赤茯苓 澤瀉各五分 猪苓  
木香 甘草各三分 白朮七分

右剉作一貼水煎空心服

十味蒼蘋散

通治濕熱疝痛

蒼术 黃蘆 香附子各一錢 青皮 延胡索

益智仁 桃仁各七分 茴香炒 附子炮

甘草各五分

右剉作一貼空心水煎服

神消散古今醫鑑

治諸般疝氣外腎脹痛

益智仁炒七錢 山梔仁鹽水炒黑 橘核炒

茴香鹽水炒各一兩 荔枝核八錢 檳榔五錢

青皮油炒三錢

右爲末每二錢燒酒調空心服不飲酒鹽湯服

浴毒湯

治小腸風陰瘡痒痛

木通 藥本 枳殼 貢衆 荆芥 甘松

薄荷 白芷

右剉碎用藥二兩水五升入芒硝半兩煎至二升

去滓熱洗浴瘡

清心蓮子飲

治懸瘻勢退惟小便赤澀

黃芩五錢 黃芪蜜炙 石蓮肉去心 人參

赤茯苓各七錢半 車前子炒 麥門冬去心

甘草炙 地骨皮 製甘草

每服一兩用水二鍾煎至八分食前服如發熱加

柴胡薄荷

加味托裏散

治懸癰不消不潰

人參 黃芪鹽水拌炒 當歸酒拌 麥門冬  
川芎 知母酒拌炒 黃藥酒拌炒 茯藥炒  
柴胡 金銀花 製甘草各一錢

右作一劑用水二鍾煎八分食前服

加味十全大補湯

治懸癰潰而不斂或發熱飲食少思

人參 黃芪鹽水拌炒 白朮炒 茯苓 川芎  
熟地黃酒蒸 當歸酒拌 白芍藥炒各一錢  
肉桂 麥門冬 甘草炒 五味子搗炒各五分

右作一劑用水二鍾煎一鍾食前服

莖腫加青皮

日晡熱加黃芩柴胡

小便澀加車前子山梔子俱炒

腎臟風方  
凡指縫白者只一二服效

黃芪一兩 木通 甘草 黑牽牛各半兩

右四味細剉用蟹螯七枚去翅同藥炒焦黑去蟹  
螯餘爲末蒸餅糊爲丸如桐子大空心鹽湯下三

十九

全蠍散

治腎臟風發瘡痒

全蠍三枚焙 明硫黃二錢研 生號丹一錢

檳榔一大箇破開用好黃丹一錢合內濕紙裹煨  
麻香少許研 輕粉半錢

右爲細末研勻磁盒收每用少許麻油調抹兩掌  
先以鼻嗅男以兩掌揜外腎女以兩掌揜兩乳各  
睡至醒次日依前再用藥屢效

牡蠣散

治陰囊兩旁生瘡或陰濕出水其痒甚苦夜則孤  
之無足後必自痛或兩腋汗脚板心汗濕無可奈  
何此藥主之予親得此證受苦數十年得此方隨

用一二日如法擦之三十餘年不發實爲神效









牡蠣 黃丹炒各二兩 枯白礬四兩

右爲細末遇夜睡時用手捏藥於陰痒處痛擦之  
不一時又擦之三四次後頓減次夜再擦雖大減  
又擦後自然平復如腋汗亦有頓擦方如脚汗先  
擦後裝藥於靴或鞋底上脚板上塗藥纏脚裏之  
亦可

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第二百二十三卷目錄

醫部彙考二百三



薯蕷 鍾乳石 磬石 山萸 萸各二兩  
白术 麻黃各二兩五錢 大棗三十枚擘開  
五加皮一升 生薑切炒乾 烏麻碎各二升  
半浸五宿溫服三合日再不知隨意增進一本無

右二十二味咬咀鍾乳別以小袋子盛清酒二斗  
烏麻用杜仲一兩半

五加皮一升 生薑切炒乾 烏麻碎各二升  
白术 麻黃各二兩五錢 大棗三十枚擘開  
五加皮一升 生薑切炒乾 烏麻碎各二升

右五味咬咀以水一斗煮取三升冷浴陰莖日三  
治服石發熱因勞損熱盛當風露臥莖腫

昆布 吳茱萸各三錢 蒼朮鹽水炒一兩  
黃蘿酒洗 枳實 滑石各七錢 南星炮  
半夏製 山楂肉 神鞠炒 白芷各五錢

右爲末酒糊和丸梧子大鹽湯下七十九一方無  
枳實有枸杞子

吳茱萸一斤分四處以四兩酒浸 四兩酢浸  
四兩白湯浸 四兩童便浸並焙乾 澤瀉二兩  
右爲末酒麪糊和丸梧子大空心鹽湯下五七十  
九

治奔豚疝氣上冲小腹引痛神效

香附 吳茱萸 山梔炒黑 川棟肉各一錢  
右咬咀水二錢薑三片煎八分食前服

活腎丸 醫學入門  
治木腎不痛

熟地二兩 柏子仁一錢 桂圓肉一錢  
枸杞子一錢 桃仁一錢 沉香一錢  
當歸一錢 桃仁一錢 桃仁一錢

治下部脈微細陰痿不起

人參 防風 白茯苓 細辛 素椒 黃芪  
牛膝 桔梗各一兩半 丹參 乾地黃

山楂酢炒一錢五分 青皮酢炒一錢二分  
枳實麸炒 蒼朮米泔浸炒

治交接過度或病未平復交接傷氣筋絕舌卷脣

青引卵縮脈疼急腹中絞痛欲絕不能飲食

立效散

治瘍因食積作痛

方二

人參酒 千金方

治瘍因食積作痛

醫部彙考二百三

前陰門四

方二

人參酒 千金方

治瘍因食積作痛

醫部彙考二百三

前陰門四

方二

人參酒 千金方

治瘍因食積作痛

醫部彙考二百三

前陰門四

方二

人參酒 千金方

山茱萸 巴戟 白茯苓 五味子 遠志

肉蓯蓉 楮實子 杜仲 小茴香各一兩  
石菖蒲五錢

右爲末蜜和棗肉爲丸梧子大空心溫酒或鹽湯  
下三五十丸節齋曰按亦有鬱火盛而致瘓者非  
還少丹所能起常服黃蘖知母清火堅腎之藥

五精丸

丹溪心法

治腎虛陰痿

秋石 鹿角霜 茯苓 陽起石 山藥各等分

右爲末酒糊和丸梧子大每服五十九常近火氣

使乾燥服之無戀膈之患

上丹局方

治勞傷虛損男子絕陽房事不興

五味子八兩 蛇牀子 菟絲子 杜仲 防風

百部根 白茯苓 巴戟 肉蓯蓉 枸杞子

山藥 遠志 柏子仁各二兩

右爲末蜜丸梧子大空心溫酒鹽湯下五七十九

膾肭補天丸

醫學入門

治虛損陰痿

胡桃肉三兩 白朮二兩半 白芍藥 熟地黃

黃芪 杜仲炒去絲 牛膝 破故紙 川棟肉

遠志各二兩 膾肭膏 人參 白茯苓 當歸

枸杞子 川芎 茴香各一兩半 木香 茯神

甘草蜜炙各一兩 沉香五錢

右爲末用酒製膾肭膏糊和丸如梧子大空心  
溫酒或鹽湯下五七十九

小浴方

治虛勞陰濕痒生瘡

川椒 苦參 蛇牀子各一兩半 白朮 白芷  
香附子 狗脊 細辛各一兩 桂心三分

右咬咀每用藥一兩以水三升煎至二升去滓傾  
入盆子內但乘熱氣坐盆子上熏之良久通身汗  
出便洗患處甚者不過三兩度

沐浴長春散

治男子下元陰濕久冷陰囊左右夜痒抓之則喜  
住之則痛成瘡流水爲害甚苦此藥見效及治婦  
人下部陰濕胎元久冷

牡蠣 蛇牀子 破故紙 紫梢花 官桂

乾荷葉各等分

右咬咀每用一兩半水一小鍋入葱白數莖煎至

八分去滓先熏後洗却用後藥

枯礬一兩 黃丹 蛤粉各半兩

右件共研爲細末熏洗了後以手捏藥末擦濕痒

處

銅綠散

治男婦陰部濕淹瘡

銅綠少許 白礬一錢 乳香半錢 輕粉一字

五倍子細研半兩

右爲細末洗淨摻之

一名大智丸治下疳瘡

治陰蝕瘡

大戟 芫花 海帶洗 海藻洗 椰李仁

甘遂 繢隨子各半兩 樟柳根一兩

右爲細末水煮棗肉爲丸如小豆大每服五七十

丸熟水下接此藥太峻用者慎之

下疳瘡方

先用張子和泄水丸去根後用此藥乾上

黃連 滑石各半兩 定粉三錢 輕粉少許  
乳香一錢 蜜陀僧二錢

右細末乾上或加乾胭脂或加木香檳榔

大蘆薈丸

一名九味蘆薈丸治肝火炎盛下疳潰爛或作痛

焮腫或治小兒疳膨食積口鼻生瘡牙齦蝕爛等

證并蟲蝕肛門痒痛

胡黃連 蘆薈 黃連 木香 白蕪荑 青皮

白雷丸 鶴虱草各一兩 蘆香一錢

右爲末蒸餅糊丸桐子大每服一錢空心米飲下

八正散

治下疳便毒小便淋漓脈證俱實者

大黃 車前子 瞿麥穗 蒲蓄 山梔子仁

木通各一錢 滑石二兩 甘草五分

右水煎服

洗毒湯

治陰蝕瘡

苦參 防風 露蜂房 甘草炙各等分

右咬咀水煎濃汁洗瘡

金銀花散

治下疳瘡

金銀花 荆芥 孙硝 蛇牀子 甘松 白芷

檳榔各一錢

右咬咀每用五錢水五椀加葱白三根同煎數沸

益盛水先熏後洗

洗瘡藥

黃連 黃檗 當歸 白芷 獨活 防風

石硝 荆芥各等分

右入錢五十文烏梅五箇鹽一匙入水同煎溫洗

日五七次敷下項藥

敷瘡藥  
木香 檳榔 黃連 銅青 輕粉 枯礬

麝香 海螵蛸各等分

右爲極細末洗後至夜敷上

丹溪方

治下疳瘡

蛤粉 蠶茶 苦參 青黛 密陀僧

右用河水洗滌淨臘豬脂調敷并治臘瘡

追膿錠子海藏

下疳有膿內潰不出此藥追之

雄黃二錢 巴豆一錢半 輕粉一字

右爲細末敷之

七寶檳榔散

治下元玉莖上或陰頭上有疳瘡漸至蝕透久不

愈者

檳榔 雄黃 輕粉 密陀僧 黃連 黃檗

右爲細末和勻先以葱白漿水洗淨軟帛搘乾如

瘡濕乾摻如乾小磨麻油調塗

玉粉散

治下陰瘡疼不止

滑石 密陀僧 寒水石煅各半兩 脣粉  
麝香各少許

右爲細末油調敷或乾貼患處

截瘡散

治年深瘡瘻大效

白芨 白蔹 黃丹 密陀僧各一兩 冰片

麝香各半錢 黃連半兩 輕粉一錢

右爲細末和勻每用或摻或紙瘻中以膏藥貼之

甘石散

治下部瘡瘻  
爐甘石 密陀僧各一錢半 輕粉一分 機子

燒灰存性三錢 龍骨半錢 麝香少許

右爲細末先用荆芥杜仲川椒煎湯放溫洗罷次

用藥些少乾貼

博金散

治下疳瘡臭爛腫痛

白礬 密陀僧各五錢同爲末相和入於沙鍋內火

炮汁盡 白芷二錢 乳香五分 麝香一字

黃丹 輕粉各一錢

右爲細末先須另用槐枝葱白鹽甘草熬湯淋溻

洗一二時搘乾摻上項藥每用藥先須洗溻然後

摻藥甚者三五次瘥

勝金散

治下疳潰爛或疼痛

黃連 黃檗 輕粉 銀硃 孩兒茶各五分

右爲細末香油調搽內服加味瀉肝湯

雙解散  
治便癰內蘊熱毒外挾寒邪或交感強固精氣致  
精血交錯腫結疼痛太小便祕者宜用此藥通解  
更隨證調治

蘇桂 大黃酒拌炒 白芍藥 牽牛炒搗

桃仁去皮尖 澤瀉 甘草炒 乾薑炮各五分

右作一劑水二鍾煎八分空心服

滋腎丸

治下焦陰虛小便澀滯或脚膝無力陰汗陰痿或  
足熱不能履地不渴而小便閉

黃檗酒洗焙 知母酒洗焙各一兩 肉桂二錢

右爲末水丸如梧子大每服百丸加至二百丸白

滾湯送下

加減龍膽瀉肝湯

治肝經濕熱玉莖患瘡或便毒懸癰腫痛小便赤

澀或潰爛不愈又治陰囊腫痛或潰爛作痛小便

澀滯或睾丸懸掛

龍膽草酒拌炒黃 澤瀉各一錢 車前子炒

木通 生地黃酒拌 當歸尾酒拌 山梔炒

黃芩 甘草各五分  
右作一劑水二鍾煎八分食前服如熱盛加黃連

大便祕加大黃炒

導水丸  
治便癰初起腫痛及下疳大小便祕又治楊梅瘡

初起濕盛之際宜先用此丸數服

大黃酒拌炒 黃芩炒二錢 黑牽牛末炒

右爲末糊爲丸梧子大每服五十九臨臥溫湯下

玉燭散

治便癰初起腫痛發熱大小便祕用此以散之

川芎 當歸酒拌 茯苓藥 生地黃酒拌 芒硝

大黃煨各二錢 甘草炙五分

右作一劑水二鍾煎八分食前服

托裏當歸湯

治潰瘍氣血俱虛發熱及瘰癧流注乳癰不問腫

潰瘍瘍氣血虛而發熱者皆宜服之久服能收

斂瘍口

當歸酒拌 黃芪鹽水拌炒 人參 川芎

熟地黃酒拌蒸 白芍藥酒炒各一錢 柴胡

甘草炙各五分

右作一劑水二鍾煎八分食遠服

治勞役患便癰不消  
補中益氣湯

人參 黃芪鹽水拌炒 白朮炒各一錢五分

當歸酒拌 陳皮各一錢 柴胡 升麻各五分

右作一劑薑三片棗二枚水二鍒煎八分食前服

補骨脂散

治不慎房勞患便癰或勞役患此腫痛並治之

補骨脂研炒一兩 牛蒡子研炒 牵牛研炒

大黃酒拌炒各五錢

右爲末每服五錢痛甚者一兩空心熱酒調下

又方

治便毒

劉寄奴 王不留行 大黃 金銀花 木鼈子

右等分酒水煎露一宿五更服

又方

治便毒初起

射干二寸 生薑如指大搗細

右取順流水煎微微沸服之以瀉爲度又用牛皮膠

酢煮塗患處射干紫花者是紅花者非

又方

治便毒已結成膿者

連翹 大黃各半兩 枳實 厚朴各三錢

甘草節一錢 桃仁泥二十一枚

右分三服薑三片水煎服

又方

治便毒

青皮 白芷 柴胡 赤芍藥 檳榔 砒硝

烏藥 木瓜 大黃 連翹 苦蔴 生地黃

甘草節 黃芩 三稜 蓬木 尸角 鬼角刺

右爲咬咀以水三椀煎至一椀候大餳服以瀉爲

度

三物湯

治便癰

牡蠣 大黃 山梔子各等分

右爲末以酒水一大盞煎至七分露一宿空心溫

服

狼牙湯景仲

右一味以水四升煮取半升以綿纏筋如繭浸湯

狼牙三兩

瀝陰中日四遍  
消毒五聖湯

治便毒腫疼神效

五靈脂 白殼蠶 麻金 貝母 大黃各三錢

右酒水各半煎服連服三貼立愈

消毒飲

治便毒初發三四日可消

皂針 金銀花 防風 當歸 大黃 甘草節

苦蔴實各等分

右咬咀酒水各半煎食前溫服仍頻提掣頂中髮

立效

止痛妙絕飲

治便毒腫硬不消不潰疼痛無已此方一服立能

止痛

人參 大黃各五錢

右用酒水各一鍾煎至一鍾入乳香沒藥各一錢

空心食前服

牡蠣散

治血瘀卽便毒

酒當歸 甘草節 滑石煅 牡蠣煅各一錢半

大黃三錢 木鼈子五枚杵

右作一劑用水二鍒煎一鍒露一宿五更頓服冬

月火溫服已未潰膿血從大便出薛己曰按此方

乃鹹寒導滯之劑若久曠房室大小便祕發熱煩

痛或交感強固精氣致精血交錯腫結疼痛便祕

者宜用若勞倦之人不甚煩腫大小便如常或小便赤色發熱不作膿及潰而不斂宜用十全大補

湯蓋此證多起於勞役不足或房勞過度精氣俱虛之人俗云一石米瘡此言百日後可愈也若大

補氣血不旬日而愈何用百日蓋瘡之收斂在乎

血氣之盛也嘗治舉人凌待之虛而服尅伐藥幾

致危殆予用托裏健脾藥而消秀才王文遠勞苦

患之服小柴胡湯而表證散後用托裏藥膿成針之而旬日愈胡判官膿清脈弱以大補之藥而已

愈因新婚復發自用連翹消毒湯致瀉痢不止竟

致不救可見此證屬不足多矣非補不可大抵便

毒屬肝經初起堅硬肝主筋故也五七日後當赤

軟膿成若尚堅硬乃元氣虛不能腐化往往人見

堅硬只欲內消反服攻散藥以致虛虛之禍前所

治者卽其驗也

又方

山梔 大黃 乳香 沒藥 當歸各半錢

苦蔞仁二錢 代赭石一錢

右作一服水煎

防風通聖散

治瘡瘍便毒若瀉去芒硝大黃能解暑月熱毒或遍身頭面患瘡

芍藥 芒硝 滑石煅 川芎 大黃煨 桔梗

石膏煅 荆芥 麻黃各四分半 白朮 連翹

當歸 薄荷葉 甘草生 防風 山梔子仁

黃芩焙各八分

右作一劑水二鍾煎八分服薛己曰按此方非表裏俱實大小便祕者恐不可用宜審之

蘇方散

治便毒

木鼈肉 當歸尾 茜藥 白芷 甘草 川芎  
射干 大黃 没藥 蘇木 穿山甲 嫩火煨

忍冬各六分銀花 即金

右細切作一服酒水各一盞煎至一盞食前服

青皮湯

治便毒

青皮 防風 當歸身 甘草梢生各等分

右咬咀分作四服水一小椀煎至八分去粗大溫

服空心日進三服

復原通氣散

便毒初發用此

南木香 延胡索 天花粉酒浸 舶上懷香炒

白牽牛炒 白芷 當歸尾 生甘草各一兩

青木香半兩 穿山甲酒浸炙焦二兩

右爲細末每服二錢食前溫酒調服木香湯亦可

苦蔞散

治便癰等惡瘡

苦蔞一枚 金銀花 牛蒡子炒各三錢 生薑

甘草各半兩

右將藥不犯銅鐵器槌碎用酒一大升煎數沸空

心溫服

追毒散

治便毒腫結

穿山甲蘸酢炙焦五錢 木猪腰子酢微炙三錢  
右爲末每服一錢食前老酒調下次以酢煮肥皂

研膏敷之妙木猪腰子卽木猪苓

立消散

消便毒癰腫如神

全蠍炒 核桃去殼肉只用隔膜炒

右等分爲末空心酒調下三錢下午再服二日全愈

敷藥方

雄黃 乳香各二兩 黃藥一兩

右爲細末用新汲水調敷腫處自消

又方

治便毒

乳香研 沒藥研各半兩 大黃 黃連 黃藥  
半夏 防風 羌活 皂角刺 木鼈子 苦蔞  
甘草節 草烏頭 阿膠炒 南星

右爲細末酢調成膏入石器內火熬黑色鵝翎蘸傅之

威靈仙散

治便毒

威靈仙 貝母 知母各一兩

右三味爲末每服三錢空心溫酒調下如不散再

服薛己曰按此方通經去膿消毒補虛益氣蓋此

證多患於陰虛之人此方乃是二見也亦有焮痛

小便數者宜用加減龍膽瀉肝湯大小便祕焮痛作痛宜八正散憎寒發熱荆防敗毒散然後用此

方若不作膿或膿不潰宜用大補之劑潰而不斂者更用豆豉餅灸之

胃苓散

治便毒

猪苓 潤瀉 白朮 茯苓 蒼朮 厚朴  
陳皮各一錢 甘草炙 肉桂各五分

右作一劑水二鍾薑三片棗二枚煎八分服

金白散葉心  
仰方

治疳瘡

鉛粉不拘多少銀窠傾過取出去鉛每用六錢

輕粉三錢 冰片三分

共研末搽於患處少許先用茶洗淨然後用藥

燈心灰二錢 輕粉二錢 冰片一分

共研末搽於患處如水管腫硬用酸棗樹去粗皮

用內白皮煎水浸洗即消以便搽藥

海蛇子燒灰三錢 孩兒茶二錢 輕粉一錢

片腦一分 黃蘢末五分

共研末搽於患處

又方

牆上久爛螺螄殼洗淨泥煖過五錢 輕粉三錢

片腦一分

共研末搽患處

妬精瘡方

孩兒茶 黃丹各二錢 黃連 赤石脂各一錢

硃砂四分 輕粉三分 黃蘢六分 片腦一分  
共爲末用生豬油三兩取油去查調末搽於患處  
以苦蘿蔔葉貼住

川棟子丸

治疝氣一切下部之疾悉皆治之腫痛縮小雖多  
年服此藥永去根本

川棟子淨肉一斤分四處四兩用麸一合蟹螯四十  
九箇同炒麸黃色去蟹螯不用 四兩用麸一合

巴豆四十九粒同炒麸黃色去巴豆不用 四兩  
用麸一合巴戟一兩同炒麸黃色去巴戟不用

四兩用鹽一兩川茴香一合同炒黃色去鹽茴香不  
用 木香不見火 破故紙炒香爲度各一兩

右爲末酒糊丸如梧子大每服五十九鹽湯下甚  
者日進三兩服空心食前

沉香桂附丸衛生  
寶鑑

療七疝痛引小腹不可忍腰屈不能伸熱熨稍緩  
沉香 附子炮去皮臍 川烏炮去皮臍 官桂

乾薑炮 高良薑炒 吳茱萸熱湯浸去苦  
茴香炒各一兩

右研爲末酢糞糊爲丸如桐子大每服五十九  
至七八十九食前米飲下日二忌生冷

丁香疝氣丸東垣十  
書下同

治腎疝  
當歸 茴香各一兩 延胡索 甘草梢各五錢

羌活七分半 麻黃根節 丁香 川烏 肉桂

防己各二錢半 全蠍三十箇

治疝  
右爲細末酒糊丸如豌豆大每服五十九淡鹽湯

或溫酒送下須空心宿食消盡服之

川苦棟散

治疝

川棟子剉細用巴豆十粒打破一處炒黃去巴豆

茴香鹽一匙炒黃去鹽 木香各一兩

右爲細末每服二錢空心食前溫酒調下

木香棟子散易簡  
方

治小腸疝氣膀胱偏墜久藥不效者服此神效  
川棟子三十箇巴豆二十枚同炒黃赤色去巴豆不  
用 莖薢半兩 石菖蒲炒 青木香各一兩炒

荔枝核二十枚炒

右研爲細末每服二錢入麝香少許空心炒茴香  
鹽酒調下

烏頭桂枝湯金匱要  
略下同

桂枝去皮 茴藥 生薑各三兩 甘草炙二兩  
大棗十二枚擘

大棗十二枚擘

右用烏頭一味以蜜二斤煎減半去滓以桂枝湯  
五合解之得一升後初服二合不知卽服三合又  
不知復加至五合其知者如醉狀得吐者爲中病

烏頭煎

烏頭大者五枚熬去皮不咬咀

右以水三升煮取一升去滓納蜜二升煎令水氣  
盡取二升強人服七合弱人服五合不瘥明日更  
服又不可日再服

胡蘆巴丸和  
劑

治小腸疝氣偏墜陰腫小腹有形如卵上下來去  
痛不可忍或絞結繞臍攻刺嘔吐悶亂

胡蘆巴炒一斤 茴香鹽炒十二兩 吳茱萸洗炒  
十兩 川棟子去核炒一斤二兩 巴戟去心炒

川烏炮去皮臍各六兩

右爲末酒糊丸桐子大每服十五丸至二十九空

心溫酒下小兒五丸茴香湯下一方有黑牽牛

蒺藜湯衛生寶鑑

治陰疝牽引小腹痛諸厥疝卽陰疝也房慾勞役

輒痛不可忍者

蒺藜炒去刺 附子炮去皮臍 山梔仁各等分

右爲末每服三錢水一盞半煎至七分食前溫服

丹溪方

橘核 桃仁 梔子 吳茱萸 川烏各等分

治寒熱疝

右研水煎服

又方

治疝作急痛

蒼朮 香附子俱鹽炒 茴香炒爲佐 延胡索

黃蘖酒炒爲君 青皮去瓤炒 益智仁

桃仁爲臣 附子鹽水炒 甘草爲使

右研末作湯服後一痛過更不作痛矣

倉卒散

一名梔附湯治寒疝入腹卒痛及小腸膀胱氣病  
刺脾腎氣攻攣急痛不可忍屈伸不能腹中冷重

如石白汁出

山梔子四十九箇燒半過 附子一枚炮

右剉散每服二錢水一盞酒半盞煎七分入鹽一

捻溫服卽愈

木香導氣丸

治男子小腸氣肚疼一切氣積補下元虛冷

木香 乳香 川棟子去核 八角茴香 丁香  
香附 破故紙 胡蘆巴 三稜 甘草各一兩

杜仲炒去絲半兩

右爲細末酒糊爲丸梧桐子大每服三十九加至五十九用溫酒或鹽湯空心送下日進三服

補腎湯

治寒疝入腹小腸疔痛時復泄瀉胃膈痞塞

沉香木研五分 人參 茯苓 附子炮去皮臍

黃芪 白朮 木瓜各一錢半 羌活 菖蒲

紫蘇 甘草炙各一錢

右作一服水二鍾薑三片紅棗一枚煎一鍾食前

服嘔吐加半夏一錢生薑七片煎服

敵金丸

治疝氣外腎腫脹極大或生瘡出黃水其痛繞腹  
寒熱往來

京三棱煨 蓬朮煨 猪苓 白附子 蘿蔔子

赤芍藥 黑牽牛 川棟子 山茵陳 青木香

陳橘皮 五靈脂 海藻酒浸焙 小蠻香

穿山甲灰火煨焦 薑黃各一兩 澤瀉一兩半

海浮石醉浸煅紅酢淬再煅再淬黑色爲度一兩

青皮去白二兩一兩生用一兩剉以蟹螯五十枚去

頭足翅同炒黃色去蟹螯不用 南木香半兩

香附子淨二兩一兩生用一兩以巴豆五十粒去殼  
同炒色焦去巴豆不用 丁香二錢半

右爲細末酒煮麪糊爲丸如梧子大每服二十九

用溫酒下此藥能泄斟酌用之

腰子散

黑牽牛炒熟 白牽牛炒熟等分  
治腎氣作痛

右爲細末每用三錢猪腰子一對薄切開縫入川  
椒五十粒茴香一百粒以牽牛末偏摻於腰子中

線繫濕紙數重裏煨熟取出放地上出火氣燈

後空心嚼喫好酒送下少頃就枕天明取下惡物  
卽愈

腎氣疼痛方

治丈夫腎氣婦人血氣疼痛不可忍面青脣黑幾  
於不救丈夫則攻擊臟腑腰背拳曲婦人則腹中  
成塊結爲癥瘕驟然疼痛便至危困經年累月痛  
無暫停者並宜服之

當歸 白芍各一錢 没藥 麒麟竭 延胡索

蓬朮 三稜 牽牛酢煮焙乾 木香各半兩

狼毒半兩碎 芫花四兩同狼毒於瓦器內酢炒黃

右先修製芫花狼毒乳鉢內研如泥又將麒麟竭  
等亦作一處研如飛塵餘藥又作一處爲細末方

將芫花狼毒麒麟竭沒藥等末相和勻更研千遍  
每服一錢半氣痛時葱酒調下和滓喫不可飽食

後喫若大腑熱祕出後不通脣皮焦黑口中涎溢  
喫藥一服效

木香湯

治寒疝攻注脣脛滿痛汗出

木香七分半 檳榔 細辛 赤茯苓 人參

芍藥 當歸切焙 官桂 前胡 青皮各一兩

右剉每服三錢水一盞煎七分去滓服無時

喝起丸

治小腸氣及腰痛

杜仲酥炙去絲 胡蘆巴芝麻炒 破故紙炒

小茴香鹽水浸一宿 胡桃肉湯浸去皮研泥

萆薢各一兩

右爲細末入胡桃肉和勻丸如桐子大每服三十

丸或五十九空心鹽酒或鹽湯下

奪命丹

治遠年近日小腸疝氣偏墜搗痛臍下脹痛以致悶亂及外腎腫硬日漸滋長陰間濕痒抓之成瘡等證

吳茱萸一斤去枝梗淨四兩酒浸 四兩鹽湯浸

四兩酢浸 四兩童便浸 澤瀉二兩酒浸一夜

右爲細末酒糊丸如梧子大每服五十九食前鹽

酒或鹽湯送下

救命散

治小腸疝氣築心疼痛不可忍

肉豆蔻麪裹煨 木香煨各半兩 荆三稜煨

馬蘭花酢炒 金鈴子去核 茴香炒各一兩

右爲細末每服一錢痛時熱酒調服立效

五苓加川棟散

治疝氣卒痛小便澀

猪苓 澤瀉 白茯苓 白朮黃土炒各十八銖

肉桂去粗皮半兩 川棟子一分

澹寮云治疝氣發作痛不可忍真料五苓散一貼連根葱白一寸燈心七莖煎湯吞下青木香丸五十粒卽效又法以青木香丸二百粒蟹蝥七枚去頭翅爲粗末瓦銚以文武火同炒令藥微香用磁

碟蓋之放冷處去蟹蝥取丸子分二服空心茴香酒吞下累效

木香 沉香 巴豆各一兩 青皮去白二兩 銅青半兩研 硝砂一錢研

治膀胱疝氣

木香 沉香 及青皮三味同巴豆慢火炒令紫色去巴豆爲細末入硝砂二味同研勻蒸餅和丸如

桐子大每服七丸至十九鹽湯下日二三服空心等證

右爲細末每服二錢熱酒調服每發痛甚連日只二三服立定

木香散

治心疝小腹痛悶不已

木香 陳皮 高良薑 乾薑炮 詞子去核枳實各一錢半 草豆蔻 黑牽牛 川芎各一錢

水二鍾煎至一鍾食前服或爲細末每服二錢白湯調服

廣木薑散

治心疝心痛肢體虛冷

蓬莪术煨 檳榔 官桂 附子炮去皮臍

甘草炙各半兩 茜草 白朮各七錢半

右剉碎每服二錢水一盞煎七分溫服無時

海蛤丸潔古

治癩疝

海蛤煅酢淬七次 當歸 海金沙 脣粉

硇砂各一錢 海藻 粉霜各五分 青黛

地龍去頭尾 水蛭各二十一條炒 滑石

乳香各一錢 珠砂二錢另研

右爲細末鹽煮麪糊爲丸如小豆大珠砂爲衣每

服十九燈心湯空心服小便下冷膿惡物乃效却

少許熱服如大便祕澀加大黃煎大便溏利加調

子煎食前服

茴香散

荷香 蓬术 京三稜 金鈴子肉各一兩 炙甘草半兩

右爲細末每服二錢熱酒調服每發痛甚連日只二三服立定

木香散

治膀胱氣痛

荷香 蓬术 京三稜 金鈴子肉各一兩 炙甘草半兩

右爲細末每服二錢熱酒調服每發痛甚連日只二三服立定

木香散

治心疝小腹痛悶不已

木香 陳皮 高良薑 乾薑炮 詞子去核枳實各一錢半 草豆蔻 黑牽牛 川芎各一錢

水二鍾煎至一鍾食前服或爲細末每服二錢白湯調服

廣木薑散

治心疝心痛肢體虛冷

蓬莪术煨 檳榔 官桂 附子炮去皮臍

甘草炙各半兩 茜草 白朮各七錢半

右剉碎每服二錢水一盞煎七分溫服無時

海蛤丸潔古

治癩疝

海蛤煅酢淬七次 當歸 海金沙 脣粉

硇砂各一錢 海藻 粉霜各五分 青黛

地龍去頭尾 水蛭各二十一條炒 滑石

乳香各一錢 珠砂二錢另研

右爲細末鹽煮麪糊爲丸如小豆大珠砂爲衣每

服十九燈心湯空心服小便下冷膿惡物乃效却

少許熱服如大便祕澀加大黃煎大便溏利加調

子煎食前服

茴香散

荷香 蓬术 京三稜 金鈴子肉各一兩 炙甘草半兩

右爲細末每服二錢熱酒調服每發痛甚連日只二三服立定

木香散

治心疝小腹痛悶不已

木香 陳皮 高良薑 乾薑炮 詞子去核枳實各一錢半 草豆蔻 黑牽牛 川芎各一錢

水二鍾煎至一鍾食前服或爲細末每服二錢白湯調服

廣木薑散

治心疝心痛肢體虛冷

蓬莪术煨 檳榔 官桂 附子炮去皮臍

甘草炙各半兩 茜草 白朮各七錢半

右剉碎每服二錢水一盞煎七分溫服無時

海蛤丸潔古

治癩疝

海蛤煅酢淬七次 當歸 海金沙 脣粉

硇砂各一錢 海藻 粉霜各五分 青黛

地龍去頭尾 水蛭各二十一條炒 滑石

乳香各一錢 珠砂二錢另研

右爲細末鹽煮麪糊爲丸如小豆大珠砂爲衣每

服十九燈心湯空心服小便下冷膿惡物乃效却

少許熱服如大便祕澀加大黃煎大便溏利加調

子煎食前服

茴香散

荷香 蓬术 京三稜 金鈴子肉各一兩 炙甘草半兩

右爲細末每服二錢熱酒調服每發痛甚連日只二三服立定

木香散

治心疝小腹痛悶不已

木香 陳皮 高良薑 乾薑炮 詞子去核枳實各一錢半 草豆蔻 黑牽牛 川芎各一錢

水二鍾煎至一鍾食前服或爲細末每服二錢白湯調服

廣木薑散

治心疝心痛肢體虛冷

蓬莪术煨 檳榔 官桂 附子炮去皮臍

甘草炙各半兩 茜草 白朮各七錢半

右剉碎每服二錢水一盞煎七分溫服無時

海蛤丸潔古

治癩疝

海蛤煅酢淬七次 當歸 海金沙 脣粉

硇砂各一錢 海藻 粉霜各五分 青黛

地龍去頭尾 水蛭各二十一條炒 滑石

乳香各一錢 珠砂二錢另研

右爲細末鹽煮麪糊爲丸如小豆大珠砂爲衣每

服十九燈心湯空心服小便下冷膿惡物乃效却

少許熱服如大便祕澀加大黃煎大便溏利加調

子煎食前服

茴香散

荷香 蓬术 京三稜 金鈴子肉各一兩 炙甘草半兩

右爲細末每服二錢熱酒調服每發痛甚連日只二三服立定

木香散

治心疝小腹痛悶不已

木香 陳皮 高良薑 乾薑炮 詞子去核枳實各一錢半 草豆蔻 黑牽牛 川芎各一錢

水二鍾煎至一鍾食前服或爲細末每服二錢白湯調服

廣木薑散

治心疝心痛肢體虛冷

蓬莪术煨 檳榔 官桂 附子炮去皮臍

甘草炙各半兩 茜草 白朮各七錢半

右剉碎每服二錢水一盞煎七分溫服無時

海蛤丸潔古

治癩疝

海蛤煅酢淬七次 當歸 海金沙 脣粉

硇砂各一錢 海藻 粉霜各五分 青黛

地龍去頭尾 水蛭各二十一條炒 滑石

乳香各一錢 珠砂二錢另研

右爲細末鹽煮麪糊爲丸如小豆大珠砂爲衣每

服十九燈心湯空心服小便下冷膿惡物乃效却

少許熱服如大便祕澀加大黃煎大便溏利加調

子煎食前服

茴香散

荷香 蓬术 京三稜 金鈴子肉各一兩 炙甘草半兩

右爲細末每服二錢熱酒調服每發痛甚連日只二三服立定

木香散

治心疝小腹痛悶不已

木香 陳皮 高良薑 乾薑炮 詞子去核枳實各一錢半 草豆蔻 黑牽牛 川芎各一錢

水二鍾煎至一鍾食前服或爲細末每服二錢白湯調服

廣木薑散

治心疝心痛肢體虛冷

蓬莪术煨 檳榔 官桂 附子炮去皮臍

甘草炙各半兩 茜草 白朮各七錢半

右剉碎每服二錢水一盞煎七分溫服無時

海蛤丸潔古

治癩疝

海蛤煅酢淬七次 當歸 海金沙 脣粉

硇砂各一錢 海藻 粉霜各五分 青黛

地龍去頭尾 水蛭各二十一條炒 滑石

乳香各一錢 珠砂二錢另研



延胡索炒 桂心 木香各半兩

右爲細末酒糊丸如梧子大每服七十九空心鹽

酒湯下虛寒甚者加炮川烏一兩堅脹久不消者  
加硇砂二錢酢煮旋入

昆布丸

治陰疝腫大偏墜

昆布 海藻各洗去鹹炙 蕃蕷仁炒 燥藜子炒  
去角 檳榔剉各一兩半 枳殼炒 火麻仁研

各二兩 詞藜勒炒去核 黃芪 木香各七錢五

分 陳皮去白炒 桃仁去皮尖炒研 菟絲子酒  
浸一宿另研各一兩

右爲細末研勻煉蜜和丸如梧桐子大每服三十  
丸空心用溫酒或鹽湯送下

雄黃洗方

治陰疝腫痛不能忍及陰腫大如斗核痛者

雄黃研 甘草各一兩 白礬研二兩

右爲細末每用藥一兩熱湯五升通手洗腫處良  
久再緩洗至冷候汗出瘥

香附散

治癩疝脹及小腸氣

香附不拘多少

右爲末每用酒一盞入海藻一錢煎至半盞先撈  
海藻細嚼用煎酒調香附末二錢服一方以海藻  
爲末用熱酒調尤妙甚者灌之一方熱酒下荆芥

末

海藻丸

治偏墜小腸氣效

蟹螯去足翅 巴豆各二十八箇去殼完全者  
海藻 海帶各一兩

右蟹螯巴豆二味同裝生絹袋中用好醋一椀以  
瓦銚盛四味同煮將乾去蟹螯巴豆不用只將海  
帶二味細研爲末以淡豆豉一百粒以煮藥餘酢  
略浸蒸餅爲膏和藥末爲丸如梧子大每服用麝  
香少許硃砂三錢乳鉢細研至無聲却入麝香研  
勻爲衣日乾以新瓦瓶收之每初服七粒再服十  
粒三服十五粒若未愈再進三兩服皆用十五粒  
仍用鹽炒茴香細嚼酒吞下空心服忌鴨子并鮮  
醬動氣等物久病三五服效此藥貴新合效速若  
合下稍久多服爲佳

前陰門五

方三癰痛方延附湯兩解湯又方同春丸狼毒丸益智仁養胃湯

湯大建中湯木香散六合散守效丸香散

瘡痛方刮痛方又方守效丸又方

便癰方摩風膏沉香內消丸抵聖散癌方

又方復元通氣散挂引翠丸代灸塗臍膏又方

廷胡索苦棟湯八味茴香丸四製茱萸丸麻香輕粉散

萸內消丸又方將軍散禹功散文蛤散

痘丸神消散三香酒全鹿丸禹功散文蛤散

加味虎潛丸四聖散大小茴香丸回陽

丹壯精固本丸蛇牀子湯仙傳斑龍丸銀

杏無憂散清肝導滌湯清肝滲濕湯黃芪

毒木通湯九龍丹紅花散瘀湯木香補

托散腎丸滋陰內托散導水消腎丸滋陰丸

寶飲左歸丸滋陰八物湯還元保真湯滋陰丸

補陰益氣煎保陰煎抽薪飲洗薪飲

理陰煎溫胃飲五君子煎六味回陽飲大營煎

肝煎贊育丹芳香散秘元煎固陰煎清化

珠散螺蛸散山甲內消散芍藥蒺藜煎百草煎

桂心疾藜子澤瀉

桃仁蜘蛛各五十枚桂心疾藜子澤瀉

地膚子防風五味子橘皮茯苓防葵

芍藥各二兩牡丹皮細辛海藻各一兩

狐陰一具

癰瘤方千金

桃仁蜘蛛各五十枚桂心疾藜子澤瀉

地膚子防風五味子橘皮茯苓防葵

芍藥各二兩牡丹皮細辛海藻各一兩

狐陰一具

藝術典第二百二十四卷

醫部彙考二百四

前陰門五

方三

癰瘤方千金

桃仁蜘蛛各五十枚桂心疾藜子澤瀉

地膚子防風五味子橘皮茯苓防葵

芍藥各二兩牡丹皮細辛海藻各一兩

狐陰一具

右十六味爲末蜜和丸如梧子大初服十九稍加至三十九方角處一丸令頓上兩爪角各令半丸

上爪指灸七壯愈

兩解湯醫學入門

治便毒內蘊熱氣外挾寒邪精氣交錯腫結疼痛

辯桂大黃白芍藥澤瀉牽牛桃仁各一錢

乾薑五分甘草二分半

右水煎溫服

狼毒丸濟生方下同

治七疝久而不愈發作無時臍腹堅硬疼痛

狼毒剉炒芫花酢炒川烏炮去皮尖各一兩

椒紅炒乾薑炮乾漆炒烟盡鼈甲酢煮

三棱沒藥各半兩全蠍去毒九枚

右爲細末酢糊爲丸如梧桐子大每服四十丸空

心薑湯溫酒任下

益智仁湯

治疝痛連小腹攀搐叫呼不已診其脈沉緊是腎經有積冷所致

益智仁乾薑炮甘草炙茴香炒各三錢

烏頭炮去皮生薑各半兩青皮去白二錢

右咬咀每服四錢水一盞入鹽少許煎至七分去

滓空心食前溫服

延附湯

治七疝心腹冷痛腸鳴氣走身寒自汗大腑泄瀉

延胡索炒去皮附子炮去皮臍各一兩木香不

見火半兩

右咬咀每服四錢水一盞半生薑七片煎至七分

木香陳皮各一兩良薑乾薑調子皮

赤芍藥枳實炒各半兩草豆蔻川芎

去滓溫服不拘時

又方

木香三錢破故紙一兩大茴香川棟二兩小茴香各五錢青鹽一錢五分

右爲末每服一錢溫酒調下

回春丸

治小腸疝氣

白术炒茯苓山楂炒枳實炒八角茴香

吳茱萸炒荔枝核橘核各一兩

白术炒

荳蔻

白术炒

白术炒

白术炒

黑牽牛各三兩

右爲末每服一錢水一盞煎至七分去滓溫服

六合散

一名金鑰匙散治小腸氣結心腹滿胃中結痞走注疼痛

大黃一兩紙裹煨 白牽牛生 黑牽牛微炒  
甘遂各半兩 橫榔生三錢 輕粉一錢

右爲細末每服一錢蜜水調下服量虛實加減

香殼散

治小腸氣臍腹攬痛急陰股中痛悶不省人事  
舶上茴香鹽炒 枳殼各一兩 没藥半兩

治食積與瘀血成痛者

右爲末每服一錢溫熱酒下不計時候併二三服

疝痛方平治會萃下同

梔子 桃仁 山楂 枳實 吳茱萸

右爲末生薑汁順流水作湯調服

劫痛方

治疝按之不痛必用桂枝屬虛也

桂枝 山梔炒 烏頭細切炒

右爲末薑汁爲丸每服三十九

又方

定痛速效

山梔炒 糖慈炒 吳茱萸炒各等分 枳殼十五

箇

右或湯或丸服濕勝者加荔枝核炮

守效丸

治癩要藥不疼者

蒼术 南星 白芷 山楂 川芎 半夏

枳實一本枳核

右爲末神鞠作丸

又方

治陽明受濕熱傳入大腸惡寒發熱小腸連毛際

結核悶痛不可忍

山梔炒 枳殼炒 桃仁炒 山楂各等分

右研細砂鉢內入生薑汁用水一盞煎令沸熱服

之治諸疝發時用海石香附二味爲末以生薑汁

湯調服亦能治心痛

便癰方儒門事親

牡蠣 大黃 甘草各五錢 苦蔞一箇

右酒浸露一宿服之以利爲度

黑龍湯醫學入門

治陰囊腫痛溺澀寒熱作渴

龍膽草炒黑 柴胡 木通 甘草節 金銀花

當歸 皂刺 赤芍 防風 黃連吳萸炒各等分

右水煎服 服腫痛止後加川芎茯苓

漏蘆湯東垣十書下同

治一切癰疽并下疳陰瘡

漏蘆 白薇 黃芩去黑心 麻黃去節 升麻

芍藥 枳實炒去瓢 甘草炙 砂硝各一兩

大黃二兩

右除硝外餘㕮咀與硝同和勻每服三錢氣實人

五錢水一盞半文武火煎七沸去渣空心熱服

五香連翹湯

治前證

麝香一字 沉香 麝香 木香 丁香俱另研  
連翹 射干 獨活 升麻 甘草炙 寄生草各  
一兩 大黃一兩五錢

右七味㕮咀與前五味和勻每服五錢水一盞半  
煎至一盞去渣溫服取利爲度未利再服如前

摩風膏

治前證

白附子 白芍藥 白茯苓 零陵香 白芨  
白芨 白芷 白檀香 麝香 升麻 細辛

黃芪 甘草 杏仁去皮尖各五錢 腦子一分  
苦蔞根一兩 大苦蔞去皮二兩 黃蠟六兩

黃蠟 防風 防風 黃連吳萸炒各等分  
苦蔞根一兩 大苦蔞去皮二兩 黃蠟六兩

芝麻油一斤

右先藥十四味剉油內浸百日於臘月慢木炭火

上銀石器內煎至白芷微黃色離火入苦蔞二味

著內煮百沸重綿濾去渣再慢火上煉油香下淨

黃蠟鎔開爲度傾在磁器內收貯上摻腦子密封

旋用摩風膏貼之

沉香內消丸

治陰癰腫痛偏墜或小腸疝氣下元虛冷久不愈

者

沉香 木香各半兩 胡蘆巴酒浸炒 小茴香炒

各二兩

右爲末酒糊丸梧子大每服五十九鹽酒下

抵聖散

治前證

白枯礬一兩 烏魚骨三錢 乳香二錢 輕粉

乾膩脂一錢 麝香五分

右爲細末或摻或綿以膏貼之

疝方

治諸疝定痛速效

枳實十五片一作橘核 山梔仁炒 山楂肉炒

吳茱萸炒各等分

右爲末酒糊丸服或爲末生薑水煎服或長流水

調下一二錢空心如濕勝加荔枝核炮

又方

治癩疝

天南星 山楂 蒼朮各二兩 白芷 半夏

枳核 神鞠各一兩 海藻 昆布各半兩

元明粉 吳茱萸各二錢

右爲末酒糊丸

腎氣方

船上茴香 破故紙 吳茱萸鹽水炒各五錢

胡蘆巴七錢半 木香二錢半

右爲末蘿蔔搗汁丸鹽湯下

又方

一人疝痛作腹內塊痛止疝痛止腹內塊痛作

三稜 蒟术酢煮 炒鞠 薑黃 南星各一兩

山楂二兩 木香 沉香 香附子酢炒各三錢

黃連用吳茱萸炒去茱萸淨五錢 蘿蔔子

桃仁 山梔 枳實炒各半兩

右爲末薑汁浸蒸餅爲丸

又方

治木疝不痛

枸杞子 南星 半夏 黃藥酒炒 蒼朮鹽炒  
山楂 白芷 神鞠炒 滑石 昆布 吳茱萸  
右爲末酒糊丸桐子大空心鹽湯下七十九

其火力可代灸百壯臍痛亦可貼之

延胡索苦棟湯醫學綱目下同

治腎囊濕瘡

吳茱萸 檀腦 蛇牀子各半兩 輕粉十盞

黃藥 硫黃 檳榔各二錢 白芷 寒水石

白礬各三錢

右爲末先用吳茱萸煎湯洗後用麻油調搽

又方

治疝作痛

蒼朮鹽炒 香附鹽炒 黃藥酒炒 附子鹽炒

延胡索 青皮 益智仁 桃仁 茴香 甘草

右爲末作湯服後一痛過更不再作矣

復元通氣散

治諸氣滯閉耳聾耳痛腹癰便癰瘡疽無頭通一

切氣

青皮 陳皮各四兩 甘草三兩半生半熟

穿山甲炮 苦蔥根各二兩 金銀花一兩

右爲末每服二錢熱酒調下如瘡無頭津液調塗

此方活血止痛內消瘡腫

控引牽丸

治小腸病結

芫花酢炒五錢 茴香炒 棠實剉炒 食茱萸

陳皮 馬蘭花酢炒各一兩

酒送下空心食前

附子 馬蘭子 蛇牀子 木香 肉桂 吳茱萸

右六味爲細末用麪一匙藥一匙生薑汁和煨成

膏攤紙上圓三寸許貼臍下關元氣海自曉至晚

其火力可代灸百壯臍痛亦可貼之

延胡索苦棟湯醫學綱目下同

治臍下冷撮痛陰冷大寒

肉桂

附子各三分 熟地黃一錢 延胡索

苦棟子各二分 甘草梢炙半錢 黃藥一錢

右件都作一服水四盞煎至一盞依法食前服

大戟丸

治陰癩腫脹或小腸氣痛

麝香另研 大戟去皮剉炒黃 附子炮去皮臍

檳榔 茴香 詞子煨去核各半兩 川棟五兩

胡蘆巴四兩 木香一兩

右爲末獨取川棟以好酒二斤葱白頭七枚長三

四寸煮川棟軟去皮核取肉和上件藥杵丸如桐

子大空心溫酒下十九潮發疼痛炒薑熱酒下十

五丸

四製茱萸丸奇效良方下同

治遠年近日疝氣疼痛偏墜腫硬陰間濕痒抓成

瘻癰

吳茱萸一斤用酒酢白湯童便各浸四兩過一宿焙

乾 澤瀉二兩

右爲末酒糊丸梧子大每三十丸空心鹽湯下

三萸內消丸

治腎虛受邪結成寒疝陰囊偏墜痛引臍腹或生

瘡瘍時出黃水

山茱萸 食茱萸 吳茱萸 桔梗 川烏

茴香 痘藥 青皮 肉桂 川棟各二兩

桃仁 枳實 陳皮各一兩 木香一兩半

大腹皮 五味子 海藻 延胡索各二兩半

右爲末酒糊丸如梧子大每三十丸空心溫酒下

八味茴香丸

治疝如神

橘核三兩 枳實八錢 茯苓 白朮 山楂

角茴 吳茱萸 荔枝核各一兩

右爲末蜜丸彈子大每細嚼一丸薑湯下

麝香輕粉散

治血疳瘡陰蝕瘡一切惡瘡皆治

麝香 輕粉各半錢 乳香 沒藥 白簪各一兩

右爲細末量瘡乾貼

積疝丸

山梔一兩 茴香 柴胡各二錢 牡丹皮一錢

右爲末酒糊丸梧子大每五六十九鹽湯下

又方

山楂炒四兩 枳實 茴香炒 山梔炒各二兩

牡丹皮 柴胡 桃仁炒 八角茴香炒各一兩

吳茱萸炒半兩  
右爲末酒糊丸桐子大每服五十九空心鹽湯下

治陰囊腫痛溺澀寒熱作渴

將軍散

右治陰囊腫痛溺澀寒熱作渴

大黃煨 貝母 白芷 甘草節

右爲末酒調空心服虛弱加當歸

禹功散

黑牽牛頭末一錢 小茴香二錢五分 木香一錢

右共爲末每服三錢薑汁調下

文蛤散

治偏墜氣神效

五倍子五六箇燒存性

右爲末陳酒調服以醉爲度

神消散下同

治諸船疝氣外腎腫脹疼痛

益智仁炒七錢 山梔子鹽水炒黑 橘核炒

小茴香鹽水炒各一兩 青皮香油炒六錢

檳榔一錢 荔枝核八錢

右爲細末每服二錢燒酒調服如不用酒以燈草煎湯加鹽少許調服立效

三香酒

治偏墜氣

南木香 小茴香 八角茴香 川棟肉各三錢

右合一服鍋內炒四味入葱白連鬚五根水一椀

淬入鍋將碗罩住候煎至半碗取出去查加陳酒半碗合和入炒鹽一茶匙空心熱服神效

全鹿丸

健陽道補虛損功效不能盡述人製一料服之可以延年一紀其法須四人共製一鹿分服逾年又

共製之四人共製四年則每人得一全鹿若一人

獨製一料恐久畱變壞藥力不全矣

中鹿一隻殺之退去毛將肚雜洗淨鹿肉加酒煮熟將肉橫切焙乾爲末取皮同雜仍入原湯熬膏和藥末肉末加煉蜜和搗爲丸其骨須酥炙爲末同入

人參 白朮炒 茯苓 炙甘草 當歸 川芎 生地黃 熟地黃 黃芪蜜炙 天冬 麥冬

枸杞 杜仲鹽水炒 牛膝酒拌蒸 山藥炒 芙實炒 菟絲子製 巴戟 五味子 肉蓴蓉 琉陽酒拌蒸 破故紙酒炒 胡蘆巴酒拌蒸 覆盆子酒拌蒸 楮實酒拌蒸 秋石 川續斷 陳皮各一兩 川椒去目炒 小茴香炒 沉香 青鹽各半斤

右先須精製諸藥爲末和勻一處候鹿膠成就和搗爲丸桐子大焙乾用生黃絹作小袋五十條每袋約盛一斤懸置透風處用盡一袋又取一袋陰濕天須用火烘一二次爲妙每服八九十九空心臨臥薑湯鹽湯白湯任下冬月溫酒亦可

仙傳斑龍丸

壯精神興痿弱養氣血補百損

鹿角膠 鹿角霜 柏子仁 菟絲子酒拌蒸

熟地黃各八兩 白茯苓 補骨脂各四兩

右將膠先鎔化量入無灰酒打糊丸桐子大每服

六七十九空心淡鹽湯或酒任下

加味虎潛丸

治陽痿腰痛行步無力壯元氣滋腎水

熟地八兩 人參 黃芪製 當歸 杜仲酥炙

牛膝酒蒸 琉陽酒洗 龜板酥炙 菟絲子製

茯苓 破故紙炒 黃藥蜜水炒 知母酒炒  
虎骨酥炙各一兩 山藥炒 枸杞子各二兩

右煉蜜加豬脊髓酒蒸熟同搗丸梧子大每服百

餘丸空心淡鹽湯或酒任下

#### 四聖散

治疝氣外腎腫脹

小茴香炒 穿山甲炒 全蠍炒 南木香各等分

右爲末每服二錢陳酒調一服痛止

#### 大小茴香丸

治疝氣如神

大茴香 小茴香 吳茱萸 川棟 川椒各一兩

右共爲末連鬚葱頭八兩同藥搗成餅子曬乾用粘米五合同藥餅研碎微火炒黃爲末酒糊爲丸如梧子大每服八十九丸空心鹽湯或酒下忌發

氣物

#### 回陽丹

治陰寒囊縮

船上硫黃 附子炮 木香 全蠍 菖澄茄

吳茱萸洗炒各半兩 乾薑炒二錢半

右爲末酒糊丸如梧桐子大生薑湯下三十九

壯精固本丸

填精起痿

枸杞子 人參 沙苑蒺藜 山茱萸

瑣陽 菘絲子各二兩 地黃四兩 麥門冬

歸身 天門冬各一兩 砂仁五錢酒蒸九次

白茯苓 鹿角膠 澤瀉 五味子各兩半

共爲末蜜丸桐子大每服一百丸空心白湯下

蛇牀子湯

外科宗下同

治腎囊風濕熱爲患疙瘩作痒搔之作疼宜洗

蛇牀子 當歸尾 威靈仙 苦參各五錢

水五椀煎數滾入盆內先熏待溫浸洗二次愈

狼毒膏

狼毒 檳榔 硫黃 五倍子 川椒 楊子肉

蛇牀子各三錢

右爲末用香油一大杯煎滾入皮硝三錢再煎滾

次下公猪膽汁一箇和勻調前藥搽患上此藥諸

痒瘡用之並效

銀杏無憂散

水銀 杏仁去皮搗膏 輕粉 雄黃 狼毒

蘆薈各一錢 麝香一分

除木銀杏仁膏餘藥共碾篩細入上一味再碾勻

先用土菖蒲煎湯洗之用針挑去蟲孔隨用津唾

調擦使藥氣入內愈不復生切忌牛犬鑑肉

清肝導滯湯

治肝經濕熱玉莖腫痛小水澀滯作疼者服之

萹蓄四錢 瞿麥三錢 滑石二錢 甘草一錢

水二鍾燈心二十根煎八分空心服便祕加大黃

二錢

清肝滲濕湯

陳皮 木通 昆布 花粉各一錢 甘草五分  
川芎 當歸各六分 木香三分

水二鍾煎八分空心服作熱紅色加黃連龍膽草各七分

#### 解毒木通湯

治男婦房術熱藥所傷致玉莖陰戶痒痛小水澀滯白濁滑精至夜陽物興起不得眠者服之

木通 黃連 龍膽草 瞿麥 滑石 山梔

黃藥 知母各一錢 蘆薈 甘草各五分

水二鍾燈心二十根煎八分食前服

九龍丹

治魚口便毒騎馬癰橫痃初起未成膿者服之

兒茶 血竭 乳香 沒藥 巴豆不去油 木香

右各等分爲末生蜜調成一塊磁盒盛之臨時旋

丸寒豆大每服九丸空心熱酒一杯送下行四五

次方喫稀粥腫甚者間日再用一服自消

紅花散瘀湯

治人房忍精強固不泄以致瘀精濁血凝結兩脅

或小腹之旁結成腫痛小水澀滯者並服之

當歸尾 皂角針 紅花 蘇木 瘤蠶 連翹

石決明 乳香研 穿山甲 貝母去心各一錢

大黃三錢 牽牛一錢

酒水各一椀煎八分空心服行五六次方喫稀粥

補之

黃芪內托散

治魚口便毒橫痃等證已成不得內消者服之

川芎 當歸 黃芪各二錢 白朮 金銀花

天花粉 皂角刺各一錢 甘草 澤瀉各五分

水三鍾煎八分食前服

滋陰內托散

治囊癰已成腫痛發熱服之有膿即可穿潰也

當歸 川芎 白芍 熟地 黃芪各一錢半

皂角針 澤瀉 穿山甲各五分

水二鍾煎八分食前服

導水消腎丸

治囊癰內傷生冷外受風寒以致寒濕浸入囊中

小者如升大者若斗皮膚頑厚陽物短縮小水不利不痛多冷俗稱沙鼓是也宜服此藥引導水氣

日久漸消終身不爲廢也此方常驗

茅山蒼朮一斤米泔水浸切片炒黃 木通半斤

肉桂一兩去麌皮 牽牛二兩微炒 木香一兩

共爲細末陳米粉打糊丸桐子大每服百丸空心

白滾湯清米湯任下忌生冷麪食雖夏月炎天亦

以衣被覆之爲妙

木香補腎丸

治偏墜一名木腎不疼不痒漸漸而大最爲頑疾

有妨行動多致不便但灸木腎子根後宜服此藥

俱可內消此藥功效不獨治疝中年後宜服之益

壽延年黑髮壯筋填髓明日聰耳補腎助元陽調

飲食其功不可盡述婦人服之顏如童女肌膚瑩

潔如玉又精寒血冷久無嗣息者服之更妙

懷慶生地四兩酒煮搗膏 菘絲子 肉蓯蓉

黃精 黑棗肉 牛膝 蛇牀子微炒 荻苓

遠志各一兩二錢 當歸二兩四錢 丁香三錢

大茴香 木香各六錢 柏子仁二兩半 巴戟 杜仲各三兩 青鹽 人參各五錢

右爲細末煉蜜爲丸如梧子大每服六七十九空

心溫酒送下又諸疝不常舉發者服之亦宜

滋陰八物湯

治懸癰初起狀如蓮子紅赤漸腫悠悠作痛者

川芎 當歸 赤芍 生地 牡丹皮 天花粉

甘草節各一錢 澤瀉五分

水二鍾燈心二十根煎八分食前服便祕加蜜大

黃一錢

治懸癰已潰瘍口開張膿水淋漓不能收斂者

當歸 川芎 白芍 熟地黃 白术 白茯苓

人參 黃芪各一錢 牡丹皮 柏子仁各八分

甘草炙 熟附子各五分 肉桂 澤瀉各二分

水二鍾煨薑三片大棗二枚煎八分食前服

滋陰九寶飲

治懸癰厚味膏梁蘊熱結腫小水澀滯大便祕結

內熱口乾煩渴飲冷及六脈沉實有力者服

川芎 當歸 白芍 生地 黃連 天花粉

知母 黃芩 大黃蜜水拌炒各二錢

水二鍾煎八分空心服

左歸丸 景岳全書下同

治真陰腎水不足不能滋養營衛漸至衰弱宜壯

水之主以培左腎之元陰而精血自充矣宜此方

大熟地八兩 山藥炒 柏子仁二兩半

杜仲炒去絲各二錢 炙甘草 肉桂各二錢

鹿角膠敲碎炒珠 龜板膠切碎炒珠 無火者  
精潤者  
不用

菟絲子各四兩 川牛膝酒洗蒸三兩 不精潤者  
不用

右先將熟地蒸爛杵膏加煉蜜丸桐子大每食前用滾湯或淡鹽湯送下百餘丸

右歸丸

治元陽不足或先天稟衰或勞傷過度以致命門火衰宜益火之原以培右腎之元陽而神氣自強

矣此方主之

大熟地八兩 山萸微炒三兩 當歸三兩 便瀉勿用

鹿角膠炒珠 柏子仁微炒 山藥炒 菟絲子製

杜仲薑汁炒各四兩 肉桂二兩漸可加至四兩

製附子自二兩漸可加至五六兩

右丸法如前或丸如彈子大每嚼服二三丸以滾

白湯送下其效尤速

七福飲

凡五臟氣血虧損者此能兼治之足稱王道之最

人參 熟地各隨宜 當歸二三錢 棗仁二錢

白术炒一錢半 炙甘草一錢 遠志三五分製

水二鍾煎七分食遠溫服或加生薑三五片凡治

氣血俱虛等證以此爲主或宜溫者加薑附宜散

者加升麻柴葛左右逢源無不可也

大營煎

治真陰精血虧損及婦人經遲血少腰膝筋骨疼

痛或氣血虛寒心腹疼痛等證

當歸二三錢或五錢 熟地三五七錢 柏子仁

杜仲炒去絲各二錢 炙甘草 肉桂各一二錢

牛膝一錢半

水二鍾煎七分食遠溫服

補陰益氣煎

此補中益氣湯之變方也凡屬陰氣不足而虛邪

外侵者用此升散無不神效

人參一二三錢 當歸 山藥酒炒各二三錢

熟地三五錢或一二兩 陳皮 炙甘草各一錢

升麻三五分火浮于上者勿用

柴胡一二錢無外邪者勿用

水二鍾加生薑三五七片煎八分食遠溫服

保陰煎

治男婦帶濁遺淋色赤帶血脈滑多熱便血不止及血崩血淋或經期太早或一切陰虛內熱動血

等證

生地 熟地 茯苓各二錢 山藥 川續斷

黃芩 黃藥各一錢半 生甘草一錢

水二鍾煎七分食遠溫服

抽薪飲

治諸凡火熾盛而不宜補者

黃芩 石斛 木通 桔子炒 黃藥各一二錢

枳殼 澤瀉各一錢半 細甘草三分

水一鍾半煎七分食遠溫服內熱若甚者冷服更佳

徙薪飲

治三焦火一切內熱漸覺而未甚者先宜清以此劑其甚者宜抽薪飲

陳皮八分 黃芩二錢 麥冬 茯苓 黃藥

茯苓 牡丹皮各一錢半

水一鍾半煎七分食遠溫服

大分清飲

治積熱閉結小水不利或致腰腹下部極痛或濕熱下利黃疸溺血邪熱蓄血腹痛淋閉等證

茯苓 澤瀉 木通各二錢 猪苓 枳殼

水一鍾半煎八分食遠溫服

滋陰八味丸

治陰虛火盛下焦濕熱等證此方變丸爲湯卽名

滋陰八味煎

山藥 山茱萸肉各四兩 牡丹皮 白茯苓

澤瀉 知母鹽水炒 黃藥鹽水炒各三兩

熟地黃八兩蒸搗

右加煉蜜搗丸梧桐子大或空心或午前用滾白湯或淡鹽湯送下百餘丸

六味回陽飲

治陰陽將脫等證

人參二兩或數錢 製附子 炮乾薑各二三錢

炙甘草一錢 熟地五錢或一兩 當歸身三錢

水二鍾武火煎七八分溫服

理陰煎

此理中湯之變方也通治真陰虛弱脹滿嘔嘔痰飲惡心吐瀉腹痛婦人經遲血滯等證

熟地五七錢或一二兩 當歸一二錢或五七錢

炙甘草一二錢 乾薑炒黃色一二三錢

水二鍾煎七八分熱服或加肉桂一二錢

溫胃飲

治中寒疝氣不思飲食

人參一二三錢或一兩 白朮炒一二錢或一兩  
扁豆二錢炒 陳皮一錢或不用 炙甘草一錢

乾薑炒焦一二三錢 當歸一二錢滑泄者勿用

水二鍾煎七分食遠溫服

如寒帶濁者加破故紙一錢

胡

如兼外邪及肝腎之病者加桂枝肉桂甚者加柴

五君子煎

治脾胃虛寒嘔吐泄瀉而兼濕者

人參二三錢 白朮土炒 白茯苓各二錢

炙甘草一錢 乾薑炒黃一二錢

水一鍾半煎服

鎮陰煎

治陰虛於下格陽於上則真陽失守血隨而溢以致大吐大衄六脈細脫手足厥冷危在頃刻而血不能止者速宜用此使孤陽有歸則血自安也如

治格陽喉痹上熱者當以此湯冷服

熟地黃一二兩 牛膝二錢 炙甘草一錢

澤瀉一錢半 製附子五七分或一二三錢

肉桂一二錢

水二鍾速煎服

治肝腎陰寒小腹疼痛疝氣等證

當歸二三錢 枸杞三錢 沉香一錢或木香亦可

茯苓 小茴香 烏藥各二錢 肉桂一二錢

水一鍾半加生薑三五片煎七分食遠溫服如寒甚者加吳茱萸乾薑再甚者加附子

壽脾煎

一名攝營煎治脾虛不能攝血等證凡憂思鬱怒

積勞及誤用攻伐等藥犯損脾陰以致中氣虧陷神魂不寧大便脫血不止或婦人無火崩淋等證

凡兼嘔惡尤爲危候速宜用此單救脾氣則統攝固而血自歸原此歸脾湯之變方其效如神若犯此證再用寒涼則胃氣必脫無不卽斃者并治血

病

白术二三錢 當歸 山藥各二錢 聚仁錢半

遠志三五分 乾薑炮一二三錢 炙甘草一錢

蓮肉炒二十粒 人參隨宜一二錢急者用一兩

水二鍾煎服

祕元煎

治遺精帶濁等病此方專主心脾

遠志八分炒 山藥炒 芙實炒 金櫻子去核

棗仁炒搗碎各二錢 白术炒 茯苓各錢半

炙甘草一錢 人參一二錢 五味十四粒畏酸者不用

水二鍾煎七分食遠服

此治久遺無火不痛而滑者乃可用之如尚有火

覺熱者加苦參一二錢

固陰煎

治陰虛滑泄帶濁淋遺及經水因虛不固等證此

方專主肝腎

人參隨宜 熟地黃三五錢 山藥炒二錢

山茱萸一錢半 遠志七分炒 炙甘草一二錢

五味子十四粒 萍絲子炒香二三錢

水二鍾煎七分食遠溫服

清化飲

治血熱妄行陰虧諸火不清等證

芍藥 麥冬各二錢 丹皮 茯苓 黃芩

生地各二三錢 石斛一錢

贊育丹

治陽痿精衰虛寒無子等證妙方

熟地蒸搗 白术各八兩 當歸 枸杞各六兩

杜仲酒炒 仙茅酒蒸一日 巴戟肉甘草湯炒

山茱萸 淫羊藿羊脂拌炒 肉蓴蓉酒洗去甲

韭子炒黃各四兩 附子製 蛇牀子微炒

肉桂各二兩

右加煉蜜丸服或加人參鹿茸亦妙

荔枝香散

治疝氣痛極凡在氣分者最宜用之并治小腹氣

痛等證神效

荔枝核炮微焦 大茴香等分炒

右爲末用好酒調服二三錢如寒甚者加製過吳茱萸減半用之

芍藥蒺藜煎

治通身濕熱瘡疹及下部紅腫熱痛諸瘡神效外以螺旋粉敷之

龍膽草 檀子 黃芩 木通 淤鴻各錢半

芍藥 生地各二錢 白蒺藜連刺槌碎五錢甚者

人參隨宜 熟地黃三五錢 山藥炒二錢

山茱萸一錢半 遠志七分炒 炙甘草一二錢

五味子十四粒 萍絲子炒香二三錢

如火不甚者宜去龍膽梔子加當歸茯苓薏苡仁之屬

如濕毒甚者加土茯苓五錢或一二兩百草煎

治百般癰毒諸瘡損傷疼痛腐肉腫脹或風寒濕氣留聚走注疼痛等證無不奇效

田野山間百草無論諸品皆可取用然猶以山草爲勝辛香者佳冬月可用乾者須預爲收採之

右不論多寡取以多煎濃湯乘熱熏洗患處仍用布帛蘸之良久務令藥氣蒸透然後敷貼他藥每日二三次不拘但以類數爲善蓋其性之寒者可以除熱熱者可以散寒香者可以行氣毒者可以解毒無所不用亦無所不利湯得藥性則湯氣無害藥得湯氣則藥力愈行凡用百草以前煎者其義亦此此誠外科中最要最佳之法亦傳之於方外人者也

螺旋粉

治濕熱破爛毒水淋漓等瘡或下部腎囊足股腫

痛下疳諸瘡無不神效

海螵蛸 人中白等分或人中黃砂皆可

右爲細末先以百草多煎濃湯乘熱熏洗後以此藥擦如乾者以麻油或熬豬油或蜜水調敷之若

腫而痛甚者加冰片少許更妙若濕瘡膿水甚者加密陀僧等分或煅過官粉亦可加煅製爐甘石更佳

銀硃烟

治頭髮生蟲及諸瘡之有蟲者

銀珠四五分揩擦厚紙上點著置一椀中上用一濕  
椀露縫覆之其烟皆著於濕椀之上

右用指揩椀上烟擦髮中覆以氈帽則蟣蟲皆盡  
矣此烟以棗肉捻作餅或作丸或擦於猪雞熟肝  
之間用貼諸瘡癬之有蟲者及蟲蝕肛門者以綿  
裹棗丸納肛門中一宿無不神效須留綿帶在外  
以便出之

完瘡散

治濕爛諸瘡肉平不斂及諸瘡毒內肉既平而有  
口不收者皆宜用此最妙

滑石飛一兩 赤石脂飛五錢 粉甘草三錢

右爲末乾摻或用麻油調敷或加枯礬一錢痒者  
極宜若痒甚者必有蟲先用水銀三四錢同松香  
二錢研勻後拌前藥和勻敷之

銀粉散

治下疳瘡毋論新久但腐爛作痛及誤熏楊梅瘡  
後致結毒玉莖腐爛或陽物半傷半全者並宜用  
之

好錫六錢化開入硃砂末二錢攪炒砂枯去砂留錫  
再化開投水銀一兩和勻傾出聽用 杭粉一兩鋪  
夾紙平地上捲成一條一頭點火燒至紙盡爲度吹  
去灰用粉 真輕粉一兩

右共成一家研細凡遇前患先用甘草湯淋洗挹  
乾隨用此藥摻上止痛生肌收斂極妙

珍珠散

治下疳皮損肉爛痛極難忍及諸瘡新肉已滿不  
能生皮又湯潑火燒皮損肉爛疼痛不止者

青缸花五分如無可用頭刀花體輕虛而色翠者代之然終不及缸花爲妙研爲極細無聲 真輕粉一兩

右三味共研千轉如飛麪方入罐收凡下疳初起  
皮損搽之卽愈腐爛疼痛者甘草湯洗淨猪脊髓  
調搽如諸瘡不生皮者用此乾摻即可生皮又婦  
人陰蝕瘡或新嫁內傷痛甚者亦用此搽極效湯  
潑火燒痛甚者用玉紅膏調搽之

山甲內消散

治魚口便毒騎馬癰橫痃等證初起未成膿者

當歸梢 甘草節 大黃各三錢 土木鼈三箇

穿山甲炮三大片 煙蠶 黑牽牛各一錢

右以酒水各一椀煎八分空心服查再煎服大便  
行三四次方喫稀粥淡味飲食爲妙



傷門  
事觀

心痛疝氣濕熱因寒鬱而發用梔子降濕熱烏頭破寒氣各一錢爲末順流木入薑汁一匙調下

小腸膀胱痛不可止者神砂一粒丹用熟附子去皮鬱金橘紅各一兩爲末酢麪糊丸如酸棗大朱砂爲衣每服一丸男人酒下女人酢湯下

宣明方

寒疝引脅肋心腹皆痛諸藥不效者大烏頭五枚去皮臍四破以白蜜一斤煎令透取焙爲末別以熟蜜和丸梧子大每服二十丸冷鹽湯下未除

寒疝滑洩腹痛腸鳴自汗厥逆熟附子去皮臍延胡索炒各一兩生本香半兩每服四錢水二盞薑七片

煎七分溫服

濟生方

寒氣心疝三十年者射罔食茱萸等分爲末蜜丸麻

子大每酒下二丸日三服

東陽方

偏墜疝氣白附子一箇爲末津調填臍上以艾灸三

壯或五壯卽愈

簡便方

陰腫疝刺發時腫痛如刺用生射干搗汁與服取利

亦可丸服

消後方

血疝初起胡椒茱萸按接採之

集簡方

偏疝痛極刲之立住用綿袋包暖陰囊取天花粉五

錢以醇酒一盃浸之自卯至午微煎滾露一夜次早

低凳坐定兩手按膝飲下卽愈未下再一服

本草蒙筌方

小腸偏墜天門冬三錢烏藥五錢以水煎服

活人鏡心方

陰潰囊腫木蓮卽木蓮頭燒研酒服二錢

又方木饅頭子小茴香等分爲末每空心酒服三錢取效

集簡方

陰汗濕癢石菖蒲蛇牀子等分爲末日搽二三次急方  
陰下濕癢蒲黃末傅三四度瘥

千金方

陰囊生瘡胡麻嚼爛傅之良

肘後方

小腸疝氣蕎麥仁炒去尖胡蘆巴酒浸曬乾各四兩

小茴香炒一兩爲末酒糊丸梧子大每空心鹽酒下

五十九兩月大便出白膿去根

集效方

治腎氣偏墜牽引及心腹痛茴香浸酒煮飲之

津調散治婦精瘡臍汁淋漓臭爛黃連款冬花各等

分麝香少許共爲細末先以地骨皮蛇牀子煎湯洗

軟帛拭乾摻上忌生湯洗

陰囊或玉莖腫痛葱白乳香搗塗卽時痛止腫消

居山四要

又方用煨葱入鹽杵如泥塗之

陰腫如刺汗出者小蒜韭根楊柳根各一斤酒三升

煎沸乘熱熏之

承願方

陰汗作癢大蒜淡豉搗丸梧子大硃砂爲衣每空腹

燈心湯下三十九

陰腫如斗生蔓菁根搗封之治人所不能治者

集療方

疝氣入腹茴香炒作二包更換熨之

簡便方

小腸氣墜用八角茴香小茴香各三錢乳香少許水

服取汗

直指方

又方用大茴香一兩花椒五錢炒研每酒服一錢良

溫酒調下

集效方

偏墜疝氣痛用舶茴香杏仁各一兩葱白焙乾五錢爲

膀胱疝痛用舶茴香杏仁各一兩葱白焙乾五錢爲末每酒服二錢嚼胡桃送下

本事方

一方用茴香鹽炒晚蠶砂鹽炒等分爲末煉蜜丸彈子大每服一丸溫酒嚼下

集要方

疝氣偏墜大茴香末小茴香末各一兩用牙猪尿胞一箇連尿入二末子內繫定罐內以酒煮爛連胞搗丸如梧子大每服五十九白湯下仙方也

筆峰雜興方

陰囊溫癢松毛煎湯頻洗

簡便方

丈夫陰瘡莖及頭潰爛痛不可忍久不瘥者以五月

保壽堂方

五日繫縷燒灰五分入新出蚯蚓屎二分入少木和研作餅貼之乾卽易禁酒麪五辛及熟食等物效

陰囊溫癢松毛煎湯頻洗簡便方

陰腫痛極馬齒莧搗傅之良

保壽堂方

陰囊癩腫蒿苣子一合搗末水一錢煎五沸溫服

保壽堂方

卵癩偏墜用雙蒂茄子懸於房門上出入用眼視之

保壽堂方

茄苳所患亦蔫茄乾亦乾矣又法用雙茄懸門上每

保壽堂方

日抱兒視之二三次釘針於上十餘日消矣

保壽堂方

小腸氣痛遠臍衝心連蒂老絲瓜燒存性研末煉蜜

保壽堂方

調成膏每服三錢熱酒調下甚者不過二三服消

保壽堂方

卵腫偏墜絲瓜架上初結者留下待瓜結盡葉落取

保壽堂方

下燒存性爲末煉蜜調成膏每晚好酒服一匙如在

保壽堂方

左左睡在右右睡

保壽堂方

陰子偏墜絲瓜葉燒存性三錢雞子殼燒灰二錢溫

選奇方

小腸氣痛大棗一枚去核用蟹螯一枚去頭翅入棗

直指方

內紙包煨熟去蟄食棗以桂心草澄茄湯下

直指方

偏墜疝氣山棠株肉茴香炒各一兩爲末糊丸梧子

大每服一百丸空心白湯下

易簡方

小腸疝氣及陰腫痛橘核炒研五錢老酒煎服或

酒糊丸服甚效

陰冷入腹有人陰冷漸冷氣入陰囊腫滿日夜疼

悶欲死以布裹川椒包裹下熱氣大通日再易之以

消爲度

千金方

腎風囊癰川椒杏仁研膏塗掌心合陰囊

寒疝往來吳萸一兩生薑半兩清酒一升煎溫分服

陰下濕癰吳茱萸煎湯頻洗取效

外臺秘要

陰腫痛癰荷葉浮萍蛇牀等分煎水日洗之

法天生意元戎醫墨

偏墜氣塊雞頭根切片煮熟鹽酢食之

急症方

疝氣痛杉子一歲一粒燒研酒服

外腎偏腫桂末水調方寸匕塗之

梅師方

小腸疝氣烏藥一兩升麻八錢水二鍾煎一鍾露一

宿空心熱服

集效方

癰疝疼痛敗精惡血結在陰囊所致阿魏二兩酢和

蕎麥麪作餅裹之煨熟大檳榔一枚鑽孔鎔乳香填滿亦以蕎麥麪裹之煨熟入硇砂末一錢赤芍藥末

一兩糊丸梧子大每食前酒下三十九

危氏得效方

丈夫疝氣本臟氣傷膀胱連小腸等氣金鈴子一百箇溫湯浸過去皮巴豆二百箇微打破以麪一升同於銅鑄內炒至金鈴子赤爲度放冷取出去核爲末巴麪不用每服三錢熱酒或酢湯調服一方入鹽炒

茴香半兩亦妙

經驗方

疝氣癰腫用荔枝核炒黑色大茴香炒等分爲末每

服一錢溫酒下皆效

孫氏方

來笑丹用荔枝核四十九箇陳皮連白九錢硫黃四

錢爲末鹽水打麪糊丸菜豆大遇痛時空心酒服九

丸良久再服不過三服其效如神亦治諸氣痛

方玉環

陰腫如斗荔枝核青橘皮茴香等分各炒研酒服二

錢日三

水病囊腫牡蠣殼粉二兩乾薑炮一兩研末冷水調

糊埽上須臾囊熱如火乾則再上小便利卽愈一方

用葱汁白麪同調小兒不用乾薑

初虞世古錄驗方

陰腫癰腫橄欖核荔枝核山楂核等分燒存性研末

陰腫囊癰用猪尿胞火炙以鹽酒吃之

救急方

每服二錢空心茴香湯調下

腎風囊癰用猪尿胞火炙以鹽酒吃之

宣急方

男子陰冷以食茱萸納牛膽中百日令乾每取二七

枚嚼納陰內良久如火

千金方

腎冷偏墜疝氣用生雀三枚燎毛去腸勿洗以舶上

茴香三錢胡椒一錢縮砂肉桂各二錢入肚內濕紙

裏煨熟空心食之酒下良

直指

小腸疝氣用帶毛雀兒一枚去腸入金絲礬末五錢縫合以桑柴火煨成炭爲末空心無灰酒服年深者

二服

瑞竹堂方

陰囊濕癰鷦鷯骨蒲黃撲之

醫宗三法

小腸氣痛胡桃一枚燒灰研末熱酒服之

奇良方

治下疳瘡以孩兒茶研爲細末先洗淨瘡乾則小油

調傅濕則乾摻之神效

下部疳瘡用生白果杵塗之

趙原陽

陰瘡牛膝煎服或釀酒服之

蛇牀子溫陰之主藥煎湯浴男女陰去風冷益陽事

去陰汗又爲末和米粉綿裹納陰中卽溫

地膚子治跳躍舉重卒得陰瘡地膚子二兩半白朮

一兩半桂心五錢共爲末酒下三錢

千金方

下疳瘡及陰莖上瘡黃蘗蛤粉等分爲末摻之卽愈

陰蟲作癢乃陰毛際肉中生蟲如蠅或紅或白癢不可忍者白果仁嚼細頻擦之取效

劉長春方

小腸疝氣每頓用鯽魚十箇同茴香煮食久食自愈

生生編

小腸疝氣雞子黃攪溫水服之三服效

陰囊濕瘡出水不瘥用五倍子臘茶各五錢膩粉少許研末先以葱椒湯洗拭過香油調搽以瘥爲度

太平

陰囊濕瘡乃陰毛際肉中生蟲如蠅或紅或白癢不

可忍者白果仁嚼細頻擦之取效

劉長春方

小腸疝氣每頓用鯽魚十箇同茴香煮食久食自愈

生生編

小腸疝氣雞子黃攪溫水服之三服效

陰囊濕瘡出水不瘥用五倍子臘茶各五錢膩粉少

許研末先以葱椒湯洗拭過香油調搽以瘥爲度

太平

陰囊濕瘡乃陰毛際肉中生蟲如蠅或紅或白癢不

可忍者白果仁嚼細頻擦之取效

劉長春方

小腸疝氣每頓用鯽魚十箇同茴香煮食久食自愈

生生編

小腸疝氣雞子黃攪溫水服之三服效

陰囊濕瘡出水不瘥用五倍子臘茶各五錢膩粉少

許研末先以葱椒湯洗拭過香油調搽以瘥爲度

太平

陰囊濕瘡乃陰毛際肉中生蟲如蠅或紅或白癢不

可忍者白果仁嚼細頻擦之取效

劉長春方

小腸疝氣每頓用鯽魚十箇同茴香煮食久食自愈

生生編

小腸疝氣雞子黃攪溫水服之三服效

陰囊濕瘡出水不瘥用五倍子臘茶各五錢膩粉少

許研末先以葱椒湯洗拭過香油調搽以瘥爲度

太平

小腸疝氣每頓用鯽魚十箇同茴香煮食久食自愈

生生編

小腸疝氣每頓用鯽魚十箇同茴香煮食久食自愈

生生編

小腸疝氣每頓用鯽魚十箇同茴香煮食久食自愈

生生編

蓋黃蘗去熱蛤粉燥濕故也

丹溪心法

木腎取雄楮葉曬乾爲末酒糊和丸梧子大空心鹽

酒下三十九楮無實者雄也

綱目

寒疝痛四肢逆冷桂心末一錢熱酒調下

本草下同

腎氣痛須用川椒水煎服

奔豚氣及內外腎牽痛椒葉和艾及葱白同研爛以

酢湯拌署妙秦椒亦可

神妙方治莖頭三五孔小漏瘡出血微膿用油髮燒

作灰存性研細傅之乾則津唾調傅仍以米飲調髮

壯陽起陰研細傅之又治小戶嫁痛燒爲末

灰食前服

直指

陰蝕瘡鰣鯉魚骨爲末傅之不倦原蠶蛾焙爲末酒服一錢

酒服二錢

本草下同

壯陽起陰瘡令交接不倦原蠶蛾焙爲末酒服一錢或丸服亦佳

鰣鱠魚起陽取魚和五味煮熟空心食甚補益

陰蝕瘡取鰣鱠油塗或燒烟熏

小兒陰囊腫痛取地龍糞甘草汁調傅薄荷汁調傅尤好

乾地龍爲末葱椒湯洗後睡調傅

綱目下同

治偏墜大者桂心乾薑各一錢爲末綿一兩水三碗同煮曬乾又浸煮又曬水盡爲度用綿包陰丸汗出數次便愈亦治癩疝不痛

陰瘡用覆盆子作丸久服能令堅長

本草下同

淫羊藿主陰瘡此興陽之劑也取一斤酒浸服之或作丸久服亦佳

海藻療疝核腫常食消男子癩疝入藥服亦佳海帶昆布同功

奔豚疝氣痛葱白濃煎湯飲之

瘻瘍小腹痛細切葱白和鹽炒熨之

壯陽強陰取雀肉以蛇牀子熬膏和丸服名驛馬丸

雀卵和天雄菟絲子丸服令陰強盛

鹿頭壯陽氣作酒及羹粥服

壯狗陰莖主陰瘡令強熱大能生子焙乾爲末和酒服

黃狗肉壯陽道和五味煮熟空心食

腫脹臍主陰瘡助陽氣治疝冷酥炙爲末空心酒下

一錢或丸服之

疝痛牛陰莖炙乾作末溫酒調服

俗方下同

卒疝痛取貉鼠四足燒爲灰酒調服青鼠足黃礦足亦同

偏墜氣痛用五倍子一箇放食鹽少許在內以火紙包定用水浸濕放文武火灰內煨存性爲末酒調服

血疝便毒不拘已成未成隨卽消散蟹螯三箇去翅足炒滑石三錢同研分作三服空心白湯下日一服

毒從小便出如痛以車前木通澤瀉猪苓煎飲名破

偏墜疼痛青娘子紅娘子各十枚白麪拌炒黃色去

陰瘡用覆盆子作丸久服能令堅長

翁方

偏墜疼痛青娘子紅娘子各十枚白麪拌炒黃色去

陰瘡用覆盆子作丸久服能令堅長

治交接傷損卵縮筋攀燒婦人月經衣灰服方寸匕

治男子卵大如斗核痛人所不能療者雄黃一兩研

磬石二兩研甘草生半兩切以水五升煮減半洗腫孔內

痛處

治陰腫皮癧熬桃仁令香細研爲末酒服方寸匕日

三

治陰冷冷氣漸入陰囊腫滿不得眠搗莧菜根傅之

又方煮大薊根汁服一升日三不過三劑愈

陰痛用甘草石蜜等分爲末乳和塗之

小腸疝痛不省人事茴香鹽炒枳殼各一兩沒藥五錢爲末酒下二錢

又方麝香黃芩青藥各等分三味爲末小便後傅上不過三度

陰蝕瘡用蒲黃一升水銀一兩二味研成粉小便後即傅上瘥止

又方以肥猪肉五斤水三斗煮令極爛去肉以湯令極熱浸瘡冷卽易不過三十斤瘥

又方狼牙草兩把切以水五升煮取一升溫洗之日五度

陰蝕生瘡或癧用雄黃磬石各二分麝香半分三味治下篩爲粉傅瘡上卽愈

陰部惡瘡蜜煎甘草末塗之

男女陰瘡石硫黃爲末以傅瘡上

陰下生瘡地榆黃蘗各八兩二味咬咀以水一斗五升煮取六升去滓適冷暖便洗瘡日再或只取黃蘗汁洗亦佳

下疳摻藥輕者用輕粉一味摻上

蕡蕡全書

內外疳瘡冰片二分輕粉六分麝香五分爲細末摻

下疳摻藥青橄欖燒灰孩兒茶各一錢冰片三分爲細末先用杏仁四分去皮尖另研又加輕粉四分和研如泥先傅患上一日米泔洗之後用前摻藥

又方紅棗去核嵌明礬一分珍珠四分煅過存性末

研如泥先傅患上一日米泔洗之後用前摻藥

之乾摻

又方疼痛不可忍者用黑羊角穿山甲煅過研末各

二錢乳香沒藥各一錢空心酒下

下疳熏法菜豆一升煮極爛茶葉五錢研末乘熱傾

在多年馬桶內在無風處熏之待出一身汗妙甚男

婦並用銀粉散治下疳陰頭生瘡用牆上白螺殼不拘多

少火內煅酥爲末水內飛過先去上石粗者次用輕

粉隨分兩入在末內每以少許乾貼在瘡上

陰部生瘡以鯽魚膽擦之

小腸疝痛延胡索鹽炒五錢全蠍一錢爲末酒下一

錢或與乾薑等分末服亦佳入門

隱處疼痛鹽三合炒熱青布包熨之立止

卒疝痛欲死茴香莖葉搗取汁一合和熱酒一合服

之本草下同小便濕痛牛膝五兩酒一升煮半升去渣作三服服

小腸疝氣三服除根地椒一名地蒺藜五錢大戟五

錢水煮食前服服後比口如三角形上於臍中兩臍

旁各灸三壯艾炷如小麥大

疝氣用鬼饅頭黃泥固濟煅過爲末空心酒下

丹胞散治玉莖生瘡臭爛者以猪胞一箇連屎去一

牛屎一半用新甄兩口炭火煅將猪胞連屎於甄上

焙乾不住手移放於兩口輒上輪流不歇莫與火煅著胞待尿乾爲度研爲末入黃丹一錢先用葱湯以

鵝毛抹洗以舊帛拭乾此藥摻三五次立見效

小腸氣上攻者用烏藥良薑白牽牛青皮末之酒下

二錢

又神方用硫黃火中鎔化卽投水中去毒荔枝核炒

焦黃陳皮等分爲末飯丸每服五丸其痛立止疼甚

略用六丸不可多也

小腸疝氣用川棟子一兩破四分巴豆三箇同炒黃

色去巴豆用之茴香一兩鹽炒黃色去鹽用之共爲

細末每服三錢葱白酒調下空心服之名抽刀散舊事

陰痛不可忍吳茱萸二兩洗七遍焙乾微炒檳榔茴

香各一兩爲細末酢糊爲丸熱酒送下十九食前服

之治偏腫巴戟去心川棟炒茴香炒各等分爲末溫酒

調二錢服之

疝氣腫硬地龍不去土爲末唾津調塗病處

小腸氣痛全蠍一兩茴香一兩炒黃共爲細末酢糊

和丸如梧桐子大如發時每服五七十九溫酒送下

食前服之

疝病用枇杷葉野紫蘇葉椒葉水晶葡萄葉以水煎

熏洗丹溪心法

小腸氣及木腎偏墜黑牽牛一斤用猪尿胞裝滿以

線縛定口子好酒米酢各一椀於砂鍋內煮乾爲度

取出黑牽牛用青紅娘子各十九箇於鐵鍋內炒燥

去青紅娘子將牽牛碾取頭末四兩另入猪苓澤瀉

單竹茹湯竹茹一兩水煎濃汁服之治交接勞役卵

細末各二兩酢糊丸如梧桐子大每服三十九空心鹽酒送下不可多服多服令人頭眩如頭眩可服黑

錫丹腎囊濕瘡密陀僧乾薑滑石爲末擦上

騎馬癰用大粉草帶節四兩長流水一椀以甘草淬

焙水盡爲末入皂角炭少許作四服湯調頓服效

梔子散治下疳瘡用梔子一枚去穰入明礬末麪糊

封合口火燒存性爲末乾摻上隨效

小腸氣用血師一兩米醋一升以火燒血師通赤粹

入醋中以粹竭爲度搗羅如麪用湯調下一大盞卽

瘥如神血師代赭石也

敷藥方治便毒腫痛雄黃乳香各二兩黃藥一兩爲

細末用新汲水調敷腫處自消奇效

治腎癰用石蟹熱水磨服

蚯蚓散治陰莖瘡蚯蚓二分菉豆粉一分用水研塗

上乾又傳之一方用豉便民圖纂一分

石灰散治腎漏陰囊先腫後穿破出黃水瘡如魚口

能致命用五倍子同石灰炒黃色去灰攤地出火毒

砂盆內研細末不犯銅鐵乾摻瘡上五七次可

青黛散治下部生瘡熱癢而痛寒熱大小便澀食

亦減身面微腫因多食魚蝦發風熱物得之用馬齒

莧四兩研爛入青黛一兩再研勻塗上立有神效仍

服八正散日三服

爐腦散爐甘石一兩半黃連八錢同入砂鍋煮一宿

去黃連取甘石曬乾入腦五分爲末乾摻治下疳瘡

或湯泡少許洗一切眼疾

## 腫腹痛欲絕

豬脬丸黑雄猪腰子一對不見水去膜切碎以大小茴香末各二兩同猪腰拌勻再以前猪尿脬一箇入腰子於內紮定用酒三椀於砂鍋內懸煮至半椀取起焙乾爲末將餘酒打糊丸梧子大每五十九溫酒下治諸疝除根

國老湯治懸癰用橫紋大甘草一兩截長三寸許取

出山澗東流水一椀不用井水河水以甘草蘸水文武火慢炙不可急性須用三時久水盡爲度劈視草中潤透却以無灰酒二椀煮至一椀溫服一日一服半月消盡爲度

古今醫鑑

鳳衣散治下疳瘡腫痛神效用鳳凰衣煅黃連各等分輕粉片腦各少許爲末濕用乾摻乾用鴨子清調搽

醫學入門

便毒用大黃五錢穿山甲二錢半泥土炒二味共爲

細末新酒調服諒力多寡

醫學集簡

疳蟲下蝕下部用蒲黃水銀研勻敷入外以鶴鱉草煎湯熏洗

景岳全書

妬精陰瘡鉢粉二錢銀杏仁七箇銅銚內炒至杏黃

去杏取粉出火毒研搽

醫學集簡

下疳瘡用鏡鎊同五倍子末等分米泔洗後傅之鏡

鎊即鏡上綠也俗名楊妃垢

便毒初起用古錢與胡桃同嚼食二三枚能消之便

毒屬肝金伐木也

便毒初發取千步峯用生薑蘸酢磨泥塗之千步峯者人家行步地上高起土也乃人往來輾履沾積而成者

下疳陰瘡爐甘石火煅酢淬五次一兩孩兒茶三錢爲末麻油調傅立見效

邵真人方

疳瘡不愈海浮石燒紅酢淬數次二兩金銀花一兩爲末每服二錢半水煎服病在上食後在下食前一年者半年愈

儒門事親

飛絲纏陰腫痛欲死以威靈仙搗汁浸洗一人病得此效

惟證方

陰上粟瘡取停水濕處乾卷皮爲末或油或酢調傅之神效

外臺秘要

陰莖生瘡痛爛者以豉一分蚯蚓濕泥一分水研和塗上乾卽易之禁熱食酒蒜芥菜

藥性論

便毒腫痛貫衆酒服二錢良

多能鄙事

便癰腫痛貝母白芷等分爲末酒調服或水煎服以查貼之

永類鈐方

便毒諸瘡石蒜搗爛塗之卽消若毒太甚者洗淨以生白酒煎服得微汗卽愈

王永濟世方

便癰腫痛鼠黏子一錢炒研末入蜜一匙研末硝一匙

便毒初起芭蕉葉熨斗內燒存性入輕粉麻油調塗一日三上或消或破皆無痕也

直指方

空心溫酒服

袖珍方

便毒初起芭蕉葉熨斗內燒存性入輕粉麻油調塗一日三上或消或破皆無痕也

直指方

便毒初起冬葵子末酒服二錢

儒門事親

便毒初發用黃苦蓼一箇黃連三錢水煎連服有效

露岐便毒生薑蒲根搗傅之

證治要訣

又方用葱根和蜜搗傅以紙密護之外服通氣藥卽

治下疳瘡雄黃黃連等分爲末濕者乾摻乾者油調愈

傅先用荆芥射干煎湯洗拭傅之妙

便毒初起胡桃七箇燒研酒服不過三服見效

便毒腫痛皂角炒焦米粉炒等分研末以熱酢調攤

貼患處頻以水潤之卽效

又方猪牙皂角七片煨黃去皮弦出火毒爲末空心溫酒服五錢

便毒癰疽皂角一條酢熬膏傅之屢效

直指方

玉莖瘡潰絲瓜連子搗汁加五倍子研末搽之

丹溪方

冷淋莖痛槲葉研末每服三錢水一盞葱白七寸煎

六分去渣食前溫服日二

下疳青黛海蛤密陀僧黃連共爲末敷上

男子陰瘡有二種一者陰蝕作白膿出一者只生熱

瘡熱瘡用黃蘗黃芩等分煎湯洗之仍以黃蘗黃連

作末敷之

又法黃蘗煎湯洗之塗以白蜜

附後方

陰瘡濕瘡槐樹北面不見日枝煎水洗三五遍冷再

煖之

必效方

下疳瘡用密陀僧黃蘗各一分半臘粉一錢麝香少

許先洗瘡拭乾傅之甚者三四次卽瘥

外腎偏疼阜角和皮爲末水調傅之良

便毒初起肥阜搗爛傅之甚效

簡便方

玉莖濕瘡肥阜一箇燒存性香油調搽卽愈

方生

陰莖腫痛癩紅椒七粒葱頭七箇煮水洗之一人途中

苦此相山寺僧授此方數日愈名驅風散

經驗方

男女下疳母猪屎黃泥固濟煅存性爲末以米泔洗



陰腫如斗取雞翅毛一孔生兩莖者燒灰飲服左腫

取右翅右腫取左翅雙腫並取

附後方

陰卒腫痛雞翮六枚燒存性蛇牀子末等分隨左右

敷之

附後方

時疾陰腫囊及莖皆熱腫以羊屎黃藥煮汁洗之外

祕要下同

玉莖下疳雞卵殼炒研油調敷之

外腎癰瘍抱出雞卵殼黃連輕粉等分爲細末用鍊

過香油調塗

醫林正宗

橫痃便毒雞子一箇開孔入紅娘子六箇紙包煨熟

去紅娘子食雞子以酒下小便淋瀝出壞血立愈

陸氏

治下疳瘡久不愈橡斗子二箇各盛黃丹令滿相合  
以亂髮纏定燒烟盡爲度同研爲末先以葱白熱漿  
水洗瘡膿盡次上藥甚者不過三次如神

鍼灸

素問曰腰痛不可以轉搖急引陰卵刺八髎與痛上  
八髎在腰尻分間

病在少腹腹痛不得大小便病名曰疝得之寒刺少  
腹兩股間刺腰踝骨間刺而多之盡良病已

督脈者起於小腹以下骨中央女子入繫庭孔其孔

溺孔之端也其絡循陰器合篡間繞篡後別繞臀至

少陰與巨陽中絡者合少陰上股內後廉貫脊屬腎  
其男子循莖下至篡與女子等此生病而從少腹上

衝心而痛不得前後爲衝疝其女子不孕癃痔遺溺  
嗌乾督脈生病治督脈治在骨上甚者在臍下管

邪客於足厥陰之絡令人卒疝暴痛刺足大指爪甲

上與肉交者各一痛男子立已女子有頃已左取右

右取左

靈樞曰足太陰之筋其病陰器紐痛下引臍兩脅痛  
治在燔鍼劫刺以知爲數以痛爲輸

小腸控睪引腰脊上衝心邪在小腸者連睪系屬於

脊貫肝肺絡心系氣盛則厥逆上衝腸胃熏肝散於  
肓結於臍故取之肓原以散之刺太陰以予之取厥  
陰以下之取巨虛下廉以去之按其所過之經以調  
之

足厥陰之別名曰蠡溝去內踝五寸別走少陽其別  
者循脛上睪結於莖其病氣逆則睪腫卒疝實則挺  
長虛則暴癢取之所別也

小腸病者小腹痛腰脊控睪而痛時窘之後當耳前  
熱若寒甚若獨肩上熱甚則手小指次指之間熱若  
脈陷者此其候也手太陽病也取之巨虛下廉

甲乙經曰腰足痛而清善偃睪跳拳上窮主之

腰痛急難陰痛下重不得小便秩邊主之

小腹痛控睪引腰脊痛上冲心腰脊強溺黃赤口

乾小腸俞主之

狐疝驚悸少氣巨缺主之

少腹痛疝引腰脊主之

少腹痛大熱關元主之

陰疝氣疝天樞主之  
癩疝大巨及地機中郄主之

陰疝瘻莖中痛兩丸齋臥不可仰臥刺氣街主之

陰疝冲門主之

男子陰疝兩丸上下小腹痛五樞主之

陰股內痛氣疝狐疝走上下引少腹痛不可俛仰商  
丘主之

陰跳遺溺小便難而痛陰上下入腹中寒疝陰挺出

偏大腫腹臍痛腹中悒悒不樂大敦主之

腹痛上擔心心下滿瘻莖中痛怒瞋不欲視泣出長  
太息行間主之

癩疝陰暴痛中封主之

疝疝陰急股樞腨內廉痛交信主之

氣癃癩疝陰急股樞腨內廉痛交信主之

陰跳腰痛實則挺長寒熱攀陰暴痛遺溺偏大虛則  
暴癢氣逆腫卒疝小便不利如癃狀數噫恐悸氣  
不足腹中悒悒少腹痛嗌中有熱如有瘧肉狀如著  
欲出背攀不可俛仰蠡溝主之

丈夫癩疝陰跳痛引篡中不得溺腹中支脅下榰滿  
閉癃陰痿後時洩四肢不收實則身疼痛汗不出目  
睭睭然無所見怒欲殺人暴痛引臍下節時有熱氣  
筋攀膝痛不可屈伸狂如新發衄不食喘呼少腹痛  
引噫足厥痛湧泉主之

瘻疝然谷主之

少腹痛疝臥善驚氣海主之病在左取右右取左立已

千金方曰失精筋攀陰縮入腹相引痛灸中封五十壯在內踝前筋裏宛宛中

又云灸下滿各五十壯老人加之小兒隨年壯法

會陰主陰頭寒

行間主莖中痛

陰谷主陰痿不用小腹急引陰內廉痛

陰癩灸足大趾下理中十壯隨腫邊灸之肘後方云

灸足趺趾第二節下橫文正中央五壯姚氏云足趺

指本三壯

陰腫痛灸大敦三壯

曲泉主癩疝陰跳痛引臍中不尿陰痿一云痛引莖

中不得尿

中都主癩疝崩中

中脘主衝疝冒死不知人

合陽中郄主癩疝崩中腹上下痛腸澼陰暴敗痛

照海主四肢淫濕身悶陰暴起疝

太谿主胞中有大疝瘕積聚與陰相引

關元主癩疝又云主暴疝痛

臍中石門天樞氣海主小腹疝氣遊行五臟繞臍痛

冲督不得息

四滿主臍下疝積

大陰鄉衝門主疝疾陰疝

天樞主氣疝嘔

大巨主癩疝偏枯

少府主陰痛實時挺長寒熱陰暴痛遺尿偏虛則暴  
瘻氣逆卒疝小便不利

大赫然谷主精溢陰上縮

陰市主寒疝下至腹膀膝腰痛如清水小腹諸痛按  
之下至膝上伏兔中寒疝痛腹脹滿痿少氣

太冲中封地機主癩疝精不足又云太冲主狐疝

厥

陰交石門主兩丸騫又云石門主腹滿疝疾

太冲主兩丸騫縮腹堅不得臥

濟生方曰陰卵偏大癩病關元在臍下三寸灸百壯

良

七疝用鹽半斤炒極熱以故帛包熨痛處

儒門事親曰疝病以艾炷放疝邊豎紋左右交弦灸

七壯

東垣十書曰卒疝痛刺足厥陰

奇效良方曰張仲文神仙灸法腰膝重痛不可轉側

起坐難及冷痹脚筋攀急不可轉側屈伸灸曲膝兩

文頭左右脚四處各三壯每灸一脚二火齊下艾炷

到肉初覺疼痛用二人兩邊齊吹至火滅午時著灸

人定以來臟腑自動一兩行或轉動如雷聲其疾立

愈此法神效卒不可量

醫學綱目曰內經刺灸小腹痛共四法一曰肝經曰

肝病者兩脅下痛引小腹取其經厥陰少陽又曰邪

客厥陰之絡令人卒疝暴痛刺足大指爪甲上與肉

交者各一病男子立已女子有頃已左取右右取左  
者是也

二曰小腸經曰小腸病者小腸痛腰脊控睾而痛時

窘之後取巨虛下廉又云小腸控睾引腰脊上衝心

邪在小腸取之肓原以散之刺太陰以予之取厥陰

以下之巨虛下廉以去之按其所過之經以調之是  
也又云疝暴痛取足太陰厥陰盡刺去其血絡  
三曰膀胱經云膀胱病者小腹偏腫而痛以手按之  
卽欲小便而不得取委中央又云小腹痛腫不得小  
便邪在三焦約取之足太陽大絡者是也

四曰督任衝脈經曰督脈生病從少腹上衝心而痛  
不得前後爲衝脈任脈爲病男子內結之疝女子帶

下瘕聚是也

元臟發動臍下痛不可忍取氣海三陰交立愈左取

右右取左

疝氣少腹偏痛取大敦二分沿皮向後三分瀉之并

灸左取右右取左三陰交一寸瀉十吸

又法取大敦水道小海

又法取中極印腎

卒疝少腹痛不可忍取大敦三分陷六呼灸七壯

陰市三分灸五壯照海三分灸七壯已上皆左取右

右取左

疝癖小腸膀胱腎餘疝氣取氣海五樞各用燔針刺

入五分灸百壯又取三里三陰交

疝取三陰交三里

大法疝病取關門關元水道三陰交不已再取海底

歸來

少腹痛取關元三里

內經刺灸癩疝共四法其一節此篇文所謂鍼石取  
睾囊中水液者是也其法今世人亦多能之睾丸囊  
大如斗者中藏穢液必有數升信知此出古法也

其二取肝經云足厥陰之脈是動則病丈夫癲疝婦人少腹腫是也是於足厥陰肝經視盛虛熱寒陷下而施補瀉留疾與矣也

其三取肝之絡經云足厥陰之別名曰蠡溝去內踝五寸別走少陽其別者循脛上睪結於莖其病氣逆則睪腫卒疝取之所別是也是於內踝上五寸貼脛骨後近肉處蠡溝取之也

其四取足陽明筋經云足陽明之筋聚於陰器上腹其病轉筋髀前腫瘍疝腹筋急治在燔針劫刺以知爲數以痛爲輸是也是於轉筋痛處用火針刺之也

治偏墜當外腎縫沿皮針透卽消

木腎紅腫如升大不痛取大敦三陰交海底歸來在水道下二寸針入二寸半灸七壯

木腎紅腫陰汗偏墜取闡門在毛際玉莖旁開二寸針入二寸半又取三陰交

古今醫鑑曰治一切偏墜氣痛用蓖麻子一歲一粒去皮研爛貼頭項顙上却令患者仰臥將兩脚掌相對以帶上綱二中指於兩指合縫處艾麥粒大灸七壯卽時上去

古今醫統曰潔古云男子陰頭女人陰中痛宜灸刺大敦恆穴陰中濕癩外腎生瘡灸瀉海底

男子陰囊冷女子陰中寒歸來穴灸之

外科正宗曰火針法治魚口便毒橫痃等證用行藥不得內消者用粗線針二條將竹筋一頭劈開將針離分半許夾在筋頭內以線紮緊用桐油燈盞內貯之燈草五根挑入油內點著用針蘸油燒紅向患項重手刺入五六分隨出或血或膿以膏蓋貼卽得輕

便以後漸愈虛者兼服十全大補湯完口  
灸偏墜法候取天晴不犯人神日患者平身仰臥取木腎子根下硬梗盡處以墨點記用安豆大艾炷三年之內灸七壯年多者灸九壯十一壯爲止內服木香補腎丸戒食生冷兼忌房事百日爲妙

景岳全書曰治疝用泥葱白一握置臍中上用熨斗熨之或上置艾灼之妙

又法以葱白爲一束去鬚葉切爲寸厚葱餅烘熱置臍上仍以熨斗熨之尤便而妙

### 導引

醫學入門曰疝病導引法坐舒兩腳以兩手捉大拇指使足上頭下極挽五息止引腹中氣週行身體去疝瘕病利諸竅往來易行久行清爽聰明修長

一法以兩手合搓一二百回以熱手捻大子久久自消而痛亦止

醫方考曰外腎因撲損而傷睪丸偏大有時疼痛者中有死血名曰血疝宜於夜分之時自以一手托其下一手按其上由輕至重丸弄百廻月之間瘀血盡散陳氣皆行誠妙術也雖年深日久無不愈之疾保生祕要曰小腸疝氣導引法用手緊項幽闕納氣數口而緊緊項閉納之立見功效

運功法因慾火積滯外腎復感冷氣故作脹痛不可勝言注意從外腎提氣至內腎又運二七遍卽從內腎想一火提到頂門外略凝而後行吹吸之法  
偏墜外法熨以椒囊散其寒冷待溫熱後作意升法行之

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第二百二十六卷目錄

醫部彙考二百六

前陰門七

醫案

腹也蹶陰有過則脈結動動則腹腫臣意卽灸其足  
蹠陰之脈左右各一所卽不遺溺而溲清小腹痛止  
卽更爲火齊湯以飲之三日而疝氣散卽愈

游宦紀聞曰辛稼軒初自北方還朝官建康忽得癩  
疝之疾重墜大如杯有道人教以取葉珠即薏苡仁也用  
東方壁土炒黃色然後水煮爛入砂盆內研成膏每  
用無灰酒調下二錢卽消沙隨先生晚年亦得此疾

辛親授此方服之亦消然城郭人患不能得葉珠只  
於生藥鋪買薏苡仁亦佳按本草薏苡仁上等上上  
之藥爲君主養命多服不傷欲輕身養命不老延年

者本上經味甘微寒無毒主拘攣不可屈伸除風濕  
痹下氣除筋骨寒邪氣不仁利腸胃消水腫令人能

食久服輕身益氣其根下三蟲生真定平澤及田野  
八月採實採根無時今在在有之真良藥也蜀中巴  
蓬間甚多士大夫以此相饋遺雜之飲食間也饒之  
城中有宗子善平病腎虛腰痛沙隨先生以其尊人  
所傳宋誼叔方用杜仲酒浸透炙乾搗羅爲末無灰  
酒調下趙如方製之三服而愈

儒門事親曰律科王敏之病寒疝臍下結聚如黃瓜  
每發急痛不能忍戴人以舟車丸猪腎散四五  
行覺藥繞病三五次而下其瀉皆水也猪腎甘遂皆  
苦寒經言以寒治寒萬舉萬全但下後忌飲冷水及  
寒物宜食乾物以寒疝本是水故也卽日病減八分  
食進一倍又數日以舟車丸百餘粒通經散四五錢  
服之利下候三四日又服舟車丸七八十粒猪腎散  
三錢乃健步如常矣

一僧病疝發作冷氣上貫齒下貫腎緊若繩挽兩睾  
虛裏處旦日死一番一絡者牡疝也臣意曰他所診  
期決生死及所治已病衆多久頗忘之不能盡識不  
敢以對

齊北宮司空命婦出於病衆醫皆以爲風入中病主  
在肺刺其足少陽脈臣意診其脈曰病氣疝客於膀  
胱難於前後溲而溺赤病見寒氣則遺溺使人腹腫  
出於病得之欲溺不得因以接內所以知出於病者  
切其脈大而實其來難是蹶陰之動也脈來難者疝  
氣之客於膀胱也腹之所以腫者言蹶陰之絡結小

藝術典第二百二十六卷

醫部彙考二百六

前陰門七

醫案

史記倉公傳曰安陵阪里公乘項處病臣意診脈曰  
牡疝牡疝在鬲下上連肺病得之內臣意謂之慎母

爲勞力事爲勞力事則必嘔血死處後蹴踖要蹶寒  
汗出多卽嘔血臣意復診之曰當旦日死卽死

病得之內所以知項處病者切其脈得番陽番陽入  
虛裏處旦日死一番一絡者牡疝也臣意曰他所診

期決生死及所治已病衆多久頗忘之不能盡識不  
敢以對

時腫而冷戴人診兩手脈細而弱斷之曰秋脈也此  
因金氣在上下伐肝木木畏金抑而不伸故病如是  
肝氣鬱不能下榮於睂丸故其寒實非寒也木受  
金制傳之胃土胃爲陽明故上貫齒病非齒之病肝  
木者心火之母也母旣不伸子亦屈伏故下冷而水  
化乘之經曰木鬱則達之土鬱則洩之令涌洩四次  
果覺氣和睂丸癢而暖戴人曰氣已入睂中矣以茴  
香莪术之藥使常服之首尾一月而愈

霍秀才之子年十二歲睂丸一旁腫墜戴人見之曰

此因驚恐得之驚之爲病上行則爲嘔血下則腎傷  
而爲水腫以琥珀通經散一瀉而消散

汝南司候李審言因勞役王事飲水坐濕地乃濕氣

下行流入脬囊大腫痛不可忍以金鈴川棟子等藥  
不效求治於戴人曰可服洩水丸審言惑之又數日  
痛不可堪竟從戴人先以舟車丸瀆川散下青綠沫  
十餘行痛止次服茴香丸五苓散以調之三日而腫  
退至老更不復作夫疝者乃肝經也下青沫者肝之  
色也

東垣十書曰一富者前陰間嘗聞臊臭又因連日飲  
酒腹中不和求予治之予應之曰夫前陰者足厥陰  
之脈絡陰器出其挺孔凡臭者心之所主散入五方  
爲五臭入肝爲臊此其一也當於肝經中瀆行間是  
治其本後於心經中瀆少衝乃治其標如惡針當用  
藥除之酒者氣味俱陽能生裏之濕熱是風濕合於  
下焦爲邪故經云下焦如瀆又云在下者引而竭之  
酒是濕熱之水亦宜決前陰而去之

證治準繩曰鮑兄二十餘歲玉莖挺長腫而痿皮塌



中甘草等分與之遂安

醫宗必讀曰常州尹文輝嗜火酒能飲五斤五月間入閩中溪水驟漲涉水至七里覺腹痛之甚半月後右丸腫大漸如斗形閩中醫者與肝經之劑及溫熱之品半載無功歸而就商於余余曰嗜火酒則濕熱滿中涉大木則濕寒外束今病在右正是脾肺之濕下注睾丸以胃苓湯加梔子枳殼黃蘗茴香十劑而略減即以爲丸服至十八斤全安經今十五年不再發

文學駱元賓十年患痞形容枯槁余視之左脅有形其大如臂以熱手握之瀝瀝有聲甚至上攻於心悶絕者久之熱酢熏炙方甦余曰此經所謂厥痞也用當歸四逆湯半月積形衰小更以八味丸間服喜其遵信余言半載無間積塊消盡嗣後不復患矣

薛氏醫按曰學士徐嶠西口乾有痰欲服瓊玉膏余曰此沉陰降火之劑君面白口乾而有痰屬脾肺氣虛也當用溫補之劑不信仍服兩月餘大便不實飲食少思且兼陰痿始信余言先用補中益氣加茯苓半夏二味以溫補脾胃飲食漸加大便漸實乃去二味服月餘而瘡更服六味丸三月餘陰道如常矧瓊玉膏固本丸坎離丸此輩俱是沉寒瀉火之劑非腸胃有燥熱者不宜服若足陰經陰虛發熱者久而服之令人無子蓋謂損其陽氣則陰血無所生故也屢驗

一婦人吐痰發熱遍身痛小便頻數陰中作癢日晡熱甚余曰此肝脾血虛氣滯而兼濕熱也用加味逍遙散加車前子而愈

靳閣老子玉莖腫痛服五苓散等藥不應予診其脈左關弦數此肝經積熱而成以小柴胡湯送蘆薈丸一服勢去三四再服頓愈

黃吏部穀道前水道後患毒瘻痛寒熱此肝經濕熱所致名曰懸瘻屬陰虛證先以製甘草二服退再以四物湯加車前子青皮甘草節酒製黃蘗知母數服而消

一弱人陰莖根結一核如大豆許若少勞則腫痛先以十全大補湯去桂加車前子麥門冬酒製黃蘗知母少愈更服製甘草漸愈仍以四物湯加車前之類

而消

一人患懸瘻焮痛發熱以龍膽瀉肝湯二劑及製甘草四劑而潰再用滋陰之劑而愈若或膿未成以葱炒熱敷上冷易之隔蒜灸之亦可數日不消或不潰或潰而不斂以十全大補湯加柴胡梢爲主間服製甘草並效若不保守必成漏矣

一男子患懸瘻焮痛發寒熱以小柴胡湯加製甘草二劑少退又製甘草四劑而消大抵此證屬陰虛故

不足人多患之寒涼之劑不可過用恐傷胃氣惟製甘草一藥不損氣血不動臟腑其功甚捷最宜用之玉膏固本丸坎離丸此輩俱是沉寒瀉火之劑非腸

一男子患懸瘻腫痛小便赤澀以加減龍膽瀉肝湯加製甘草二劑少愈以參芪歸朮黃蘗知母製甘草四劑而潰更以四物湯加黃蘗知母參芪製甘草而

一男子患懸瘻久而不斂脈大而無力以十全大補

一老人患懸瘻年餘不斂診其脈尚有濕熱以龍膽瀉肝湯二劑與服而濕退乃以托裏藥及豆豉餅灸之愈

一男子患懸瘻腫痛發熱以小柴胡湯加黃連青皮四劑少愈更以加減龍膽瀉肝湯而消

一男子患懸瘻腫痛未作膿以加減龍膽瀉肝湯二劑少愈以四物湯加木通知母黃蘗而消

止以托裏消毒散數劑而愈常見患者多不肯用針

而

待其自破殊不知緊要之地若一有膿宜急針之使毒外發不致內潰故前人云凡瘻若不針烙毒結無

從

而解膿瘀無從而洩又云宜開戶以逐之患者反謂地部緊要而不用針何其相違之遠哉

一男子患懸瘻膿熟不潰脈數無力此氣血俱虛也欲治以滋陰養氣血之劑更針之使膿毒外洩彼疑而不從仍用降火敗毒藥致元氣愈虛瘻勢愈盛後

潰

不斂竟至不救夫懸瘻之證原係肝腎二經陰虛雖一於補尤恐不治况膿成而又尅伐不死何俟常治初起腫痛或小便赤澀先以製甘草一二劑及隔蒜灸更飲龍膽瀉肝湯若發熱腫痛者以小柴胡湯加車前黃蘗川芎當歸膿已成卽針之已潰者用八珍湯加製甘草柴胡梢酒炒黃蘗知母小便澀而脈有力者仍用龍膽瀉肝湯加製甘草小便澀而脈無力者用清心蓮子飲加製甘草膿清不斂者用大補之劑間以豆豉餅灸之久而不斂者用附子餅灸之並效

一男子患懸瘻久而不斂脈大而無力以十全大補力者用清心蓮子飲加製甘草膿清不斂者用大補之劑間以豆豉餅灸之久而不斂者用附子餅灸之並效

尚寶鮑希傳足發熱服四物黃藥知母之類年餘患懸瘤唾痰作渴飲湯其熱至膝更加黃連二陳熱痰益甚謂余曰何也余曰此足三陰虧損水泛爲痰寒涼之劑傷胃而甚耳遂朝用補中益氣夕用六味九間佐以當歸補血湯半載乃愈

趙州守患懸瘤腫多作痛已五月餘矣晡熱口乾盜汗食少體倦氣短脈浮數而無力此足三陰氣血俱虧損也用補中益氣湯加製甘草五味子麥門冬三十餘劑食進熱緩又用六味丸料五十餘劑膿潰瘍斂後因怒作痛少食脅痛發熱仍用前藥賴其稟實慎疾而愈

一鄰人年三十有下疳瘡雖屢求治以其不能忌口却之忽一日頭痛發熱自汗衆作傷寒陽證治之反劇予診其脈弦甚七至重按則澀予曰此證在厥陰藥與證不相應遂作小柴胡湯加草龍膽黃連胡黃連帶熱服四劑而病脫然

庶吉士劉華甫或莖中作痛或竅出自白津或小便祕澀先用小柴胡湯加山梔澤瀉黃連木通膽草茯苓二劑以清肝火導濕熱諸證漸愈後因勞倦忽然寒熱此元氣復傷也用補中益氣湯而安又用六味丸生肝血滋腎水而全愈

州守姜節甫患下疳膿水淋漓作渴吐痰午前惡寒午後發熱余曰午前惡寒屬陽氣虛弱午後發熱屬陰血不足不信反服二陳黃藥知母之類飲食益少大便不實又日晡熱渴小腹重墜患處焮痛乃用四物湯加黃藥知母之類飲食亦不思余以脾氣虛而下陷先用補中益氣湯調養脾胃以升陽氣諸證漸

愈又用六味丸滋補腎水以生肝血而痊一小兒十五歲患下疳雜用消毒之藥虛證悉具二年餘矣詢之乃稟受所致用萆薢湯月餘諸證漸愈又用補陰八珍補中益氣二湯而痊

一儒者莖中作癩發熱倦怠外皮浮腫二年矣用八珍加柴胡山梔及六味地黃丸而愈有兼陰毛間生蟲作癩者用桃仁研爛塗之

一儒者因勞而患下疳焮痛寒熱體倦頭痛小便赤澀用補中益氣湯加車前牛膝山梔而愈

一儒者陰莖腐爛腫痛不止日晡熱甚口乾體倦食少欲嘔此肝脾血虛也先用六君子加柴胡升麻脾胃醒而諸證退更以補中益氣加炒山梔肝火退而腫痛痊

一老人患疳小便淋瀝脈細體倦此氣虛兼濕熱也用清心蓮子飲及補中益氣湯治之而愈

一弱人拗中作痛小便淋瀝此因火燥下焦無血氣不能降而滲洩之令不行用四物湯加黃藥知母茯苓牛膝木通十餘貼痛止便利

先君氣短拗中苦瘡小便不通製四物湯加參芪煎吞滋腎丸而愈蓋前證以虛爲本以病爲末益其本則末自去設若不固元氣專攻其病害滋深矣

王錦衣年踰四十素有淋患疳瘡焮痛倦怠用小柴胡湯加黃連黃藥青皮當歸而愈

杜舉人名京年踰三十陰囊濕癰莖出白物如膿舉則急痛此肝疝也用龍膽瀉肝湯而愈有陰莖腫或縮或挺或癩亦以此藥治之

王上舍遺精勞苦愈甚拗中結核服清心蓮子飲連

翹消毒散不應予以八珍湯加山藥山茱萸遠志十餘劑漸愈更以茯苓丸治之遂不復作葉巡檢患此云諸藥不應盧丹谷與八味丸治之而愈

一男子患下疳腫硬焮痛寒熱先以人參敗毒散二劑而止更以小柴胡湯加黃連青皮治之而愈

一男子下疳潰而腫痛小便赤澀以加減龍膽瀉肝湯加青皮黃連二劑少愈以小柴胡湯加黃藥知母當歸茯苓數劑而愈

一男子因勞莖竅作癩時出自物發熱口乾以清心蓮子飲治之而安

一男子下疳潰而腫痛發熱日晡尤甚以小柴胡湯加黃連知母當歸而愈

一男子下疳已愈惟莖中一塊不散以小柴胡湯加青皮荆防服之更以荆芥防風牛膝何首烏滑石甘草各五錢煎湯熏洗各數劑而消

一男子莖腫不消又一男子潰而腫痛發熱小便澀澀日晡或熱又一小兒腫痛諸藥不應各以小柴胡湯吞蘆薈丸數服並愈

一男子玉莖腫痛小便如淋自汗甚苦時或尿血少許尺脈洪數按之則濶先用清心蓮子飲加牛膝山梔黃藥知母柴胡數劑少愈更以滋腎丸一劑而痊

玉機微義云如自汗小便少不可以藥利之既已自汗則津液外亡小便自少若利之則榮衛枯竭無以制火煩熱愈甚當俟熱退汗止小便自行况此證乃陽明經大忌利小便也

一男子陰莖或腫或作痛或挺縱不收一男子莖中作痛筋急縮或作癩白物如精隨溺而下此筋疝也

並用龍膽瀉肝湯治之皆愈張子和曰遺溺閉癃陰

痿脬痹精滑白淫皆男子之病也不可妄歸之腎冷

若血涸不月月罷腰膝上熱足躊躇乾癰閉少腹有

塊或定或移前陰突出後陰痔核皆女子之病也但

女子不謂之疝而謂之瘕

一男子患便毒腫而不潰余謂此因陽氣虛弱用參

芪歸朮以補托元氣用白芷皂角刺柴胡甘草節以

排膿清肝數劑而潰以八珍加柴胡補其氣血數劑

而愈

胡判官患便毒膿稀脈弱以十全大補湯加五味麥

門白芍三十劑稍愈更以參芪歸朮膏而平因新婚

復發聚腫堅硬四肢冷脈弱皮寒飲食少思此虛極

也仍用前藥加桂附三劑稍可彼欲速愈自用連翹

消毒飲洩利不止而歿

京臺王文遠年踰四十素勞苦患便毒發寒熱先以

小柴胡湯加青皮一服表證悉退次以補中益氣湯

加穿山甲二劑腫去三四更以托裏之藥五六服膿

成刺去旬日而斂

一人便毒腫而不潰以參芪歸朮甘草節皂角針白

芷柴胡數劑而潰以八珍湯加柴胡數劑愈

一人便毒潰而腫不消且不斂診脈浮而濇以豆豉

灸更以十全大補湯月餘而愈

一老婦便毒腫痛膿未作小便滯肝脈數以加減龍

膽瀉肝湯加山梔黃芩四劑而消

一儒者便毒腫痛便澀用八正散二劑清肝火導濕

熱而腫痛愈更以小柴胡加芎歸澤瀉山梔二劑清

肝火補脾血而小便利

一男子便毒潰而腫痛不止此餘毒未解用活命飲一劑而痛止再劑而腫消

一男子便毒痛甚發熱用前飲一劑痛止再以神效苦蓼散加山梔柴胡二劑而消

一男子便毒已潰而痛不止小便祕澀此肝火未解也與小柴胡湯加黃芩知母芎歸痛止便利更以托

裏當歸湯而瘡斂若未解而痛不止者須用活命飲

消之

一人便毒膿未成大痛服消毒托裏內疏藥不應脈洪大毒尚在以仙方活命飲一劑痛止又劑而消

一人便毒潰而痛不止諸藥不應診之脈大按之則數乃毒未解也以仙方活命飲而止又一劑而消

一人便毒腫痛日晡發熱以小柴胡加青皮天花粉四劑痛止熱退以神效苦蓼散四劑而消

沈尼文年二十左拗患便毒余以肝腎陰虛先用托裏藥潰而將愈因入房發熱作渴右邊亦作痛膿水

清稀虛證悉至脈洪大而無力勢甚可畏用十全大補加附子一錢脈證頓退再劑全退後用大補湯三

十餘劑而痊

一人便毒腫惡寒發熱以荆防敗毒散二劑而止

以雙解散二劑而消

一人便毒焮腫作痛大小便祕脈有力以玉燭散二

劑頓退更以龍膽瀉肝湯四劑而消

一人便毒服丸藥以求內消致瀉利少食以二神

丸先止其瀉以十全大補倍加白朮茯苓數劑消

一婦素清苦因鬱怒患便毒或用敗毒寒涼之藥反

哺熱內熱自汗盜汗月經不行口乾咽燥余謂此鬱

氣傷脾因藥復損先以當歸湯數劑後兼逍遙散各五十餘劑而諸證皆愈

舉人凌待之年踰四十患便毒尅伐太過飲食少思大便不實遺精脈微東垣云精滑不禁大便自利腰

腳沉重下虛也仲景曰微弱之脈主氣血俱虛也先以六君子湯加破故紙肉豆蔻煎服瀉止食進更以

十全大補湯加行經藥十餘劑而消

一男子膿熟作脹致小便不利令急針之以小柴胡湯加黃芩白芷金銀花四劑少愈更以托裏消毒散

一男子膿熟作脹致小便不利令急針之以小柴胡湯加黃芩白芷金銀花四劑少愈更以托裏消毒散

數劑而愈

一男子陰囊腫狀如水晶時痛時癢出水小腹按之

作水聲小便頻數脈遲緩此醉後飲水入房汙出遇風寒濕毒乘聚於囊爲患名水疝也先以導水丸二

服腹水已去小便如常再飲胃苓散倍用白朮茯苓

更用氣針引去聚水而瘥

一弱人囊癰腫痛未成膿小便赤澀以製甘草青皮木通黃芩當歸麥門冬四劑少愈以清心蓮子飲而

消

一男子囊癰焮腫痛甚小便澀發熱脈數以龍膽瀉

肝湯倍用車前子澤瀉木通茯苓四劑勢去半仍以前湯止加黃芩金銀花四劑又減二三便利如常惟

一處不消此欲成膿也再用前湯加金銀花白芷皂角刺六劑微腫痛脈滑數乃膿已成令針之腫痛悉

退投滋陰托裏藥及紫蘇末敷之而愈

一男子囊癰病勢已甚脈洪大可畏用前湯二劑腫

少退以仙方活命飲二劑痛少止診其脈滑數乃膿

已成須針之否則陰囊皆潰彼疑余言遂用他醫果

大潰瘍九掛懸復求治診之脈將靜以八珍湯加黃芪黃蘗知母山梔更敷紫蘇末數日而痊此證勢雖可畏多得保全患者勿懼

一弱人囊癰膿熟脹痛大小便祕急針之膿出三椀許卽鼾睡覺而神思少健但針遲雖敷解毒藥亦潰盡矣故用托裏藥三十餘劑始瘥大抵此證屬陰道虧濕熱不利所至故滋陰除濕藥不可缺常治腫痛小便祕澀者用除濕爲主滋陰佐之腫痛已退便利已和者除濕滋陰藥相兼治之欲其成膿用托裏爲主滋陰佐之候膿成卽針之仍用托裏滋陰藥濕毒已盡者專用托裏如膿清或多或少或斂遲者用大補之劑及豆豉餅或附子餅灸之

盧武選封君年踰五十患囊癰瘍口年餘不斂診之微有濕熱以龍膽瀉肝湯治之濕熱悉退乃以托裏藥及豆豉餅灸之而愈次年復患濕熱頗盛仍用前湯四劑而退又以滋陰藥而消若潰後虛而不補少壯者成漏老弱者不治膿清作渴脈大者亦不治胡同知陝西人年踰五十陰囊腫痛得熱愈盛服蟠葱散等藥不應肝脈數此囊癰也乃肝經濕熱所致膿已成急針之進龍膽瀉肝湯脈證悉退更以托裏滋陰藥外搽杉木灰紫蘇末月餘而愈此證雖潰盡而無害患者審之

一道官年六十餘陰囊潰痛不可忍罩丸露出與龍膽瀉肝湯服之及敷麸炭紫蘇末不應予意此濕氣熾盛先飲槐花酒一椀次服前湯少愈更服托裏加滋陰藥月餘而平設以前藥不應加之峻劑未有不損中氣以致敗也

一人連日飲酒陰挺并囊濕癰服滋陰等藥不應予謂前陰肝脈絡也陰器縱挺而出素有濕繼以酒爲濕熱合於下焦而然經曰下焦如瀆又云在下者引而竭之遂以龍膽瀉肝湯及清震湯而愈此或不應宜補肝湯及四生散治之

儒者陳時用考試不利一夕飲燒酒入房妻不納翌

日陰囊腫脹焮痛遣人求治予以除濕熱清肝火之劑城門夜閉不及歸服翌早報云夜來陰囊悉腐玉莖下面貼囊者亦腐此肝火挾酒毒而濕熱熾盛也仍以前藥加參芪歸朮四劑腐肉盡脫罩丸懸掛用

大補氣血藥并塗當歸膏囊莖全復而愈

給事陸貞山囊癰腫赤脹痛小便澀滯寒熱作渴此肝腎陰虛濕熱下注也當清肝火除濕毒遂用柴胡炒龍膽吳茱萸炒黃連當歸金銀花皂角刺赤芍藥防風木通甘草節一劑腫痛漸退少加防風木通川芎茯苓作飲下滋腎丸以補陰其熱腫俱退但內有一條筋不消此肝經血氣虛損也當滋腎水用六味丸料去茯苓加五味二劑再用補中益氣加茯苓作飲送滋腎丸筋頓消而愈

京兆朱二峯陰囊脹痛彼以爲痼予診其脈數而滑此囊癰也因肝腎二經陰虛濕熱所致膿已成矣服活命飲一劑而潰用補陰托裏藥而斂

一膏梁之客陰囊脹痛小便不利此中焦積熱乘虛下注先用龍膽瀉肝湯加黃蘗知母黃連牛膝四劑漸愈後用補陰八珍湯加柴胡山梔而愈後不守禁忌前證復作仍用補陰八珍湯補中益氣湯六味丸用四物湯黃蘗知母之類前證益甚肢體倦少食大便不實小便頻數謂余曰何也余曰此脾虛之證前

具瘡口開大予謂五臟氣血俱虛也朝用補中益氣夕用六君子加當歸各五十餘劑瘡口漸斂又用六味丸調補而愈

一男子醉而入房陰囊腫脹大如斗小腹脹悶小水淋赤發熱口乾痰涎壅甚此膀胱陰虛酒毒所乘也用六味丸料加車前牛膝作飲下滋腎丸諸證頓退再加五味子麥門冬二劑而愈却以補中益氣湯加麥門冬五味子調理而康若用淡滲復損真陰決致不起

知州王汝道先晡熱發熱肢體倦怠入房則腿足酸軟足心熱至腿膝六脈洪數兩尺爲甚余以足三陰虛欲滋補化源彼反服苦寒降火之劑後陰囊腫脹用治疝之藥腫脹益甚形氣愈虛復用溫補之劑腫痛上攻小便不利兩尺脈洪滑按之虛甚余曰此囊癰也因氣血虛而不能潰先用補中益氣湯加山茱萸車前子柴胡山梔一劑腫脹頓消隨用六味丸料加車前牛膝柴胡山梔一劑小便漸通乃用活命飲與前二藥消息兼用至二十餘劑囊裂出穢膿甚多乃用托裏消毒散六劑膿穢清又用托裏散數劑膿水漸少更用補陰托裏散及十全大補湯五十餘劑而痊

一人不慎房勞患便毒脹痛以雙解散二服通之其痛即止更以補中湯數劑而膿成針之以八珍湯加五味麥門冬柴胡三十餘劑而痊

通府張敬之患懸癰久不愈日晡熱甚作渴煩喘或用四物湯黃蘗知母之類前證益甚肢體倦少食大便不實小便頻數謂余曰何也余曰此脾虛之證前

藥復傷而然遂用補中益氣加茯苓半夏數劑飲食漸進前證漸愈更加麥冬五味調理乃痊經云脾屬太陰爲陰土而主生血故東垣先生云脾虛元氣下陷發熱煩渴肢體倦怠等證用補中益氣湯以升補陽氣而生陰血若誤認爲腎虛輒用四物黃藥知母之類反傷脾胃生氣是虛其虛矣况黃藥知母乃瀉陽益陰之劑若非膀胱陽火盛而不能生陰水以致發熱者不可用也

一男子年踰五十患懸癰膿清肝腎脈弱此不慎酒色濕熱壅滯也然膿清脈弱老年值此何以收斂况穀道前爲任脈發源之地肝經宗筋之所聚辭不可治後果死嘗治此癰惟潤水製甘草有效已破者兼以十全大補湯爲要法

一儒者患懸癰服坎離丸及四物黃藥知母之類不應脈浮洪按之微細余以爲足三陰虛用托裏散及補陰托裏散漸愈又用六味丸補中益氣湯調補化源半載而瘡大凡瘡瘍等證若腎經陽氣亢盛致陰水不能化生而患陰虛發熱者宜用坎離丸取其苦寒能瀉水中之火令陽氣衰而水自生若陽氣衰弱致陰水不能化生而患陰虛發熱者宜用六味丸取其酸溫能生火中之水使陽氣旺則陰自生況此證屬腎經精氣虧損而患者十有八九屬腎經陽氣亢盛而患者十無一二然江南之人患之多屬脾經陰血虧損元氣下陷須用補中益氣湯升補陽氣使陽生而陰長若嗜慾過多虧損真水者宜用六味丸補腎經元氣以生精血仍用補中益氣湯以培脾肺之生氣而滋腎水經云陰虛者脾虛也但多誤以爲腎

經火證用黃藥知母之類復傷脾肺絕其化源反致不起惜哉

上舍劉克新懸癰潰後作痛發熱口乾小便赤澀自恃知醫用清熱消毒之藥不應乃延予診左尺洪數余以爲陽氣盛而陰氣虛也先用四物湯加黃藥知母等諸劑瀉其陽氣使陰自生服數劑諸證漸愈後用補中益氣湯六味地黃丸補脾肺滋腎水而瘡口愈

一儒生懸癰小便赤澀勞則足軟腫痛發熱口乾舌燥食少體倦日晡益甚此氣血虛而未能潰也遂用八珍加麥門山藥倍用製甘草數劑諸證悉退但患處腫痛此膿內焮也又五劑膿自涌出又五十餘劑而瘡口將完又因勞役且停藥寒熱作渴腫痛膿多用補中益氣湯加炒山梔二劑少愈又以八珍湯加麥冬五味百餘劑腫痛悉去喜其慎起居節飲食常服補劑而安但勞則出膿一二滴後惑於他言內用降火外用追蝕必其收斂致患處大潰幾至不起仍補而愈

外科正宗曰一男子患懸癰十餘日焮腫作痛至晚發熱尤甚小水不利以龍膽瀉肝湯二服小水稍通微痛不止此欲作膿以托裏消毒散加穿山甲皂角刺澤瀉二服而膿出又與十全大補湯月餘而斂一男子患懸癰腫甚脹痛此內膿已成卽針之出臭膿碗許疼痛頓減以十全大補湯十餘服而飲食漸進焮痛亦消惟瘡口原潰之甚不易完全間用製甘草吞蠟礬丸外以附子餅灸之調理三月而愈

一男子拗內結腫四日作痒微痛以九龍丹一服利

五六次腫漸消又以四物加花粉黃藥知母而愈

一男子橫痃腫痛堅硬二便澀滯以九龍丹一服通利大便腫稍減間日又用一服二便通利而消

一男子患魚口十餘日形勢已成腫痛日甚因公事急出不能行走以火針法針之出紫血鍾許外用膏貼拔出微膿服托裏消毒散而便可行亦且速愈

一男子魚口潰而口大不斂此服瀉藥之過以十全大補湯加澤瀉丹皮十餘劑外搽玉紅膏月餘而斂一男子先出府瘡久之不愈後發橫痃十餘日始生腫痛予欲托裏瀉膿以瀉毒氣彼欲內消自服槐花酒蠅全蠍等藥腫未得消元氣已損轉致筋骨疼痛舉動艱辛仍復請治形體瘦弱脈虛而數此真元受傷邪氣從之雖當補養後必欲發時瘡方愈彼不爲信自仍服敗毒消風等藥元氣愈虛飲食不進筋骨疼甚徹夜不睡又復請治先用補中益氣湯倍參芪六服元氣稍醒又以八珍湯加麥門冬五味子遠志酸棗仁牡丹皮十餘服夜間方睡惟疼痛不能大減此內虛瘡毒下陷故難取效朝服六味丸午服十全大補湯又十餘服遍身方發紅點此瘡毒欲出仍服前藥紅點漸高始成瘡樣彼時瘡毒一出疼痛頓減元氣漸復更服八珍湯加蔞仁銀花土茯苓服至半年其瘡方得漸漸而痊彼悔執方治病之尤始信因病用方之妙

一男子風寒未經發散寒中腎囊作腫痛甚以萬靈丹一服洗浴發汗寒邪頓退又以四物湯加澤瀉蒼朮山梔天花粉敷如意金黃散數次而全消

一男子囊腫甚大不熱不疼按之軟而卽起此濕水

流注聚而不散以鉢針導去黃水椀許以導水消腎丸服月餘而腫消又以木香補腎丸服之不作

一男子患此十餘日腫甚脹痛內膿已成針之出膿椀許以十全大補湯加澤瀉丹皮十餘劑而斂

一老人素有疝氣因怒傷肝舉發疼痛自服蟠葱散熱藥腫痛益甚視之腎囊半邊堅硬皮損紫黑此欲腐爛見睾丸候也彼不爲信尚欲內消請別醫治之內服龍膽瀉肝湯外敷四黃散寒涼等藥堅硬果腐飲食少進虛熱不睡痛甚昏憒又復請治予曰凡病有本末治有權宜初以藥治疝非疝也凡疝爲患小腹作疼牽引腎子多寒少熱好飲熱湯此證乃惱怒傷肝陰虛濕熱爲患其囊紅腫發熱小便赤澀內熱口乾墜重作痛此爲囊癰之候初宜清利則愈而反用疝家熱藥已成宜用補陰托裏又用瀉肝涼劑此年老氣血有虧攻補機關已悞其疾豈有不致危亡者卽當養氣血固根本爲主而佐以安神定痛之藥接補元氣死生在進退之間尚可轉也隨以八珍湯加麥冬五味子遠志牡丹皮外以甘草湯淋洗腐上將已壞黑肉盡行剪落其睾丸已露數日後其患得於補力前證漸退飲食漸進外腐已盡腎子已突大半搽玉紅膏外以膏蓋長肌漸收調理半年外而始得安

一男子腫痛十餘日堅硬無膿囊頭腫上紫色作爛此欲外腐以蟾酥錠爲末摻上膏蓋三日腐肉脫下搽玉紅膏太乙膏掩之內服補陰滋腎藥而安一男子素有痰火久服降下之藥致腎囊下結腫疼痛脈細而數此陰虛濕熱流注而成潰後必難收斂

辭不治後果出臭膿不禁日漸開大發熱不止飲食不進強以溫中健脾補托氣血終至不應而歿

一男子慾後受寒致陰囊牽引小腹作痛惡寒發熱診之脈緊數而無力以五積散一服寒熱乃退痛亦稍止更以八珍湯加肉桂丹皮澤瀉數服而愈

一童子十五歲患下疳玉莖腫痛外皮浮腫比常粗大一倍他醫治之皆以解毒清肝等藥愈腫愈痛予視之亦用瀉水清熱滲濕等劑俱不見效診之脈細數而無力此中氣不足脾經濕水乘虛流注停聚不散當行從治之法也以四物湯合平胃散加木香熟附子人參各五分一服而腫痛頓退又四五服而全消

一男子下疳玉莖腫痛發寒熱以荆防敗毒散二劑而退又以龍膽瀉肝湯腫痛亦減用四物加黃藥知母而消

一男子年四十色慾過度小便澀痛出如白漿結凍成塊此腎傷濕熱爲患朝以八味丸午以八珍湯加山茱萸牡丹皮黃藥知母服之月餘而澀痛亦退小便漸清但寐中常有滑精不時滲出久至腰彎腳膝無力偶以三因勝駿丸服至月餘前證悉愈

一男子莖頭腐爛小木澀痛外以珍珠散內服木通湯四服澀痛亦止更服四物湯加黃藥花粉而痊

一男子初婚玉莖傷損出血疼甚先以葱湯浸洗良久隨用珍珠散加冰片摻之腐皮漸乾痛亦漸止內服四物湯加木通山梔四服其腫痛漸止而愈

一男子皮腫光亮發熱疼甚外敷如意金黃散內服龍膽瀉肝湯加大黃便痛稍愈去大黃又服而消

寓意草曰養翀王太翁先生精神內守百凡悉處謙退年登古稀面貌若童子蓋得於天全而不受人損也來從但苦脾氣不旺飲食厚自樽節邇年少腹有疝形如鵝卵數發以後其形漸大而長從少腹墜入睾囊甚易返位甚難下體稍受微寒卽發發時必俟塊中冷氣漸轉緩熱始得軟溜而縮入不然則鼓張於隘口不能入也近來其塊益大發時如臥酒瓶於膀胱半在少腹半在睾囊其勢堅緊如石其氣逆入前後腰脅各道筋中同時俱脹繇是上攻入胃大嘔大吐繇是上攻巔頂戰慄畏寒安危止關呼吸去冬偶見暴發光景知爲地氣上攻亟以大劑參附薑桂投之一劑而愈以後但遇舉發悉用桂附速效今五月未旬值昌他往其證連日爲累服十全大補湯二十餘劑其效甚遲然疑證重不疑藥輕也值年家俞老先生督餉浙中遙議此證亦謂十全大補用到百劑自效乃決意服至中秋其證復發時昌仍用薑桂參附取效令郎諫議卣翁老先生兩疑而莫所從也昌請深言其理焉夫人陽不足則用四君陰不足則用四物陰陽兩不足則合四君四物而加味爲十全大補此中正和平之道也若夫濁陰之氣結聚少腹而成有形則陰盛極矣安得以陰虛之法治之助邪而滋疾乎何以言之婦女有娠者之病傷寒不得已而用麻桂硝黃等傷胎之藥但加入四物則厲藥卽不能入胞而傷胎豈欲除塊中之邪反可用四物護之乎此一證也凡生癥瘕痞塊者馴至身羸血枯百計除之不減一用四物則其勢立增夫四物不能生血活血而徒以增患此又一徵也人身之血脉全賴

飲食爲充長四物之滯脾原非男子所貴旣已濁陰極盛時至橫引陰筋直冲陽絡則地氣之上陵者大有可慮何得以半陰半陽之藥蔓而圖之四物之不當用無疑矣卽四君亦元老之官不可以理繁治劇必加以薑桂附子之猛始克勝病何也陰邪爲害不發則已其發必暴試觀天氣下降則清明地氣上升則晦塞而人身大略可覩然人但見地氣之靜而未見地氣之動也方書但言陰氣之衰而未言陰氣之盛也醫者每遇直中陰經之病尚不知所措手况雜證乎請縱譚天地之道以明之天地之道元會運世一書論之精矣至於戌亥所以混茫之理則置之不講以爲其時天與地混而爲一無可講耳殊不知天不混於地而地則混於天也蓋地氣小動尚有山崩川沸陵遷谷變之應況於地氣大動其雷礮迅擊之威百千萬億遍震虛空橫冲逆撞以上加於天寧不至混天爲一耶必至子而天開地氣稍下而高覆之體始露也必至丑而地闢地氣始返於地而太空之體始廓也其時人物尚不能生者則以地氣自天而下未至淨盡其青黃紅紫赤白碧之九氣而外更有諸多悍疾之氣從空注下者動輒綿亘千百丈如木石之直墜如箭弩之橫流人物非不萌生其中但爲諸多暴氣所摧殘而不能長育耳必至寅而駁劣之氣悉返冲和然後人物得遂其生以漸趨於繁衍耳陰氣之慘酷暴烈一至於此千古無人論及何從知之耶大藏經中佛說世界成毀至詳而無此等論說者蓋已包括於地水火風之內不必更言也夫地水火風有一而非陰邪也哉羣陰之邪釀成劫運昌之

所謂地氣之混於天者非臆說矣堪輿家尚知趨天干之吉而避地支之凶奈何醫之爲道遇地氣上奔之證曾不思避其凶禍耶漢代張仲景特著卒病論十六卷祿山兵火以後遂湮沒不傳後人無繇獲見昌因悟明地氣混天之理凡見陰邪上冲孤陽擾亂之證陡進純陽之藥急驅陰氣呱呱有聲從大孔而出以關乾坤而揭日月功效亦旣彰彰如太翁之證屢用薑附奏績者母謂一時之權宜實乃萬世經常之法也但悍烈之性似非居恆所宜服卽舉發時服之未免有口乾舌苦之過其不敢輕用者孰不知之而知不得不服也卽如兵者毒天下之物而善用之則民從不善用之則民叛今討寇之師監而又監制而又制强悍之氣化爲軟戾不得不與寇爲和同於所過之地搶劫一空荆棘生而凶年兆盡驅良民而爲寇矣廟堂之上罷兵不能用兵無策大略類然昌請與醫藥之法互相籌酌夫堅塊遠在少腹漫無平期而毒藥從喉入胃從胃入腸始得下究舊病未除新病必起矣於此而用治法先以薑桂附子爲丸曝令堅乾然後以參木厚爲外廓俾喉胃間知有參术不知有薑桂附子遞送達於積塊之所猛烈始露庶幾堅者削而窠囊可盡空也今監督之旄充滿行間壯士金錢飽他人腹性命懸他人手其不能辨寇固也而其大病在以兵護監督不以監督護兵所以迄無成功耳誠令我兵四面與寇相當而令監督我兵可以賈勇而前或擊其首尾或搗其中堅或晝

息夜奮以亂其烏合而擴清之功自致矣况有監督以護之於外諸凡外入之兵不敢越伍而譁庶幾民不化爲寇而寇可返爲民耳山澤之癟何知當世然聊舉醫法之一端若有可通者因并及之或問曰外廓一說於理甚長何以古法不見用耶答曰古法用此者頗多如用硃砂爲衣者取義南方赤色入通於心可以護送諸藥而達於心也如用青黛爲衣者取義東方青色入通於肝可以護送諸藥而達於肝也至於攻治惡瘡之藥包入葱葉之中更嚼葱厚罨而吞入取其不傷喉膈而直達瘡所也卽煎劑亦有此法如用大劑附桂藥煎好再投生黃連二三分一滾卽取起俟冷服之則熟者內行下行而生者上行外行豈非外廓之意耶仲景治陰證傷寒用整兩附子煎熟而入生猪膽汁幾滴和之可見聖神用藥悉有法度也

景岳全書曰余嘗治一少年因偶觸穢毒遽患下疳始潰龜頭敷治不效隨從馬口延入尿管以漸而深直至肛門逐節腫痛形如魚骨每過夜則膿結馬口脹不得出潤而通之則先膿後尿敷洗皆不能及甚爲危懼余嘗遇一山叟傳得槐花蕊方因以治之不十日而莖根漸愈半月後卽自內達外退至馬口而全愈疳愈後卽見些微廣瘡復與五加皮飲十餘劑而全愈向彼傳方者曰此方善治淫瘡熱毒悉從小便洩去所以能治此疳但服此者可免終身瘡毒後患然猶有解毒奇驗則在瘡發之時但見通身忽有雲片紅斑數日而沒者卽皆瘡毒應發之處瘡毒已解而瘡形猶見是其驗也予初未之信及此人瘡毒已

之時瘡固不多而遍身紅斑果見凡兩日而發予始知瘡之有奇一至於此

余嘗治一強壯少年遭酷吏之恐病似脹非脹似熱非熱絕食而困衆謂痰火宜清中焦余診之曰此恐懼內傷少陽氣索而病及心腎大虧證也遂峻加溫補兼治心脾一月而起愈後形氣雖健如初而陽寂不舉余告之曰根蒂若斯腎傷已甚非少壯所宜之兆速宜培養心腎庶免他虞彼反以恐嚇爲疑全不知信未及半載竟復病而歿可見恐懼之害匪小也



註氣血不行故也

癰疽篇

癰疽發於尻名曰銳疽其狀赤堅大急治之不治三十日死矣

尻乃足太陽之部分太陽之上寒水主之故亦應月而死夫腎爲陰而主骨故癰膿搏骨而不外發膿爲陽而太陽之氣主於膚表故其狀赤堅而大夫陽毒起發於外而亦致死者太陽爲諸陽主氣也

扁鵲難經

肛門考

肛門重十二兩大八寸徑二寸大半長二尺八寸受穀九升三合八分合之一

唐孫思邈千金方

通閉辨

肛門者主大行道肺大腸候也號爲通事令史重十二兩長一尺二寸廣二寸三分應十二時若臟傷熱則肛門閉塞大行不通或腫縮入生瘡若腑傷寒則肛門開大行洞瀉肛門凸出良久乃入熱則通之寒則補之

肛門主肺肺熱應肛門熱則閉塞大行不通腫生瘡兌通方白蜜三升煎令燥冷水中調可得爲丸長六七寸內肛門中倒身向上頭向下少時取烊斯須卽通洞泄

肛匱論

凡得傷寒及天行熱病腹中有熱又人食少腸胃空虛三蟲行作求食蝕人五臟及下部若齒斷無色舌

上盡白甚者脣裏有瘡四肢沉重忽忽善眠當數看此蟲在上蝕其下部人不能知可服此蝕蟲藥不爾蠶蟲殺人又曰凡患濕蠶者多是熱病後或久下不止或有客熱結在腹中或易水土溫涼氣著多生此病亦有乾蠶不甚泄痢而下部瘡癰不問乾濕久則殺人凡濕得冷而若痢單養黃連及艾葉苦參之屬皆可用之若病人齒斷無色舌上白者或喜眠煩憤不知痛癢處或下痢急治下部不曉此者但攻其上不以下部爲意下部生蟲蟲蝕其肛門爛見五臟便死燒艾於竹筒熏之

五痔論

夫五痔者一曰牡痔二曰牝痔三曰脈痔四曰腸痔五曰血痔牡痔者肛邊如鼠乳時時潰膿血出牝痔者肛腫痛生瘡脈痔者肛邊有瘡癰痛腸痔者肛邊核痛發寒熱血痔者大便清血隨大便污衣又五痔有氣痔寒溫勞濕卽發蛇蛻皮主之牡痔生肉如鼠乳在孔中頗出見外妨於更衣鼈甲主之牝痔集驗作酒從孔中起外腫五六日自潰出膿血蠅皮主之腸痔更衣則挺出久乃縮入母猪左足懸蹄甲主之脈痔更衣出清血蜂房主之五藥皆下篩等分隨其病倍其主藥爲三分旦以井華水服方寸匕病甚者日暮服之亦可四五服禁寒冷食猪肉生魚菜房室惟得食乾白肉病瘥之後百日乃通房內又用藥導下部有瘡內藥瘡中無瘡內孔中又用野葛燒末刀圭

內藥中服藥五日知二十日差三十日愈痔痛通忌

宋寶漢卿瘡瘍全書

痔分二十五

凡痔有五卽牡痔牝痔腸痔脈痔血痔素問曰因而飽食筋脈橫解腸澼爲痔臟腑所發多由飲食不節醉飽無時恣食肥膩胡椒辛 辣炙燙釀酒禽獸異物任情醉飽耽色不避嚴寒酷暑或久坐濕地恣意耽看久忍大便遂致陰陽不和關格壅塞風熱下衝乃生五痔天道失常民心益肆今痔變成五五二十五類或左或右或內或外或狀如鼠奶形如櫻桃或膿或血或痛或痒或腫或譽久而不治漸成漏矣大法以涼血爲主徐徐取效切不可用砒霜毒藥亦不可輕易割取致成漏瘡又有肛門左右別有一竅出膿血名曰單漏治之須以溫緩之劑補其內生肌之藥敷其外其竅在皮膚者易愈臟腑有損而致竅者未易治也

蓮子痔狀如蓮子也通腸痔其根生於臟內出糞卽下也氣痔感氣卽下也漏痔氣血衰敗久勞淹臥不曾洗淨而然也勾腸痔其形繞腸頭也蓮花痔形如蓮花也雞心痔形如雞心也垂珠痔其形垂下如珠也貫鍊痔穿而貫膿血也栗子痔形如栗子也稜角痔形如稜角也盤腸痔盤附腸內而生也子母痔一大一小也翻花痔形如翻花登廁卽出也鼠奶痔形如鼠奶也雙頭痔有兩頭也迫腸痔緊迫肛門者也血攻痔出血之痔也夫妻痔一圓一長卽雌雄也珊瑚痔形如珊瑚也脫肛痔肛門下脫也擔腸痔橫於肛門者也三迷痔有三珠財迷酒迷色迷實爲病起

之因故名之櫻桃痔形如櫻桃也雌雄痔乃酒色食  
毒不慎致中間一黑色一白色也以上諸痔名類不

同其種則一何也皆由大腸傳道以成風熱深而腎

虛爲冷氣相攻飽食猪雞魚膾燒酒醕酒生酒辛 辣

等味或登廁臟虛爲風邪所襲六氣七情所感人生  
素不能飲酒亦患痔者臟虛故也亦有父子相傳者  
母血父精而成腸風者痔之漸也速服涼血補劑  
少勞戒怒遠色忌口斯能愈矣

### 脫肛

肺與大腸相爲表裏故肺臟蘊熱則肛閉結肺臟虛

寒則肛脫由此至當之論又有婦人產育過多力盡  
血枯氣虛下陷及小兒久痢皆能使肛門突出治之

惟溫補肺臟滋榮腸胃久則能自收矣  
血虛脫肛以四物湯爲主氣虛脫肛以參芪歸朮爲  
主血熱以涼血爲主四物湯加黃藥

### 穿蘋發

此毒因辛苦得之生於窮骨穴上若不速治毒潰傷  
於穀道內爛臟腑卽死急服蠲毒飲

### 坐馬癰

聚成毒發爲漏瘡此乃毒證先用宣毒湯次用敗毒  
流氣飲後用內托追毒飲

### 臟毒

臟毒者生於大腸盡處肛門是也其勢兇惡皆喜怒  
不測飲食不節陰陽不調臟腑不和或房勞太過或  
飲釀戾之酒或食五辛炙燉等味蓄毒在內流積爲  
癰肛門腫痛大便堅硬則脹痛其旁生小者如貫珠

大者如李核煎寒作熱疼痛難安勢盛腫脹翻凸虛  
浮早治易愈失治潰爛陷孔內寸許者難生膿血  
出而腫消痛減者易生也

### 臀癰

此癰受在腎經而臀屬少陽膀胱乃陰中之陰其道  
遠位僻藥力所難及者須預補之皆因受虛寒濕毒  
結聚生風故生此證也當用上下助癰藥治之如敗  
毒流氣飲內托流氣飲內托羌活湯是也

金匱完素六書

### 痔論

夫腸風痔病者所發手太陰手陽明經以應動脈謂  
肺與大腸爲表裏爲傳道以行糟粕腸風痔病有五  
種其證亦異蓋因陽氣虛而元府疎風邪乘而熱自  
生風濕邪熱攻於腸中致使大便澀而燥熱鬱血熱  
散而流溢衝浸溼腸裏故以先血後便爲熱在下先  
便後血爲熱在上久而不愈乃作痔

素問云因而飽食筋脈橫解房室勞傷腸澼爲痔蓋  
以風熱不散穀氣流溢傳於下部故令肛門腫滿結  
如梅李核甚者乃變成而爲瘻也五臟切宜保養勿  
令受邪

手陽明大腸名曰害蟲六元正紀論陽明曰司殺府  
大腸名害蟲謂金能害五蟲又曰司殺府謂金主殺  
既有此二名何以自生蟲蓋謂三焦相火盛而能制  
陽明金故木來相侮經曰侮謂勝己也木主生五蟲  
叔和云積氣生於脾臟旁大腸疼痛陣難當只宜稍  
瀉三焦熱莫謾多方立紀綱此言飲酒多食熟物脾  
生大熱而助三焦氣盛火能生土也當瀉三焦火熱

退使金得氣而反制木木受制則五蟲不生病自愈  
矣

元張從政儒門事親

### 脫肛

大腸熱甚也用酸漿水煎三五沸稍熱渫洗三五度  
次以苦劑堅之則愈

### 廣腸痛

治法同上又大黃牽牛丸散奪之燥澀亦同痔漏廣  
腸痛腸風下血皆同臟毒治法

### 痔漏腫痛

乳痔腸風必肛門左右有核屬大腸經可服枳殼之  
屬大癖生腸風乳痔相連

凡痔漏腫痛內經曰因而飽食筋脈橫解腸澼爲痔  
不愈變爲漏痔與漏其治同法至真要大論云太陽  
之勝凝滯且至非時水冰痔瘻注云水氣太勝陽火  
不行此言陽火畏水鬱而爲痔又少陰之復痈瘻瘍  
癰瘻疽座痔注云火氣內蒸金氣外拒陽熱內鬱故  
爲痈瘻瘻瘍甚亦爲瘻也熱少則外生痈瘻瘍多

則內結癰瘻座小腸有熱則中外爲痔其熱復之變皆  
病於身後及外側也又靈樞云太陽經虛則爲痔瘻  
癰瘻瘻瘍蓋水虛則爲火所乘故也可先用導水丸禹功  
散瀉訖次服枳殼丸木香檳榔丸更以葵波菜通利  
腸胃大忌房室雞魚酒酢辛熱之物

李杲十書

### 痔瘻論

內經曰因而飽食筋脈橫解腸澼爲痔夫大腸庚也  
主津本性燥清肅殺之氣本位主收其所司行津液

以從足陽明之化若旺則化生萬物者也足陽明爲中州之土若陽明衰亦能殞殺萬物故曰萬物生於土而歸於土者是也然以手足之陽明同司其化焉既在西方本位爲之害蜚司殺之府因飽食行房忍泄前陰之氣歸於大腸以致木乘火勢而侮燥金以火就燥也則大便必閉而痔漏作矣其疾甚者當以苦寒瀉火以辛溫和血潤燥疏風止痛是其治也以秦艽當歸梢和血潤燥以桃仁潤血以皂角仁除風燥以地榆破血止血以枳實之苦寒補腎以下泄胃實以澤瀉之淡滲使氣歸於前陰以補清燥使不受胃之濕邪也白朮之苦甘以苦補燥氣之不足其甘味以瀉火而益元氣也故曰甘寒泄火乃假枳實之寒也古人用藥爲下焦如瀆又曰在下者引而竭之多爲大便祕澀以大黃推去之其津血益不足以當歸和血及油潤之劑大便自然更利矣宜作剉湯以與之是下焦有熱以急治之之法也以地榆酸苦而壞胃故宿食消盡空心作丸服之曰秦艽白朮丸

有白朮秦艽蒼朮湯加白葵花頭五朵去萼心青皮半錢不去白入正藥中同煎木香三分爲細末同檳榔等三味依前煎服餌古人治此疾多以歲月除之此藥一服卽愈

夫痔瘻之候其名有五一曰牝痔二曰牡痔三曰氣痔四曰血痔五曰酒痔又曰腸風痔脈痔雌雄痔皆五痔之別名也其狀初生悉在肛邊或如鼠乳或結小核痒痛注悶甚者身熱惡寒諸方論之皆由房酒滲漏衝注下部肛邊生瘻變爲痔疾治法始覺痔作過度久嗜甘肥不慎醉飽以合陰陽勞擾血脈腸澼

便服通氣丸槐角丸熱實者服諸利湯疏利臟腑及浴洗熏熨以取消散切忌酒麪辛熱房室肥膩稍縱嗜欲腐潰膿血或逗留淫汗歲月已深旁穿竅穴卽變痔漏卽須用寸金錠子三五次痊愈若能味無味之味正味足矣事無事之事百事備矣其次服餌調節謹慎合宜未有不差者也

朱震亨心法

### 脫肛

脫肛屬氣熱氣虛血熱血虛

氣虛者補氣參芪芎歸升麻

血虛者涼血四物湯加炒蘡

氣熱者涼血四物湯加炒蘡

末托而上之一次未收至五七次待收乃止又東北方壁土泡湯先熏後洗

肺與大腸爲表裏故肺臟蘊熱則肛門閉結肺臟虛寒則肛門脫出又有婦人產育用力小兒久痢皆致此治之必須溫肺臟補腸胃久則自然收矣

痔瘻專以涼血爲主

痔者皆因臟腑本虛外傷風濕內蘊熱毒醉飽交接多慾自戕以致氣血下墜結聚肛門宿滯不散而衝突爲痔也

其肛邊發露肉珠狀如鼠乳時時滴瀉膿血曰牡痔

肛邊生瘻痛突出一枚數日膿潰卽散曰牝痔

腸口大顆發癟且痛且痒出血淋漓曰脈痔

腸內結核有血寒熱往來登潤脫肛曰腸痔

若血痔則每遇大便清血隨下不止  
若酒痔則每遇飲酒發動瘻腫痛而流血  
若氣痔則憂愁鬱怒適臨乎前立見腫痛大便艱難  
強力則肛出而不收矣此諸痔之外證也  
治法總要大抵以解熱調血順氣先之蓋熱則血傷  
血傷則經滯經滯則氣不運行氣與血俱滯乘虛而  
墜入大腸此其所以爲痔也諸痔久不愈必至穿穴  
爲漏矣

痔頭向上是大腸熱甚收縮而上用四物湯解毒加  
枳殼白朮槐角秦艽

漏瘻先須服補藥以生氣血用參木芪芎歸爲主大  
劑服之外以附子末津唾和作餅子如錢厚以艾灸  
之漏大炷大漏小炷小但灸令微熱不可使痛乾則  
易之則再研如末作餅再灸如困則止來日再灸直  
至肉平爲度亦有用附片灸仍用前補劑作膏貼之  
尤妙

灑瘻用赤石脂白石脂枯礬黃丹腦子  
漏竅外塞用童子小便煅爐甘石牡蠣粉  
用五倍子砂硝桑寄生蓮房煎湯先熏後洗腫者用  
木鼈子五倍子研細末調傅

漏專以涼藥爲主

漏者諸瘻之潰漏也狼瘻鼠瘻蠅瘻蛇瘻蜂瘻蚍蜉  
瘻蜻蜓瘻浮蛆瘻轉筋瘻古所謂九瘻是也析而言

之三十六種其名目又不同焉大抵外傷四氣內瘡

七情與夫飲食乖常染觸蠢動含靈之毒未有不變

爲瘻瘍穿孔一深膿汁不盡得冷而風邪併之於是

涓涓而成漏矣然有近年漏者有久年漏者近則帶

淡紅或微腫或有小核久則上而槁白內而黑爛淫

蟲惡臭生焉

格致餘論

臂癰

或曰太陽經非多血少氣者乎何臂癰之生初無甚

苦往往間有不救者吾子其能治之乎予曰臂居小

腹之後而又在其下此陰中之陰也其道遠其位僻

雖曰多血氣運不到氣既不到血亦罕來中年之後

不可生癰纔有痛腫參之脈證但見虛弱便與滋補

血氣無虧可保終吉若用尋常驅熱拔毒舒氣之藥

虛虛之禍如指諸掌

羅天益衛生寶鑑

痔漏

腸風痔漏總辭也分之則異若破者謂之痔漏大便

祕澀必作大痛此由風熱乘胃食飽不通氣逼大腸

而作也故經曰因而飽食筋脈橫解腸澼爲痔也受

病者燥氣也爲病者胃熱也胃刑大腸則化燥火以

乘燥熱之實也風附熱而來是濕熱風燥四氣相合

故大腸頭成塊者濕也作大痛者風也大便燥結者

主病兼受火邪熱也當去此四者其西方肺主諸氣

其體收下亦助病爲邪須當以破氣藥兼之治法全

矣不可作丸以剉子與之效如神速秦艽蒼朮湯主之

## 明戴思恭證治要訣

### 脫肛

脫肛一證最難爲藥熱則肛門閉塞則肛門脫內用

磁石末每二錢食前米飲調下外用鐵銹磨湯溫洗

痔漏腸風下血辨

腸風之血出於腸臟間五痔之血出於糞門濁孔處

治各不同無擇翁烏連湯治脈痔外無形而所下血

一線如箭或點滴而已此由脈竅中來也

痔漏宜兼內外治

痔漏證狀頗多旣血自內出不可全仗外傳宜只蒞

散吞鈞腸丸痔正發而血多者亦宜自裏托之宜千

金內補散減桂之半加龍頭血尤妙

大腸頭出寸餘痛苦直候乾自退落落去又出名截  
腸病若腸盡出不治但初截寸餘可治用芝麻油器  
盛之以臂坐之飲大麻子汁數升卽愈

肛門蟲出

肛門蟲出不斷斷之復生行坐不得用鶴蠶末五錢

水調服之自愈

肛門別名

肛門者大腸之下截也一曰廣腸言其廣闊於大小

腸也又曰魄門言大腸爲肺之腑肺藏魄故曰魄門

也肛者言其處似車缸形也

李梴醫學入門

脫肛諸因

難經曰病之虛實入者爲實出者爲虛肛門脫出非

虛而何勞倦房慾過度及產育用力久痢久瀉小兒  
叫呼耗氣俱有此證宜參芪歸升麻木煎服血虛過

加芍藥地黃虛寒加炒黑乾薑虛挾熱者縮砂散

脫肛間有熱者熱則流通意也氣熱者用條芩六兩

升麻一兩麪糊丸服血熱者四物湯加黃芩升麻風

邪者敗毒散暑熱者黃連阿膠丸薄荷煎

肺與大腸爲表裏肺熱則肛門閉結肺寒則肛門脫

出必須溫肺臟補腸胃宜補中益氣湯加阿膠皮

少許或升陽舉經湯蠅皮散鈞腸丸挾濕熱者升陽

除濕湯有兼病者四物湯加槐花黃連升麻有腎虛

者腎氣丸八味丸

初起未成膿者隔蒜灸再用葱熨法欲作膿者內托

羌活湯痛甚者活命飲腫硬痛者托裏消毒散微腫

痛者托裏散脾虛不能消散或食少不作膿者六君子

湯加歸芎黃芪偏右臂腿者尤宜腎虛不能消散

或作渴湯淋者腎氣丸有脾虛誤服消導藥以致氣

陷下腫痛甚者補中益氣湯或十全大補湯潰後尤

宜進此二藥以固其裏兼節酒色戒躁暴乃可萬全

臀蛆瘡

臀蛆瘡疼痒者摩風膏只痒甚有蟲者用硫黃一兩

人言一錢爲末用酢調勻慢火熬乾復熬化如火起

將酢洒數次傾地下待冷成餅用麻油磨濃候瘡痒

抓破擦上三日卽愈

五痔

經曰因而飽食筋脈橫解腸澼爲痔蓋飽食則脾不

能運食積停聚大腸脾土一虛肺金失養則肝木寡

畏風邪乘虛下流輕則腸風下血重則變爲痔漏或  
醉飽入房精氣脫泄熱毒乘虛下注或淫極入房過

甚傷筋忍精停毒甚則以男交男致傷膀胱與腎肝筋脈蓋膀胱筋脈抵腰絡腎貫臀走肝環前後二陰

故痔乃筋脈病發則面青痛甚肝苦急也

五痔牡痔肛邊如鼠乳牝痔肛邊一枚生瘡陷入腸痔結核腸內脫肛出血痔大便清血隨下如線脈痔腸口頻頻發漏出血且痛且痒五痔散主之又有

氣痔肛門腫痛難便強力則肛不收加味香蘇散酒

痔飲酒則發乾葛湯蟲痔浸淫濕爛歲積月累蝕腸

穿穴蠅皮丸黑玉丹凡毒深者大如雞冠蓮花核桃

毒淺者小如松子牛乳鷄心鼠乳桃仁皆三陰虛也

痔非外邪乃臟內濕熱風燥四氣相合蘊久流入大腸而成毒有腸頭腫塊者濕也肛腫後墜濕兼熱也

出膿血水者熱勝血也痛極者火熱也痛痒者風熱

也大便祕者燥熱也小便澀者肝火濕熱也又瘡頭向上或硬者熱多向下或軟者濕多

熱則傷血血滯則氣亦不運而大腸下墜作痛大要以槐花槐角生地涼血芎歸桃仁和血生血枳殼行

氣寬腸芩連山梔清熱黃檗防己澤瀉行濕麻仁大黃潤燥秦艽荆芥疏風風邪陷下久者防風升麻提

之氣弱者人參黃芪補之氣不順木香檳榔和之古方熱痔黃連阿膠丸槐角丸槐膽丹濕熱加味連殼

丸或四物湯合敗毒散風濕秦艽湯燥痔四順清涼飲下血者芎歸丸苦參丸痛者止痛丸痒者黑玉丹

腫硬者豚蠅丸刀割線剔損藏傷命藥點藥敷閉毒變漏初起只宜隔蒜灸已成者防風荆芥槐花木鼈砂硝煎湯熏洗滑脫加文蛤蓮蓬洗後用古熊冰膏蜈蚣油塗之內

### 痔宜內生肌丸忌擦藥

體實屬肺與大腸風熱者加味槐角丸加味地黃丸三神丸斷根更易體薄屬肝脾腎三經陰精損者腎

謹起居方可斷根又有兼下疳瘡者有莖中出自白津者有兼瘡者皆肝腎不足變出勿專服寒涼瀉火

痔漏及五痔皆因酒色過度即成此疾人多以外治

敷洗不知病在腸中有蟲若不去恨其病不除

痔則有穿腸穿臂穿陰者又有無痔肛門左右別生一竅流出膿血名爲單漏竅在皮膚者易愈臟腑損者難治又有原有痔漏肛邊別生一塊作膿就在痔孔出者乃食積注下也宜連魏散

痔止出血始終是熱漏流膿血初是濕熱久是濕寒

初起淡紅微腫小核宜涼血清熱燥濕牽牛酒加味槐角丸臘頭丸古枳巴丸連歸丸久則內如槁白外如黑腐淫蟲惡臭宜灑敷殺蟲溫補黑玉丹釣腸丸芎歸丸苦參丸臘礬丸又有初起因風冷者久則虛而挾濕熱者

薛己醫按

### 脫肛

脫肛屬大腸氣血虛而兼濕熱有久痢氣血俱虛而脫者有因肺虛而脫者有因中氣虛而脫者有因腎虛而脫者濕熱者升陽除濕湯血熱者四物加條芩

槐花血虛者四物加白朮茯苓兼痔而痛者四物加槐花黃連升麻久痢者補中益氣湯加酒炒芍藥中氣虛陷者前湯加半夏炮薑茯苓五味腎虛者六味丸虛寒者八味丸肺與大腸爲表裏肛者大腸之門

肺實熱則祕結肺虛寒則脫出腎主大便故腎虛者多患此證

### 痔漏

大便祕澀或作痛者潤燥除濕

肛門下墜或作痛者瀉火導濕

下墜腫痛或作癢者祛風勝濕

腫痛小便澀滯者清肝導濕

痔者貧富男女皆有之富者酒色財氣貧者擔輕負重飢露早行皆傷心肝二血喜則傷心怒則傷肝喜怒無常氣血侵於大腸到穀道無出路結積成塊出血生乳各有形相婦人因經後傷冷月事傷風餘血在心經血流於大腸小兒因利後或母腹中受熱也水澄膏

痔屬肝脾腎三經故陰精虧損難治多成漏證若肺與大腸二經風熱濕熱者熱退自愈不守禁忌者亦成漏證此因醉飽入房筋脈橫解精氣脫泄熱毒乘虛流注或淫極強固其精以致木乘火勢而侮金或炙燭厚味或勞傷元氣陰虛火熾所致初起焮痛便秘或小便不利者宜清熱涼血潤燥疏風若氣血虛而寒涼傷損者調養脾胃滋補陰精若破而久不愈多成痔漏有穿脣穿陰穿腸者其腸頭腫塊者濕熱也作痛者風熱也便結者火燥也瀆膿者熱勝血也大便作痛者潤燥除濕肛門墜痛者瀉火除濕小便澀滯者清肝導濕其成漏者養元氣補陰精爲主經云因而飽食筋脈橫解腸澼爲痔其屬肝脾腎也明矣若有患痔而兼瘡患瘡而兼下疳皆屬肝脾腎不足之變證但用地黃丸益氣湯以滋化源爲善若專服

寒涼治火者無不致禍

臂癰

焫痛尺脈緊而無力者托之

腫硬痛甚者隔蒜灸之更以解毒爲要

不作膿而痛者解毒爲主

不作膿者托裏爲主

不潰或潰而不斂者托裏爲主

臂膀胱經部分也居小腹之後此陰中之陰其道遠

其位僻雖太陽多血氣運難及血亦罕到中年後尤

慮此患治者毋傷脾胃毋損氣血但當固根本爲主

若腫硬作痛者形氣虛而邪氣實也用托裏消毒散  
主之微腫微痛者形氣病氣俱虛也用托裏散補之  
欲作膿用托裏羌活湯若痛甚用仙方活命飲大勢  
既退亦用托裏消毒散若脾虛不能消散或不潰不  
斂者六君加芎歸黃芪若陰虛不能消散或作渴便  
淋者六味丸加五味子若陽虛不能潰或膿清不能  
斂者用補中益氣湯氣血俱虛者十全大補湯若腫  
硬未成膿者用隔蒜灸活命飲潰後豆豉餅補中益  
氣十全大補二湯若灸後大勢已退餘毒未消頻用  
葱熨以補其氣以消餘毒爲善

虞搏醫學正傳

痔漏

經曰因而飽食筋脈橫解腸澼爲痔又曰脾胃者倉  
廩之官五味出焉大腸者傳導之官變化出焉若夫  
飽食太過則脾氣倦甚不能運化精微朝傷暮損清  
濁混淆故食積下流於大腸之間而爲病也蓋脾胃  
一虛肺氣亦乏而大腸之氣亦從而虛其肝木得以

乘虛下流而爲腸風病是皆金失所養木寡於畏之所爲耳其爲變見名狀種種不同曰牛奶曰鼠奶曰鷄心曰鷄冠曰蓮花曰翻花曰蜂窠曰穿腸曰外痔雖爲狀不一而其因則同焉治法以苦寒瀉火芩連梔子槐花之類以辛溫和血當歸川芎桃仁之類風邪在下以秦艽防風升麻之類提之燥熱佛欝以大黃枳殼麻仁之類調之遇此疾者自宜慎口節欲依法調治無有不安者也

黃枳殼麻仁之類調之遇此疾者自宜慎口節欲依法調治無有不安者也

方賢奇效良方

腸澼痔漏論

經曰風客淫氣精乃亡邪傷肝也因而飽食筋脈橫解腸澼爲痔蓋緣風氣通於肝肝生風風生熱風客則淫氣傷精精亡則邪熱傷肝因飽食行房則筋脈橫解而腸澼痔漏生焉夫痔者巢氏病源論有五曰牡痔牝痔脈痔腸痔血痔也及古諸方又有酒痔氣痔蟲痔翻花蠟蛇等痔之名不一旦痔於肛門生瘻或在外或在內有似鼠乳者有似櫻桃者其形不然其病有痛有癢有硬有軟有膿潰者有不潰者有腫痛便難者有隨大便下清血不止者有穿竅血出如線者至有失治而成漏者成漏而穿脣者及有穿腸成孔糞從孔中出者或肛門四圍生瘻數枚膿血浸淫若蓮花者詳此諸證大凡肛邊生鼠乳時出膿血者爲牡痔肛邊生瘻腫痛出血者爲牝痔肛邊生瘻且疼且癢者爲脈痔肛內結核寒熱出血者爲腸痔肛門腫痛大便難強力則肛出不收者爲氣痔肛門瘻腫流血飲酒卽發者爲酒痔肛邊有竅血出如射線者爲血痔肛門浸淫濕爛內有蟻蟲蝕腸穿穴遂

成漏者爲蟲痔也然此諸證皆本之於大腸也大腸者庚金也本性燥清肅殺之氣本位主收所司主行津液以從足陽明中州土之所化若旺則能生化萬物而衰則損傷萬物故云萬物生於土而歸於土此之謂也然手足之陽明同司其化焉若人醉飽行房精氣脫泄其脈空虛酒熱之毒流著於脈或因醉飽淫極而強忍其精或用藥固其精弗能泄越停積於脈歸注大腸以致木乘火勢而侮燥金以火就燥則大便閉而痔漏作矣治宜苦寒瀉火辛溫和血潤燥疏風止痛之劑也靈樞經云足太陽膀胱之脈及筋皆抵腰中入絡督其支者貫臀足故主筋爲病則生此疾由是推之足厥陰之脈環繞前後二陰故亦能爲痔矣每見人患痔其發則色青痛甚蓋謂肝苦急而然也且夫痔與漏初致之由雖同所患之病實異初生肛邊成瘻不破者曰痔破潰而出膿血黃水浸淫淋瀝久不止者曰漏也原此受病者燥氣也爲病者濕熱也胃刑大腸則化燥火以乘濕熱之實也若夫腸頭成塊者濕也作痛者風也膿血潰出者熱勝血腐也潰成黃水者濕熱風燥也大便閉作大痛者風熱鬱滯弗能通泄氣逼大腸而作也大腸結燥者主病兼受火邪也凡此疾者皆由濕熱風燥四氣相合而致也而腸澼者爲大便下血也蓋因人之不避風毒恣飲醇酒炙燭之物縱慾喜怒無常臟腑鬱抑飲食自倍腸胃乃傷陰陽不和關格壅滯熱毒下注血滲大腸其腸澼痔漏不可得而無矣經云筋脈橫解腸澼爲痔者此也至於臟毒腸風痔漏而名雖殊其源實一大抵腸澼之病有可治可不治者若便血

身寒則可治腸澼下白沫脈沉者生脈浮者死如下  
膿血脈滑大者生脈懸絕則死腸澼脾脈外鼓沉久  
自己而肝脈小緩則易治腎脈搏沉身熱則死也醫  
療之法惟宜祛風消毒解熱涼臟和血潤燥以施治  
無不瘥矣

### 脫肛論

脫肛之證難經云病之虛實出者爲虛入者爲實肛  
門之脫非虛而何哉蓋實則溫溫則內氣充而有所  
蓄虛則寒寒則內氣餒而不能收况大腸有厚薄與  
肺爲表裏肺臟蘊熱則閉虛則脫三因之論且婦人

有此疾者產育用力過多小兒此疾皆因久利大腸

虛冷所爲也肛門爲大腸之候大腸傷於塞滯而用

力努則其氣下衝肛門脫出也用香附子荆芥等分

煎湯洗之或以五倍子研爲細末放於紙上托其肛

緩緩挿入若或長久男子變成腸風痔漏腸出不收

至於出數寸者以五倍子砂硝等分煎湯洗之亦用

木賊燒灰不令烟盡入麝香少許大便了貼少許效

又有久痢臟虛皆能令人肛門突出有腸頭作痒卽

腹中有蟲丈夫由酒色過度大腸者傳道之官腎者

作強之官蓋腎虛而浊母氣因肺虛是以大腸氣無

所主故自肛脫治法實原氣去蘊熱之劑外用煎藥

洗之醫治無不愈矣

龔信古今醫鑑

### 二十四證痔歌

痔證分三種憑君仔細看莫教年月久見者膽心寒  
菱角看形怪蓮花不可觀穿腸名鼠奶酒色兩相干  
莫怨翻花惡蜂窠亦不寬雌雄同氣血子母及腸盤

元珠尤可怪腸釣痛如鑽核桃與流血見者便心酸  
栗子於中大鷄心在外安珊瑚形可惡那更脫肛難  
內痔紅不出搭腸裏內盤垂珠更難治日久有鷄冠  
切莫輕刀火令君性命殘用功無半月去病更除根  
按治痔之法不過涼血清熱而已至於治漏初宜涼  
血燥濕久則澀竅殺蟲而兼溫散也或曰痔漏屬火  
何故用溫濕之藥殊不知痔止出血始終是熱漏流  
膿水始是濕熱終是濕寒十漏大金丹方雖溫散又  
兼補養故丹溪云漏當大補氣血爲主有所自矣

### 樓英醫學綱目

#### 痔漏

運氣痔發皆屬寒經云太陽之勝痔瘡發治以苦熱

是也

凡痔用周先生枯藥早晚上一次日午一次洗去舊

藥申時又洗去又上一次如要急安至夜半子時又

洗上一次至次日且看痔頭淡淡黑色兩三日如烏

梅四五日內用竹篦子輕輕敲打痔頭見如石堅至

七八日便住更不須上枯藥且待自然如蘿蔔根乃

脫去也然後用甘草荆芥槐花煎湯洗去舊藥方上

新藥

凡醫痔之法且如明日要下手今日先與此藥所以

寬大腸使大便軟滑不與痔相礙則不泄瀉痔頭未

脫落者須要日日與之以大黃一兩煨枳殼炒當歸

酒洗一兩同爲細末如桐子大好酒吞下

催痔方如枯盡未脫落以此催之好磁石一錢白僵  
蠶生川烏五分同爲細末冷水調傅上立脫  
凡用枯藥去盡乳頭恐留痔硬頭損破肛門四圍成  
瘡用龍骨石膏各一錢沒藥膩粉各五分同研極細  
先以荆芥湯洗次摻之切忌毒物生薑痔脫後用甘  
草湯豆豉湯洗再用荆芥五倍子煎水洗便不生膿  
痔脫後肉痒用大粉草濃煎湯洗之

收腸方用枯藥脫下乳頭隨卽與此以收其腸此方  
補氣又收膿去血生肉令痕完

治痔切勿用生砒毒氣入腹反至奄忽吃生冷硬  
物冷菜之類及酒濕麪五棘辛熱大料物及乾薑之  
類犯之無效此東垣格言也

腸澼爲痔如大澤中有小山突出爲痔人於九竅中

凡有小肉突出皆曰痔不獨於肛門邊生也有鼻痔

眼痔牙痔等其狀不一方書分出五種曰牡曰牝曰

脈曰腸曰氣牝痔者肛邊生瘡腫突出一日數腫膿

潰即散牡痔者肛邊發露肉珠狀如鼠奶時時滴漬

膿血脈痔者腸口顆顆發癟且痛且痒出血淋漓腸

痔者腸內結核有血寒熱往來登溷脫肛氣痔者遇

怒則發肛門腫痛氣散則愈又有酒痔每遇飲酒發

動腫痛流血血痔則每遇大便清血隨下不止宜解

熱調血順氣爲主若久不愈必至穿穴爲漏矣

徐春甫古今醫統

痔漏

春甫每用痔漏治法無出濕熱之方病機誠如東垣  
丹溪之論大抵輕淺者瀉水流濕潤燥疏風悉可以  
愈至於成漏穿腸串臂中有鷄管年久深遠者必是

永類鈐方掛線治法庶可除根予郡程復齋深得此法之妙誠所謂拔本塞源治無不愈茲併求其方法之詳附錄以公天下庶患斯疾者之有救也

復齋治痔法

生氣通天論云因而飽食筋脈橫解腸澼爲痔東垣以爲飽食用力房勞以致脾胃濕熱之氣下迫大腸澼裂又云飽食負重婦人難產小兒痢疾或苦用力亦致腸澼此實受病之源故澼之淺者則大腸半破漏熱之氣滲歸腸之半表半裏留連下陷結核肛內形如葡萄蓮蓬阻塞穀道臨廁脫肛良久方收名曰翻花若因風熱糞燥使難糞未下而痔先破血出者有之糞已下而痔後破血出者有之此皆內痔所爲因糞難易血出不同又何有腸風下血遠近前後之理故澼之深者則大腸全破漏熱之氣滲出腸外留連肉腠橫流肛外結核如櫻桃牛奶奶鷄冠或串陰或串陽爲囊癰爲懸癰或串脣爲脣癰膿水流久內結鵝管珊瑚譬猶山洞之木涓滴日久結爲鍾乳鵝管枝幹蕃生瘡孔散出形如蜂窩爛爪膚殘肉陷允成瘡疾此皆外痔所致故痔雖有內外腸澼淺深不同治者不思拔本塞源但見大便結實爲燥兼熱瘡腫後重腸頭成塊爲濕兼熱大痛爲風兼熱蟲蝕爲木侮金蓋木先朽而後生蠹腸已澼而毒始流先正立方行氣和血瀉火疏風以調其內又用砒燃紙瘡爛去鵝管死肌以治其外觀此不過治標緩急而已若僻處迫近肛門死肌既去腸頭肉長此幸收功而已正孔難收不久復作咎歸病人予患此疾一十七年

遍覽羣書悉遵古治法療無功幾中砒毒寢食憂懼後遇江右李春山只用芫根煮線掛破大腸七十餘日方獲全功病間熟思天啓斯理後用治數人不拘

數瘡上用草探一孔引線繫腸外墜鉛錘懸取速效鵝管內消七日間瘡全如舊警築堤決防水既歸漕衆流俱涸有何記濫線落日期在瘡遠近或旬日半月不出二旬線既過肛如錘脫落以藥生肌百治百中若治內痔則用敷藥不犯砒硝或用藥翻肛或候自脫以藥日敷黃水既乾內痔焦黑七八日間黑肉脫去以藥生肌腸收如舊縱有熱毒皆隨糞下後患再無譬如夾洲既去水歸中流何有旁通壅滯之患近因浙衢魯秋泉專門痔漏線裹蜘蛛網每瘡紙硝亦頗收功但其用藥狠虎目擊心傷所得方理不敢自私因書膚見公之天下永除斯疾云

王肯堂證治準繩

驅馬墜馬瘻

鬼遺云垂珠左右兩處起癰爲驅馬墜初起大小不定此處皮肉薄紋緊口亦難合初起宜以藥貼令內消但易成漏硬卽難爲功矣又云交福一處近稜線上亦爲驅馬墜宜預防成漏

穿福發

或問背之下極發疽何如曰此名穿福發屬督脈及太陽經由勞傷憂思積鬱所致活命飲加羌活黃藥內托羌活湯主之及勝金丹神仙追毒丸壯實者八陣散一粒金丹下之老弱者十全大補湯人參養榮湯此證速治稍緩則潰爛難收斂成漏者多麻木黑

陷泄瀉嘔噦疲倦者不治  
涌泉疽

鬼遺云湧泉疽腫起發太陰太陰尻尾前是也如伏鼠二十日不穴死十日可刺發清膿赤黑者死白者可治

臀癰

或問臀上生癰何如曰腫高根淺爲癰腫平根深爲疽俱屬足太陽經濕熱所致宜服內托羌活湯內托復煎散加羌活主之勝金丹黃芪木香散選用壯實者一粒金丹八陣散下之老弱者十全大補湯人參養榮湯先賢云此瘡當服補養之劑若無補養之功其禍多在結痂之後治之難愈切須戒謹勿較大補之劑腫而不潰者服臺閣紫微丸

吳崑醫方考

脫肛方論

久瀉脫肛者丹溪脫肛方主之蓋瀉久則傷氣下多則亡陰是氣血皆虧矣故令廣腸虛脫氣不足補之以甘溫故用參芪陰不足者養之以厚味故用芎歸下者舉之故用升麻

泄瀉虛寒脫肛者舉肛丸主之夫濕盛則濡瀉久瀉則胃虛而臟寒乃無陽以升舉故令肛脫而不上燥能去濕故用半夏南星枯能制濕故用紅白枯礬溫能緩臟故用黑白附子若雞冠花刺蝟皮枳殼所以驅風訶子苦蔥核桃仁之灰取其瀉以固脫也熱瀉脫肛者收肛散塗之良夫熱則肛門瀉而便不易出故努責久則令脫肛此與寒脫不同者此則肛門瀉寒脫則洞泄而不瀉也苦可以勝熱故用熊膽瀉可以固脫故用兒茶辛可以拔邪故用冰片

痔漏

內熱痔漏下血者四物加芩藥槐花湯主之夫痔漏廣腸之毒也其疾多見於膏梁富貴之人而藜藿之徒未見其多也一有病根則勞思便作飲酒便作所必然者內熱而血妄行也是方也生地槐花黃芩藥清其熱也當歸芍藥川芎調其血也

年高氣弱痔血不止四君子湯主之誤服攻痔之藥致血大下不止而虛脫者亦此方主之夫血有形之陰也必賴無形之氣以固之故年高而氣弱則血下久藥損氣則血下是方參术芩草甘溫益氣之品也大氣充盈自足以固有形之血譬之乾元充溢於兩間自能舉乎大地而無傾陷之危也

論痔漏諸藥

按古方醫痔漏下血有用槐角柏葉蠅皮露蜂房牛角腮胡桃等灰者俱以方寸匕酒調下此皆枯痔之法也湯液之中有用防風秦艽皂角仁荆芥白芷者此皆責之風熱入臟也有用芒硝大黃檳榔枳實者此皆責之實熱可下也有用胡黃連酒苦參石蓮肉番木籜者此皆責之實熱可清也有用杏仁紅花蒲黃蘇木者此皆責之瘀血未消也有用地榆蘚艾枯龍骨鹿角霜者此欲強止其血也有用象牙蟻蟬人爪蟹爪者此欲放出其血而外施藥以愈之也有用熏法者有用洗法者有用藥坐者無非枯痔止血之品也有用插藥者有用掛線者無非爛肌去腐之輩也嗚呼任醫猶任將用藥猶用兵神於兵者壘石可以爲營驅牛可以破敵神於藥者心解而機自靈見

超而術自神則不拘拘於紙上之陳言矣

陳實功外科正宗

痔瘡論

夫痔者乃素積濕熱過食炙煩或因久坐而血脈不行又因七情而過傷生冷以及擔輕負重竭力遠行

氣血縱橫經絡交錯又或酒色過度腸胃受傷以致濁氣瘀血流注肛門俱能發痔此患不論老幼男婦皆然蓋有生於肛門之內有突於肛外之旁治分內外各自隄防大者若蓮花蜂窠翻花鷄冠菱角珊瑚等狀小者如櫻珠鼠尾牛奶鷄心核桃蜆肉之形故積毒深者其形異而頑惡毒淺者其形正而平常久則崩潰成漏新則墜腫刺疼甚者糞從孔出血流竅中氣血日有所傷形容漸有所削若不早治終至傷人因常治法多用針刀砒硇線墜等法患者受之苦

臀癰論

楚聞者因循都不醫治予療此證藥味數品從火煅煉性卽純和百試百驗此方法由來異矣凡療內痔者先用通利藥蕩滌臟腑然後用喚痔散塗之肛門內片時痔自然泛出卽用葱湯洗淨搽枯痔散早午晚每日三次俱用溫湯洗淨然後搽藥輕者七日重者十一日其痔自然枯黑乾硬停止枯藥其時痔邊裂縫流膿換用起痔湯日洗一次待痔落之後換搽生肌散或鳳雞膏等藥生肌斂口虛者兼服補藥其日半月自可完矣外痔者用消毒散煎洗隨用枯痔散照內痔搽法用之自始至終無異完口百日入房乃吉至於穿腸久漏者用胡連追毒丸黃連閉管丸服之不用針刀掛線效如拾芥耳

看法

初起有頭紅赤腫痛頂高發熱根脚高聳者爲易治已成瘻腫發熱疼痛有時皮薄光亮色紅易膿者順已潰膿稠而黃色如猪腦腫消痛止起坐自便者易

初起如粟形或黃泡一點平塌作痒根脚散漫者重已成色紫堅硬脣股俱腫小便澀滯日久無膿者險潰後無稠膿頂空根軟塌手按不知疼神昏無治法

治法

初起惡寒體倦喜覆衣被脈浮緊而在表者微散之已成內熱口乾好飲冷物小水澀而大便祕者通之項高色赤焮痛發熱疼痛有時者宜托裏更兼解毒腫已高而作疼膿已熟而不破脹痛難忍宜卽針之潰後堅硬不消膿水不止飲食無味宜補虛健脾

景岳全書

臣張介賓著

論脫肛

大腸與肺爲表裏肺熱則大腸燥結肺虛則大腸滑脫此其要也故有因久瀉久痢脾腎氣陷而脫者有因中氣虛寒不能收攝而脫者有因勞役吐瀉傷肝脾而脫者有因酒濕傷脾色慾傷腎而脫者有因腎氣本虛關門不固而脫者有因過用寒涼降多亡陽而脫者有因濕熱下墜而脫者然熱者必有熱證如無熱證便是虛證且氣虛卽陽虛非用溫補多不能效凡小兒元氣不實者常有此證故陳自明曰大腸虛寒其氣下陷則肛門翻出或因產努力其肛亦然

是誠確見之論

論治

內經曰下者舉之徐之才曰澀可去脫皆治脫肛之法也故古人之治此者多用參芪歸朮川芎甘草升麻之類以升之補之或兼用北五味烏梅之類以固之澀之仍外用熏洗收澀之藥則無有不愈

凡中氣微虛而脫者宜四君子湯或五味異攻散中

寒吐瀉而脫者五君子煎或溫胃飲瀉痢不止而滑脫者胃關煎或加烏梅北五味文蛤木香之屬以佐之脾虛下陷而脫者補中益氣湯或舉元煎陰虛肝腎不足而下陷者補陰益氣煎陰中陽虛而脫者理陰煎或大補元煎以上諸證凡虛中挾火或熱赤或腫痛宜用補中益氣湯加黃連黃芩槐花之類加減治之然必真有火證火脈方可酌用寒涼若非實火則大忌苦寒以防其沉降敗脾也

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典  
第二百二十八卷目錄  
醫部彙考二百八

## 後陰門二

藝術典第二百二十八卷  
醫部彙考二百八

## 後陰門二

## 方一

方一  
蒼术澤瀉丸河間六  
書下同

蒼术澤瀉丸

河間六  
書下同方一  
蒼术澤瀉丸河間六  
書下同

蒼术澤瀉丸

河間六  
書下同

右爲細末麪糊爲丸如桐子大每服二三十丸空心酒下米飲亦得忌油膩冷猪魚臭血等物

右爲細末麪糊爲丸如桐子大每服二三十丸空心酒下米飲亦得忌油膩冷猪魚臭血等物  
黃連散

雞冠花 黃連 貢衆 川大黃 烏梅各一兩

甘草三分炙

右爲末每服二錢溫米飲調下日三服不計時候

乳香沒藥散

治五種腸風痔瘻無問久新

宣黃連 白礬各一兩 穀精草半兩 石榴一箇

用刀子割下頂蓋取去裏面子三停之一停次將黃連白礬碎內入石榴內用元頂蓋合上

右以濕紙一張裹了後用膠泥拍作餅子裹石榴子內炒焦黃爲度與石榴

右咬咀水酒各半煎食前溫服仍頻提掣項中髮

立效

冰香散

治臘毒初起微腫卽用蚯蚓糞灸後以此藥搽之

爐甘石火煅二錢黃連膏淬之待乾乳末聽用

乳香另研 没藥另研各一錢 冰片二分

麝香一分

右和研細末田螺搗爛取汁調塗患上偶無田螺  
煎黃連汁亦可

內托羌活湯

羌活 官桂酒洗 大黃酒洗各四分 藁本

連翹 歸梢各一錢 黃芪一錢五分 炙甘草

陳皮 蒼朮各五分 白芷

右作一服水酒各一鍾煎空心熱服以被覆患上  
使藥力行之方能奏功如或不愈用鐵箍散薑汁  
酢火上熬熱調敷留孔時令熱餘汁潤之以助藥

力

代刀散

穿山甲 磨蠶 枳殼 薑黃 牽牛 赤石脂

大黃 白芷 貝母各等分

右爲細末每服五錢早晨空心用酒調下行利十  
餘次用薄粥補之其膿血從大便中出

宣毒湯

大黃三錢酒蒸 白芷 赤芍 甘草各五分  
治坐馬癱

連翹 枳殼各一錢 當歸梢二錢

右水酒各一鍾煎一滾去渣早晨空心服

內托追毒飲

人參 黃芪 厚朴 甘草 桔梗 枳殼

黃連 金銀花 烏藥 當歸 茯苓 白芷

川芎 防風

右水酒各一鍾煎去渣服

法製枯藥

信一兩 白礬三兩爲末 巴豆五粒去殼

飛丹 碳砂臨時生用各五錢

先將礬一兩半安瓦盆中隨將信摻在礬上再將  
礬覆上火熬枯取出爲末加碳砂末五錢和勻研

細末如塵先用魚腥草煎湯洗淨每用少許點上  
少頃黃水漸出一日夜三四次如無魚腥草或茶  
葉花或野薔薇花紅白槿樹花代之或甘草湯亦  
可

治療

白芷 黃連 血竭 龍骨各五錢 光粉二兩

黃丹三錢水飛炒 軟石膏 海螵蛸各一錢

黃藥 五倍子各一兩

右爲細末如瘡孔深用蘆管吹入裏面如瘡口淺

止乾摻入內生肌平伏不用  
點痔藥

冰片 乳香 没藥 熊膽  
右俱爲末用蠅牛一枚碎其底入前四末放盡內  
化水以銀簪滴汁痔上甚效田螺代之亦可

秘方

砒霜白色明淨者五錢 白礬明淨者一兩二錢

黃丹六錢水飛二次焙乾 蠍梢八箇瓦上焙乾

草烏頭一錢爲末去皮生用

右件用舊鐵杓或熟鐵銚先將炭燒鐵銚透紅放

冷揩拭淨將砒打碎如豆大將白礬燒令滾沸將

碎砒投礬內拌勻以文武火煅旋旋攪入草烏蠍  
梢黃丹同研末收放新小瓶內如用先將痔漏以

甘草湯或葱湯洗淨將生麻油調藥少許以鵝翎  
掃藥在痔漏上日三次第一日第二日瘡內必出

黃水如膠其痔漸消看漏深淺就將薄綿紙裹猪

腳三根先入在漏內試漏久不取出如換藥紙燃方取  
出再換新藥紙燃入漏內日上三次端午晚用藥

俱要洗淨漏用藥三五日痔漏頭併瘡口俱黑色

然後不用紙燃藥其漏瘡根自落如漏不深入內  
上用藥點擦如瘡紅活平復不收口方用生肌散  
藥敷之立愈其瘡根永除再不發矣

生肌散

白芷 黃連 血竭 龍骨各五錢 光粉二兩

黃丹三錢水飛炒 軟石膏 海螵蛸各一錢

黃藥 五倍子各一兩

右爲細末如瘡孔深用蘆管吹入裏面如瘡口淺

止乾摻入內生肌平伏不用  
點痔藥

冰片 乳香 没藥 熊膽

牛黃末一分銅杓內先炒微煙卽下 砒末二錢候  
煙起再下 白礬末九錢待滾乾取起仍入火微炒  
安地上出火毒爲末後入 乳香 辰砂 没藥

痔漏藥

右共爲極細末每用一錢許以稠麪糊調和隨漏

孔之大小深淺以爲條子之粗細長短如瘡孔爛

大止用津唾調之填入孔內待痔已潰動毒水自流如好肉上生瘡卽以五黃膏護外仍用唾調前

藥末傅在痔根上如痔根脫落摻生肌散并多服

蠟簪丸

生肌散

未出毛小鼠一枚炙乾 龍骨煅 海螵蛸

赤石脂各一錢 乳香 沒藥 血竭 輕粉

雄黃各五分

右各爲末如塵臨用加冰片少許

生肌散

寒水石煅一錢 龍骨煅五分 乾胭脂三分

輕粉

右爲細末乾摻新瘡加薄荷一分老瘡依此

辰砂錠子

久痔成漏

信一錢 白礬二錢 密陀僧 辰砂各五分

先研信細入磁盆中次用礬信火上煅以烟盡爲

度再將密陀僧辰砂研細白礬一些和作尖錠子

頑漏納瘡口腐去敗盡方可生肌

盤腸通腸痔散

痔在內用此敷之痔頭頂自出以前藥枯之

磁石一錢 白礬枯過五分 白乾薑五分

草烏尖三枚

右爲末葱汁調敷

益氣清臟湯

治痔漏

人參 當歸 條芩 黃連 生地 赤芍藥

槐角 川芎 升麻 枳殼 秦艽 白朮  
茯苓 甘草

右水二鍾薑一片燈心二十根煎服

木香散

內痔用藥後小便不通服此藥外痔不用

山梔子 木通 車前子各三錢 淡竹葉

生地黃各一兩 黃芩五錢 燈心三十根

右咬咀每服四錢水一鍾半煎七分空心服

懊憞散千金方 同

治濕瘡爛殺蟲除蠶

萹竹半兩 蕤蘆 雷丸 青葙子 女青

桃仁各三兩

右六味治下篩粥飲服方寸匕日三加至二匕酒

服亦可

杏仁湯

治蠶

杏仁五十枚 苦酒二升 鹽一合

右三味和煮取五合頓服之小兒以意量服

桃皮湯

治蟻蟲蛔蟲及痔蠶蟲食下部生瘡

桃皮 艾葉各一兩 槐子三兩 大棗三十枚

右四味咬咀以水三升煮取半升頓服之良

猪膽苦酒湯

治熱病有蠶上下攻移殺人

猪膽一具 苦酒半升和之

右火煎令沸三上三下藥成放溫空腹飲三滿口

治時氣病匿下部生瘡  
雄黃兌散

右五味爲末綿裹如棗大內下部亦可棗汁服方

苦參各三兩

寸匕日三

針粉散

治脫肛歷年不愈

針粉一味

右研細末每用少許摻之按入即愈

周先生枯痔法

赤石脂五錢 辰砂痛加一錢 明礬 黃丹

右爲末先用鬱金末護肛門如無鬱金用薑黃末代之調塗四圍好肉如不就加菉豆粉打合却將枯藥敷上如肛門疼急濃煎甘草湯放溫拂四圍肛門上就與寬腸藥

寬腸藥

槐花

大黃

枳殼

木通

連翹

瞿麥

當歸

右半酒半水煎

收腸方

人參 當歸各一兩 川芎 甘草 白芷

防風 厚朴 桔梗 桂枝 黃芪

右爲細末半酒半水煎如惡酒少水多煎之夏月減桂朴加芩藥

周先生割痔麻藥

川烏 草烏尖 胡椒 吳萸 花椒 白殼蟹炒  
右爲末酒調敷四邊然後割之又以此藥敷之否

則亦用麝香龍骨塗之

按枯痔繫痔割痔三法用前藥服及敷貼不退者  
然後用之必敬謹之不可視為常法

連魏散

治食積痔

黃連 阿魏 山楂 神鞠 桃仁 連翹

槐角 犀角各等分

右爲末以少許置掌中時時舐之津液嚥下如三分消二卽止後服

連歸丸

治痔漏及脫肛便血

全當歸 酒黃連各四兩 防風 枳殼各二兩

右爲末用前浸黃連酒打糊丸梧子大每六七十

丸米飲下忌羊魚雞鵝煎炒熱物

加味連殼丸

治濕熱內甚飽食腸澼發爲諸痔久而成瘻

黃連一兩 枳殼 厚朴各五錢 當歸四錢

木香 黃蘗各三錢 荆芥二錢 蟠皮一箇

右爲末糊丸梧子大每服三十九溫水下

秦羌湯

治痔漏成塊下垂不任

秦艽 羌活各一錢 黃芪二錢 升麻 麻黃

柴胡 炙甘草各五分 藁本三分 防風七分

細辛 紅花各少許

水煎服忌風處大小便

槐膽丹

不問遠年近日痔瘻服之如神久服黑髮固齒

十月上巳日揀肥實槐子用瓦盆如法固濟於背陰

牆下掘一坑約二三尺深埋之預先取黑牛膽五六

箇臘月八日取前槐子裝在膽內高懸陰乾至次年

清明日取出

右用磁器收貯每空心白湯下一日服一粒二日

二粒漸加至十五粒止以後一日減一粒週而復

始

加味地黃丸

熟地 黃芪各一兩半 槐花 黃蘗 杜仲

白芷各一兩 山茱萸 獨活 山藥各八錢

牡丹皮 茯苓 鐵瀉各六錢 白附子二錢

右爲末蜜丸梧子大每五十九空心米飲下

牽牛酒

通行痔漏中惡水自大腸出

黑牽牛末一分入猪腰子內以線紮箬葉包慢火煨

熟

內生肌丸

枯礬 鹿角 芝麻各一兩

右每空心細嚼溫酒送下

右爲末蜜丸梧子大溫酒下三十九竅塞後去鹿

角加象牙一兩黃蠟爲丸常服斷根

加味蠟礬丸

治新久諸漏

象牙五錢 露蜂房 白僵蠶 蛇退 血竭

木香各三錢 乳香二錢 白礬二兩

右爲末黃蠟四兩爲丸梧子大溫酒下三十九

齒髮散

治漏瘡惡瘡生肌裏欲乾者用之

人齒 頭髮 雞脷脣各等分俱燒存性 麝香

輕粉各少許

右爲末濕則乾摻乾者麻油調擦

蜂房散

治久年漏瘡或暫差復發或移於別處

露蜂房炙黃三分 穿山甲 龍骨各一分

麝香少許

右爲末臘月豬脂調敷濕則乾摻

蠟牛膏

治痔疼痛

蠟牛一錢 片腦 麝香各少許

右搗爛取汁敷痔上痛止腫消

青龍五生膏

治癰疽痔漏惡瘡膿血出皆以此方導之

生梧桐白皮 生桑白皮 生竹茹 生柏白皮

生龍膽 蜀椒 附子 芎芢各五兩

蜂房 蟲皮 蛇蛻皮 雄黃 雌黃各一兩

右十三味咬咀以三年苦酒二斗浸一宿於炭上

炙乾搗下細篩以豬脂二升半微火煎攪令相得

如飴著末水中新白磁器中盛稍稍隨病深淺傅

之并以清酒服如棗核大日一

黃蠟丸

治臓毒

黃蠟四兩

右一味隔水煮軟丸如桐子大月朔服一丸次日

服二丸三日服三丸漸加至月盡三十丸已後每

日減一丸至一丸止用酒送下輪流服之其瘡自

痊則不必服矣

五九散古今醫鑑下同

治痔漏如神

白牽牛頭末 大黃 五倍子 乾蓮蕊各一兩

黃連三錢 磬紅以皂角煉紅

當歸各五錢

沒藥 乳香各一錢竹葉焙乾

右共爲末初服五分二服六分三服七分四服八分五服九分爲止每日清晨用牙猪肉湯半椀加

無灰酒一小鍾調下忌猪腸肚驥肉燒酒

三八全應丸

痔漏效驗

胡桃十八箇內取隔三十六片 地骨皮酒炒乾

當歸酒洗微炒 刺蝟皮一箇連刺酒浸曬乾

槐角酒浸炒 黃連酒炒 甘草蜜炙各二兩

乳香一錢

右爲末酢糊爲丸如梧子大每服三五十丸白湯

或酒早晚二服一月後平復

地榆丸

治痔漏通用

槐角 生地黃各二兩 當歸身 黃芪 黃連

防風 連翹 黃芩 枳殼 秦艽 地榆

升麻各一兩 阿膠 川芎 白芷各五錢

右爲末酒糊丸如梧子大每服五六十九加至七八十九空心米湯下或酒任下

追風補腎十漏大金丹

治漏庚申甲子成除日合

當歸 麥冬 破故紙 川烏 肉蓴蓉 山藥

白茯苓 枳殼 白芷各二兩 人參

生地 小茴 鹿茸 木香 青木香 砂仁

厚朴 青皮 陳皮 烏藥 肉豆蔻 天麻

乳香 没藥各一兩 硼砂 丁香各五錢

熟地 大茴 枳實各三兩 大附子一箇

香附 松節各四兩

右爲末煉蜜丸如彈子大金箔爲衣每服一丸空

心酒化下

升陽除濕湯

治脫肛自下而上者引而竭之

柴胡 升麻 防風 猪苓 澤瀉 蒼朮

陳皮 神薑炒 麥芽炒 甘草

右剉水煎空心溫服胃寒腸鳴加益智半夏

提氣散

治氣虛下陷脫肛

黃芪 人參 白朮 當歸 白芍 乾薑炮

柴胡 升麻 羌活 甘草炙

右水煎服

舉肛丸

治無火證瀉久脾虛脫肛

半夏 天南星 枯白礆各五錢 雞冠花炒

白附子各五兩 胡桃仁十五箇燒存性 枳殼

荳子肉煨 黑附子各一兩 刺蝟皮一枚炙

苦蔥一枚燒存性

右共爲末酢糊丸空心溫酒下三十九

水澄膏

治痔以此保護良肉再用後藥以枯痔

鬱金 白芨各一兩 一方加黃連

右二味爲細末如內痔候登廁翻出在外用溫湯

洗淨側臥卽出用蜜水調令得中篦箋塗穀道四

邊好肉上留痔在外以紙蓋藥上良久方用枯藥

搽痔上用筆蘸溫水於紙上不令藥乾及四散

枯痔方

白礆四兩 生信石二錢半 碳砂一錢研極細

右各研爲細末先用砒入紫泥罐次用白礆末蓋

之用火煅令烟斷其砒盡隨烟去借砒氣於礆中

耳用礆爲極細末看痔頭大小取礆末在掌中更

入硃砂少許以唾調稀用篦頭塗痔上周遍一日

三上候看痔頭顏色焦黑爲效至夜有黃水出切

勿他疑水盡爲妙至中夜上藥一遍來日依然上

藥三次有小痛不妨換藥時以碗盛新水或溫湯

在痔邊用筆輕洗去痔上舊藥更上新藥仍用護

肉藥次用荆芥湯洗之二兩日之後黃水出將盡

却於藥中增硃砂減白礆則藥力卽緩三兩日方

可增減漸漸取之庶不驚人全在用藥人看痔頭

轉色增減厚薄傳藥方是活法此藥只是借砒信

耳又有硃砂解之一方土將此二方在京治人多

效致富一富商因驗以百金求得之錄於予予雖

未用傳人無不言效但枯藥趙宜真煉師已刊於

青囊雜纂如神千金方未見刊傳大抵今人言能

取痔者皆此方也恐氣血虛或內邪者還當兼治

其內庶不有失

秦艽當歸湯

東垣下同

治痔漏大便結燥痛甚

大黃煨四錢 秦艽 枳實各一錢 當歸尾

澤瀉

皂角仁 白朮各五分 紅花少許

桃仁二十枚去皮尖

水二盞煎一盞食前服忌生冷硬物及酒麪大料

椒薑等物若犯之其藥無效

清涼飲

治諸痔熱證大便祕結

當歸 赤芍藥 甘草炙 大黃蒸各等分

右咬咀每服三錢新汲水煎服

收痔丸

直指方

治諸痔通用

阿膠炒 黃連 貫衆各半兩 皂角刺略燒

尺長皂角去弦酢炙 蟬皮炙焦 蜂房炒焦

蛇皮略燒 當歸 穿山甲微火燒令焦 川芎

槐花 猪後蹄垂甲燒存性各二錢半

右酢糊丸梧桐子大每服七十九空心荆芥湯下

無比丸

秘方

治一切痔漏

象牙屑 血竭各半兩 明雄黃另研 没藥

乳香 明珠砂各三錢三分 蜂房炒 蟬蛻

牙皂莢皮去弦炙各三錢

右爲末用好黃蠟二兩鎔化布攏淨再入酒內蒸

化冷定取起蠟化開和前藥急手爲丸如梧桐子

大每服空心熱酒浸一錢五分嚼下本酒吞送七

日全效

孫尚書方

東谷

治痔漏有效

明硃砂 明雄黃各另研二味再合乳極細聽用

皮硝淨一斤

右用健豬大腸頭一尺去油淨以皮硝一斤盡裝

入腸內兩頭縛定入甑蒸熟取出連腸埋土地中

一七日取起去腸將硝收貯淨磁瓶中每服用硝

七分半雄砂二分半共一錢再搗勻熱酒衝空心

服之七日全愈

五灰散

三方

治五種痔瘡不問內外並宜服之

龍甲治牝痔 蟬皮治牡痔 蜂房治脈痔

蟬蛻治氣痔 猪左足懸蹄治腸痔各等分

右各燒存性隨證倍用一分爲末空心臨臥酒調

二錢服

茄柯湯

心鏡

洗痔極效

茄柯 槐花俱陳者佳 冬瓜皮 枳殼各等分

右煎湯先熏後洗却敷後項藥愈

無比丸

秘方

洗痔極效

蓮房枳殼湯

聖惠

乾蓮房 荆芥穗各一兩 枳殼 薄荷葉

石硝各半兩

右爲粗末水三椀煎二椀半熱熏洗

熏洗法

諸痔流血皆效

地榆半兩

右爲末每用半兩水二碗煎入明礬三錢如法熏

洗

側柏葉湯

側柏葉一兩 槐枝一握 黃連 黃芩 荆芥

蛇牀子各一兩 鏡面草 蚊草各一把

右作四次新汲水煎放桶中如法熏洗

熏洗諸痔

側柏葉一兩 槐枝一握 黃連 黃芩 荆芥

蛇牀子各一兩 鏡面草 蚊草各一把

熏洗

皂莢三鉗 艾一把 龍甲一枚 草烏一枚

乾蝦蟆一箇 雄黃半兩 麝香五分

右爲末拌勻穿地上一穴置炭火在內上用蓋密

惟留一孔旋入藥末一撮在上熏

神效散

洗痔凡富貴之人多因嗜慾飲酒過度喜怒不常

致生痔漏或如鼠奶連珠或肛門腸腫流膿漏血

其痛如割不可忍者但是諸腫痔漏及腸風下血

此藥治之無有不效

苦參 川椒 苦壺蘆 芫荽子 槐花 白芷

金銀花 連翹 枳殼 荆芥 獨活 小茴香

麻黃 牡蠣殼 威靈仙 椿樹皮各二兩

右咬咀每用半兩水五椀葱白三莖煎五七沸去

查以盆盛之坐上熏洗甚效一方加老黃茄子二

箇尤妙

煮藥線法

復齋

治外痔井漏囊癰懸癰臂癰

芫花入土根不拘多少搗自然汁於銅銚內慢火熬

成膏以生絲線入膏再熬良久膏濃爲度線陰乾膏留後用

一治外痔有頭者以藥線繫之候痔焦黑落下再

用線裹猪鬃蘸藥當納於竅中永不發

一漏井三癰不論瘡孔數十但擇近肛者以馬蓮

草探之若一孔通腸者先將銀條曲轉探入穀道

鉤出草頭將線六七寸一頭挽成活套扣以不挽

線頭繫草上引過大腸解線頭穿活扣內出寸長

繫三錢四五分重之鉛錘懸空墜之坐臥方便使

不粘衣可取速效每日早將線洗淨約日長出五

分仍要收上止留一寸線穿七日線下三寸之餘

僻處補完源頭既塞未穿漏孔及三癰膿水再無

鵝管化盡俱先平復瘡近肛十日半月線過肛門

即下瘡隔遠者二十日後即落若七日及落線後

旁瘡有未乾此原腸澼非止一口仍要再穿若穿

不動者以紙燃蘸代鍼散項至痛即曲折處三三

次通即穿線其線落下再用生肌散銀條式雙折

約三寸餘形如長又字形馬蓮草即北方鐵刷帶

也

### 生肌散

龍骨一兩火煅 詞子炮取肉二錢

右爲細末加輕粉三錢和勻先洗瘡拭乾敷上日

二次

### 敷藥

治內痔并因痔腫脫肛

猪胰半斤將大雄雞一隻籠餓一日揀淨地以胰子

喂之取糞曬乾四兩之上爲末 綠膽礬半兩

晉礬 破硝各一兩 千葉雌黃 雄黃各六錢

右各爲末以寬砂鍋盛之先下雞屎一兩次下晉

礬一兩次雌黃次硝次雄再加晉礬雞屎以新瓦

蓋鍋之上簇火以青烟去盡爲度冷定取出加乳

香沒藥各半兩爲極細末或用脫肛散脫出肛門

或候自脫將藥少許唾津調和以新筆蘸敷瘡上

患者側臥縮脚任瘡流去黃水日上五次夜上二

次逐次水洗拭乾方可上藥至三日後瘡已焦黑

頻用防風荆芥連翹苦參倍子煎湯洗之黑肉既

落上前生肌散瘡去平復腸收神效此方不用砒

硇不作便閉常用以治內痔之聖藥也

### 脫肛散

復齋

磁石 軍薑各一錢 枯礬五分

右爲極細末以葱涎調以綿絮蘸塞肛內其瘡自翻出瘡既愈後內須服補中益氣之劑六味丸八味丸

消痔千金散

心經

搽大便諸痔腫疼不已

甘草三分 赤石脂 黃連各六分 破砂一分

寒水石 孩兒茶各五分 冰片半分 熊膽二分

右爲細末猪膽汁調搽或入膽內竹管內以線縛口緊插入肛門內猝之自然痔病愈

半夏散

治痔初生急以此藥治之

半夏生搗末

不過三五日自愈

### 護肛膏

白芨 石膏煅 黃連各等分爲末

右以雞子清調如膏搽上剪油紙如月樣圈護痔

四旁好肉一次洗一次換藥

### 翻痔藥

治內痔必以翻痔藥取出腸頭方可上枯藥

草烏不拘多少

右爲末調敷肛門內其痔卽翻出

### 金寶膏

漏瘡用之能去腐肉而不傷良肉

桑柴灰五椀用沸湯十椀淋汁用草紙一層皮紙二

層放箕底次放灰上面淋洗 穿山甲二兩

信一錢另研 杏仁去皮七枚同信末研塗山甲

辰砂一字 粉霜一錢半

右將灰汁澄清下鍋煎滾下甲末候煎乾一半下

麝次下粉霜乾及九分下辰砂候成膏下石灰以

成塊爲則密罐收勿見風

五灰膏

危氏

治臍廔一切蘊毒發爲痔瘡不問遠年近日形似

雞冠梅核牛乳或內或外並皆治之此方親傳之

劉叔茂累試極驗

蕎麥燒灰半斗許 荆柴 老杉枝 山白竹

雜硬柴各截二尺長劈成片各取一束曬乾火燒成炭置密罐內自死

右炭以水煮取炭汁又用酒漏以布帛實其竅置

慢火熬約有一小碗候冷入石灰號丹調成膏以

密罐貯之上用石灰傅之勿令泄氣臨用時去石

灰以冷水調開令病人洗淨痔瘡仰臥搭起一足

先以濕紙於瘡四圍貼護却用竹籠挑藥塗痔上

須臾痛息用紙揩去藥再塗如此三四次要痔瘡

如墨樣黑方止以水洗淨每日常置冷水一盆以

葱湯和之日洗三五次六七日後膿穢出盡其瘡

自消

玉紅散

方

治諸痔

硝砂三兩先燒在鍋內 明礬二兩放硝上火煅枯

以烟盡爲度用礬爲末 硫砂四錢另研

右爲極細末敷痔乾用津調貼濕乾敷上

代鍼膏

枳殼二箇大者去瓢 巴豆半兩去皮

右將巴豆裝在枳殼內合縛定放罐內醋煮乾將

二味曬乾研末用絲綿蘸濕展藥傅瘡上及根底

痔去再不可用止用生肌散如頑漏日久以津調

敷瘡口敗肉自去

雞峰烏金散

治療漏

穿山甲 刺蝟皮 黃牛角心 牙皂角 槐子

皂角刺 枳殼 貫衆 阿膠各等分再夾和牛角

右以蝟皮穿山甲同炒另研爲末和入一處每服

一錢半用胡桃肉研爛調酒食前服漏血不止當歸煎湯調下

代赭石丸

治痔變瘻膿出不止

黛赭石煅醋淬研 磁石煅煮醋數沸淬七次研

白礬枯 牡蠣煅灰 龍骨研 刺蝟皮炙焦

皂角刺炒焦 猪後蹄垂甲燒灰各存性爲末

赤石脂 川椒焙 木賊焙 蜂房炒各等分

右爲細末神麴糊丸小豆大每服五十九丸空心艾

湯下

地黃丸

治五痔滋陰必用之藥

地黃酒蒸 黃芪各一兩半 槐花炒 黃藥炒

杜仲炒 白芷各一兩 茯苓七錢 山茱萸肉

山藥 獨活各八錢 澤瀉 牡丹皮各六錢

白附子二錢

右爲末煉蜜丸梧桐子大每服五十九丸空心米飲

下

三黃二地湯

治腸風諸痔便血不止及面色痿黃四肢無力

生地黃 熟地黃各一錢五分 蒼朮 厚朴

陳皮 黃連 黃藥 黃芩 當歸身 白朮

人參各一錢 烏梅二箇 甘草 防風 澤瀉

水二碗煎八分食前服

粟殼散

治諸痔作疼及腸風下血諸藥不止者宜服之

栗殼溫湯泡去內瓢去蒂切絲蜜水拌炒二錢

當歸身 陳皮 秦艽 黃芪蜜炙 生地黃

熟地黃各一錢 黃藥 黃芩 人參 蒼朮

厚朴 升麻各六分 荷葉蒂七箇 甘草五分  
地骨皮一錢三分

水三椀煎八分食前服或爲細末每服二錢空心

溫酒調服

洗痔枳殼湯

治痔瘡腫痛肛門下墜母論新久洗之痛自消

瀕蝦蟆草一名荔枝草四季常有面青紫白麻紋疊疊者是 枳殼各二兩

河水二瓢同上二味煎數滾先熏後洗良久湯留

再熱熏洗甚者三次卽洗淨當搽後五倍子散

五倍子散

治諸痔舉發堅硬疼痛難忍或藏毒肛門泛出腫

硬不收亦效

大五倍子敲一小孔用陰乾 瀕蝦蟆草搗碎填塞

紙碾爲細末每一錢加 輕粉三分 冰片五釐

共研極細待前枳殼湯洗後用此乾搽痔上卽睡

勿動其腫痛卽除凡外痔用二方搽洗亦可除根

永不再發

田螺水

治痔瘡堅硬作痛及脫肛腫泛不收者並用之

大田螺一枚用大冰片五釐研末用尖刀挑起螺蓋

將冰片入內平放片時待螺滲出漿水用雞翎蘸搽

患上勤勤搽之其腫痛自然消散

生肌鳳雛膏

用雞子煮熟去白用黃十餘箇銅杓內熬油傾入盞

內約油三錢加 輕粉細末一錢 乳香 血竭

龍骨末各五分

右共入油內和勻每日早午晚雞翎蘸塗患孔內膏蓋避風深者半月可以完口

煮藥線方

治諸痔及五癰六癰凡帶小而頭面大者宜用此線繫其患根自效

芫花五錢 磬錢二錢

用白色細扣線三錢同上一味用水一椀盛貯小磁罐內慢火煮至湯乾爲度取線陰乾凡遇前患

用線一根患大者二根雙扣繫於根蒂兩頭留線日漸緊之其患自然紫黑冰冷不熱爲度輕者七日重者十五日後必枯落後用珍珠散收口至妙

臍連丸

治痔無論新久但舉發便血作痛肛門墜重者

黃連淨末八兩 公猪大臍盡頭一段長一尺二寸溫湯洗淨將連末灌入臍內兩頭以線紮緊用時酒二斤半砂鍋內煮酒將乾爲度取起臍藥共搗如泥如藥爛再曬一時許復搗

右丸如桐子大每服七十丸空心溫酒送下久服除根此與猪臍丸無大異

胡連追毒丸

治痔漏不拘遠年近日有漏通腸汚從孔出者先用此丸追盡膿毒服後丸藥自然取效最穩

刺蝟皮一箇炙切片再炒黃爲末 麝香二分

胡黃連二兩切片薑汁拌炒

右以軟飯爲丸麻子大每服一錢食前酒下服藥後膿水反多是藥力到也勿懼之

黃連閉管丸

胡黃連淨末一兩 穿山甲麻油內煮黃色  
石決明煅 槐花微炒各五錢

右爲末煉蜜丸如麻子大每服一錢空心清米湯送下早晚日進二服至重者四十日而愈此方不

用針刀掛線不受苦楚誠起痼疾之良方也如漏之四邊有硬肉突起者加蠶繭二十箇炒末和入

藥中此方遍身諸漏皆效

活血散瘀湯

治臀癰初起紅赤腫痛墜重如石及大便祕澀

川芎 當歸 防風 赤芍藥 蘇木 連翹

紅花 天花粉 皂角針 黃芩 枳殼各一錢

大黃二錢

水二鍾煎八分食前服便通者去大黃加乳香

黃芪內托散

治臀癰已成服前藥勢定者欲其潰膿宜服之

黃芪二錢 當歸 川芎 金銀花 皂角針

穿山甲 甘草節各一錢

水二鍾煎八分入酒一杯食前服

四君子湯

治脾胃氣虛脫肛者

人參 白朮炒 茯苓各二錢 炙甘草一錢

右加薑棗水煎服或加粳米百粒

異功散

治前證

人參 白朮炒 茯苓 炙甘草 陳皮各一錢

右加薑棗水煎服

加味四物湯

治血熱陰虛脫肛者  
五味子九粒 熟地三錢 麥冬 當歸 黃藥  
蒼朮各一錢 白芍藥 川芎各七分 人參  
黃連各五分 杜仲七分半 知母各三分  
右水二鍾煎一鍾空心溫服酒糊丸服亦可足軟  
加牛膝三分

補中益氣湯  
人參 黃芪炒 白朮炒 甘草炙各一錢半  
升麻 柴胡各三分 當歸一錢 陳皮五分  
右加薑棗水煎空心午前服  
大補元煎景岳全書下同

治陰中陽虛以致脫肛者  
人參少則用一二錢多則一二兩 山藥炒二錢熟地少則用二三錢多則二三兩 杜仲二錢枸杞 當歸各二三錢若泄瀉者去之 炙甘草一二錢山茱萸一錢吞酸者去之  
水二鍾煎七分食遠溫服  
如元陽不足多寒者於本方加附子肉桂炮薑之類隨宜用之

如氣分偏虛者加黃芪白朮胃口多滯者不必用如血滯者加川芎去山茱萸  
如滑泄者加五味故紙之屬  
補陰益氣煎  
此補中益氣湯之變方也治脾虛下陷而脫肛者人參一二三錢 當歸 山藥酒炒各二三錢  
熟地三五錢或一二兩 陳皮 炙甘草各一錢

升麻三五分

火浮於上者去之

柴胡一二錢

無外邪者去之

水一鍾加生薑三五七片煎八分食遠溫服

舉元煎

治前證

甘草炙一二錢 升麻五七分 白朮炒一二錢

人參 黃芪炙各三五錢

水一鍾半煎七八分溫服

如兼陽氣虛寒者桂附乾薑隨宜佐用

如兼滑脫者加烏梅二箇或文蛤七八分

抽薪飲

治濕熱下墜疼痛脫肛

黃芩 石斛 木通 梔子炒 黃藥各一二錢

枳殼 澤瀉各一錢半 細甘草三分

水一鍾半煎七分食遠溫服

熱在血分大小腸者加槐蕊黃連以清之

熱在下焦小水痛澀者加草龍膽車前以利之

熱在陰分津液不足者加門冬生地芍藥之類以滋之

熱在腸胃實結者加大黃芒硝以通之

大分清飲

治前證

茯苓 濤瀉 木通各二錢 猪苓 枳殼

梔子或倍之 車前子各一錢

水一鍾半煎八分食遠溫服

如內熱甚者加黃芩黃藥草龍膽之屬  
如大便堅硬脹滿者加大黃二三錢

約營煎

生地 茯藥 甘草 繢斷 地榆 黃芩

槐花 荆芥穗炒焦 烏梅二箇

水一鍾半煎七分食前服

如下焦火盛者可加梔子黃連草龍膽之屬

如氣虛者可加人參白朮

如氣陷者加升麻防風

溫胃飲

治中寒嘔吐吞酸瀉泄不思飲食脫肛者

人參 白朮炒各一二錢或一兩 扁豆二錢炒

陳皮 炙甘草各一錢 乾薑炒焦一二三錢

當歸一二錢

去之清瀉者

水一鍾煎七分食溫遠服

如脾氣陷而身熱者加升麻五七分

五君子煎

治前證

人參二錢 白朮 茯苓各二錢 炙甘草一錢

乾薑炒焦一二錢

水一鍾半煎服

胃關煎

熟地三五錢或一兩 山藥炒 扁豆炒各二錢

炙甘草一二錢 吳茱萸製五七分 焦乾薑

白朮炒各一二三錢

水一鍾煎七分食遠溫服

瀉甚者加肉豆蔻一二錢麪裹煨或破故紙亦可

氣虛勢甚者加人參隨宜用

陽虛下脫不固者加製附子一二三錢

滑脫不禁者加烏梅二箇或北五味二十粒

赤芍藥 官桂去皮 甘草炙各等分

右咬咀每服一錢薑二片白糖一塊水一盞同煎

七分去查空心服

淋渫方

治下部痔腫大腸頭痙痛

威靈仙 枳殼炒各一兩

右爲粗末熬水熏洗冷卽再煖臨臥避風洗三次

挹乾貼蒲黃散

痔方

治痔瘡痛不可忍

槐樹根皮七兩不犯鐵器搗碎 片腦一分

指甲草七顆

蜀人呼爲芒草採喂猪亦可救餓高二三十

右作一劑用水一鍾煎一小盞入冰片末候溫頻

敷患處內服槐子酒無指甲草亦可

又方

治肉痔

槐花炒 白礬枯各一兩 附子五錢

右爲細末研勻蒸餅丸如桐子大每服二十九米

飲下食前日三服

治風痔不論有頭無頭定三日安

藜蘆燒灰 老乾薑 天麻各五錢 蓮子草

明礬 石硫黃各一兩 皂角針炒黃二錢

大苦苦蕘一枚 麝香少許

右將苦蕷開一孔入礬并硫黃在內孔如小錢大

就將原蓋合定綿紙糊却用瓦罐子盛炭火煅令

烟盡爲度候冷取出研細同前六味藥末和勻煉

蜜丸如桐子大每服十九至十五丸空心溫酒下

日三服三日效忌油麪醃藏牛馬肉魚腥生冷行

房遠行勞力一切等事

### 神妙方

羌活 當歸 川芎 獨活 黃連 山茱萸肉

全蠍 三稜 蓬术各半兩 枳殼去瓤十二兩

商陸白者一兩 巴豆去殼不拘數 鼠黏子炒

木香 甘草節 苦參 藜本 柴胡 蜈蚣炒

猪牙皂角去皮弦子淨各一兩

右將巴豆二粒或三粒入枳殼內線紮定却用酢

煮爛訖冷水洗淨去巴豆不用曬焙乾入前藥同

爲細末酢糊爲丸如桐子大每服三四十丸

空心酢湯下更用五倍子羌活獨活煎湯洗如大

便燥結用煮過巴豆六七粒加入同丸一方加白

术半夏荆芥薄荷檳榔各一兩

### 又方

治血箭痔 苦棟子肉

右爲細末酒煮糊爲丸如梧桐子大每服三十九

空心蒼耳子煎湯送下日二服

### 治漏神丹

川芎半兩 細辛 白芷梢各二錢半 甘草末

右每日作湯飲上瘡食後下瘡食前看瘡孔大小

用隔年黃麻根刮去粗皮槌軟撲成繩子紙入孔  
中至不可入則止日淺一日瘡用好膏藥貼之

### 枯藥方

赤足蜈蚣一條香油煎酥搗乾 人指甲五錢

乳香 沒藥各二錢 麝香 粉霜各五分

右除麝香另研餘俱用泥裹煨乾爲末以鵝翎管

吹上患處如有水卽時出盡不疼

### 又方

羌活 當歸 川芎 生地 姜桂茶 升麻

人參 黃芪 生地 川芎 當歸 升麻

條芩 枳殼 槐角 黃連

一方無黃連

熏洗方

五倍子 石硝 桑寄生 蓼房 荆芥

右煎湯先熏後洗

便毒方

山梔子 大黃 乳香 沒藥 當歸各五分

苦蕷仁三錢 代赭石一錢

右作一服煎

### 又方

治坐馬癥 人參 桔梗 枳殼 甘草 柴胡 川芎

羌活 白芷 防風 白朮 茯苓 金銀花

右咬咀薑三片棗一枚煎服

### 又方

治五痔衆醫所不能愈者 秦艽 白芷 厚朴 石楠 柴參 亂髮

瘡蟲 紫菀各一兩 雷丸 藥本各二兩  
貫衆 蟲蟲各半斤 猪後懸蹄十四枚

右十三味合搗下篩以羊髓脂煎和丸如梧子大

空腹飲下十五丸日二若劇者夜一服四日肛邊

痒止八日膿血盡鼠乳悉痊滿六十日終身不復

發久服益善忌魚猪肉等

### 蠲毒飲

甘草 貝母 赤芍 當歸 白芷 青皮

木通 連翹 桃仁 金銀花 天花粉各一錢

穿山甲炮

黃連 生薑各十兩 艾葉八兩 苦參四兩

如毒氣欲泄加酒蒸大黃三四錢煎服飲酒隨量  
以助藥力行利十餘次其毒化膿血從大便中出

### 又方

治濕黽

阿膠 當歸 青葙子各二兩 艾葉一把

右四味咬咀以水八升煮取二升半去滓分三服

### 又方

治濕病下部有瘡蟲蝕人五臟 右四味爲末蜜和搗萬杵初病酒服如梧子大

丸日二若下部有瘡取如梧子大末內下部日二

濕惡方

青黛 黃連 黃檗 丁香各一兩 麝香二分

右五味治下篩以小棗大內下部中日一度重者

棗大和羊脂二三合灌下部中日二服

痔漏方

野葛 茯苓 蕤白 當歸 通草各二分

附子一分

右六味咬咀酢浸半日先煎猪脂八合令烟出內

亂髮一分令消盡下之待冷又內松脂八分蠟二

分更著火上和次內諸藥煎令沸三上三下去查

以故帛傳藥貼腫上乾卽易如春月去附子其髮

須盡洗去垢不爾令瘡痛

痔腫痛方

枳殼一兩陳米炒令黃色去米不用 青木香一分

右爲末每服一錢飯飲調下

又方

治腸痔在腹內有鼠奶下血

白蕪荑 椿樹東行根 狼牙根 蜈皮炙焦

貫衆 雄黃各半兩 白鱔魚頭一箇炙焦

槐樹東行根白皮一分

右爲細末臘月猪脂和一丸彈子大綿裏納下部

淋洗法

天仙子 荆芥穗 小椒 蔓荆子

右水煎熏洗

貼痔法

蜀葵子半兩 蟬蛻五箇 檳榔一箇並爲末  
右用棗三枚取肉研細搜和藥末如覺硬滴少蜜

研成膏量大小貼於病處

又方

治痔漏因大腸感風熱而生

生白砒 腸粉各一字 水銀一粒如米大  
麝香一粒如小豆大

右件並入乳鉢內研極細如病有珠子者將礬湯

淨洗拭乾用手撚藥揩在痔上覺痒便是藥行一日二次又洗五日後住藥見效如或有孔只用紙撚引藥送之令徹其內更紙貼孔前一日二次

藥皮丸

治藏毒痔漏下血不止

川黃蘖皮刮淨一斤分作四分 一分用酒浸七日

洗曬乾 一分用酢浸七日洗曬乾 一分用童便

浸七日洗曬乾 一分生炒黑色

右爲末煉蜜丸梧子大每空心用溫酒下五十九

久服除根

溫白丸儒門事親

治藏毒下血

椿根白皮去粗皮酒浸曬乾

右爲末研棗肉和丸梧子大每淡酒服五十九或

酒糊丸亦可

洗痔漏方

花椒 艾葉 葱頭 五倍子 皮硝 馬齒菜  
茄根

右爲散水煎先熏後洗當時痛止指日可愈

欽定古今圖書集成物博彙編藝術典  
第二百二十九卷目錄

醫部彙考二百九



南醫經

右水煎服  
參木實脾湯

調二末成塊曬乾勿使血熟每黃酒送二錢名二  
槐丹

治氣虛脫肛

後陰門三

方二涼血清腸湯 參木實脾湯 參木芎歸

薄荷散 蝦皮散 香荆散 收腸養血和氣

丸龍骨散 滋腸散 蟠龍散 伏龍肝散

磁石散 寸金鏡子 參芪湯 煙鼈法

獨虎散 文蛤散 浮萍散 孩兒散 茯苓

湯 紅花桃仁湯 當歸榔李仁湯 泰羌活

猪蹄灰丸 檳榔散 單歸榔李仁湯 泰羌活

小豆散 乾葛湯 桔梗湯 威靈仙丸 白朮

皮丸桑木耳散 皂角煎丸 蘭甲丸 蝦

金散 烟熏方 楊櫟散 咳嗽散 龍腦散

蒲黃散 槐角地榆丸 地榆散 黑靈散

枳湯 逐瘀湯 骨碎補丸 大棗方 桂附

馬齒莧膏 神應膏 槓榔散 槐角根散

皮散 神效方 上品鏡子 加味四君子湯 膏肓

應效散 內托黃芪酒煎湯 治漏外寒藥

味香蘇散 血竭散 清心丸 桃仁散 寶勝金丸

取痔蟲方 黑地黃丸 三神丸 腎陽丸 膜通丸

活龜丸 豚胃丸 灰砂膏 田螺膏

右用二鍾生薑三片棗二枚煎一鍾服下陷加

升麻

參木芎歸湯

治瀉痢產育氣虛脫肛脈濡而弦者

人參 白术 川芎 當歸 升麻 白茯苓

山藥 黃芪酒炒 白芍炒各一錢 炙甘草五分

右加生薑水煎服

訶子人參湯

治前證

訶子煨去核 人參 白茯苓 白术 炙甘草

蓮肉 升麻 柴胡各等分

右加生薑水煎服

縮砂散

治大腸虛而挾熱脫肛紅腫

縮砂仁 黃連 木賊各等分

右爲細末每服二錢空心米飲調下

槐花 槐角炒香黃各等分

治下血脫肛

涼血清腸湯

證治準  
繩下同

生地 當歸 茯苓各一錢二分 防風 升麻

荆芥各一錢 黃芩炒 黃連 香附炒

甘草各五分

醫部彙考二百九

後陰門三

方二

涼血清腸湯 參木實脾湯 參木芎歸

薄荷散 蝶皮散 香荆散 收腸養血和氣

丸龍骨散 滋腸散 蟠龍散 伏龍肝散

磁石散 寸金鏡子 參芪湯 煙鼈法

獨虎散 文蛤散 浮萍散 孩兒散 茯苓

湯 紅花桃仁湯 當歸榔李仁湯 泰羌活

猪蹄灰丸 檳榔散 單歸榔李仁湯 泰羌活

小豆散 乾葛湯 桔梗湯 威靈仙丸 白朮

右用二鍾生薑三片棗二枚煎一鍾服下陷加

升麻

右用二鍾生薑三片棗二枚煎一鍾服下陷加

升麻

參木芎歸湯

治瀉痢產育氣虛脫肛脈濡而弦者

人參 白术 川芎 當歸 升麻 白茯苓

山藥 黃芪酒炒 白芍炒各一錢 炙甘草五分

右加生薑水煎服

訶子人參湯

治前證

訶子煨去核 人參 白茯苓 白术 炙甘草

蓮肉 升麻 柴胡各等分

右加生薑水煎服

縮砂散

治大腸虛而挾熱脫肛紅腫

槐花 槐角炒香黃各等分

右用二鍾生薑三片棗二枚煎一鍾服下陷加

升麻

右用二鍾生薑三片棗二枚煎一鍾服下陷加

升麻

參木芎歸湯

治瀉痢產育氣虛脫肛脈濡而弦者

人參 白术 川芎 當歸 升麻 白茯苓

山藥 黃芪酒炒 白芍炒各一錢 炙甘草五分

右加生薑水煎服

訶子人參湯

治前證

訶子煨去核 人參 白茯苓 白术 炙甘草

蓮肉 升麻 柴胡各等分

右加生薑水煎服

縮砂散

治大腸虛而挾熱脫肛紅腫

槐花 槐角炒香黃各等分

右用二鍾生薑三片棗二枚煎一鍾服下陷加

升麻

右用二鍾生薑三片棗二枚煎一鍾服下陷加

升麻

參木芎歸湯

治瀉痢產育氣虛脫肛脈濡而弦者

人參 白术 川芎 當歸 升麻 白茯苓

山藥 黃芪酒炒 白芍炒各一錢 炙甘草五分

右加生薑水煎服

訶子人參湯

治前證

訶子煨去核 人參 白茯苓 白术 炙甘草

蓮肉 升麻 柴胡各等分

右加生薑水煎服

縮砂散

治大腸虛而挾熱脫肛紅腫

槐花 槐角炒香黃各等分

右用二鍾生薑三片棗二枚煎一鍾服下陷加

升麻

右用二鍾生薑三片棗二枚煎一鍾服下陷加

升麻

參木芎歸湯

治瀉痢產育氣虛脫肛脈濡而弦者

人參 白术 川芎 當歸 升麻 白茯苓

山藥 黃芪酒炒 白芍炒各一錢 炙甘草五分

右加生薑水煎服

訶子人參湯

治前證

訶子煨去核 人參 白茯苓 白术 炙甘草

蓮肉 升麻 柴胡各等分

右加生薑水煎服

縮砂散

治大腸虛而挾熱脫肛紅腫

槐花 槐角炒香黃各等分

右用二鍾生薑三片棗二枚煎一鍾服下陷加

升麻

右用二鍾生薑三片棗二枚煎一鍾服下陷加

升麻

參木芎歸湯

治瀉痢產育氣虛脫肛脈濡而弦者

人參 白术 川芎 當歸 升麻 白茯苓

山藥 黃芪酒炒 白芍炒各一錢 炙甘草五分

右加生薑水煎服

訶子人參湯

治前證

訶子煨去核 人參 白茯苓 白术 炙甘草

蓮肉 升麻 柴胡各等分

右加生薑水煎服

縮砂散

治大腸虛而挾熱脫肛紅腫

槐花 槐角炒香黃各等分

右用二鍾生薑三片棗二枚煎一鍾服下陷加

升麻

右用二鍾生薑三片棗二枚煎一鍾服下陷加

升麻

參木芎歸湯

治瀉痢產育氣虛脫肛脈濡而弦者

人參 白术 川芎 當歸 升麻 白茯苓

山藥 黃芪酒炒 白芍炒各一錢 炙甘草五分

右加生薑水煎服

訶子人參湯

治前證

訶子煨去核 人參 白茯苓 白术 炙甘草

蓮肉 升麻 柴胡各等分

右加生薑水煎服

縮砂散

治大腸虛而挾熱脫肛紅腫

槐花 槐角炒香黃各等分

右用二鍾生薑三片棗二枚煎一鍾服下陷加

升麻

右用二鍾生薑三片棗二枚煎一鍾服下陷加

升麻

治久痢大腸脫

訶子 赤石脂 龍骨各等分

右爲末臘茶少許和藥摻腸頭上絹帛捲入又以  
鼈頭骨煅少入枯礬爲末入藥同上

蟠龍散

治陽證脫肛

地龍一兩 風化硝二兩

右爲末每用一二錢肛門濕則乾塗燥則清油調  
塗先以見毒消荆芥生葱薑水候溫洗輕輕拭乾  
然後傳藥

伏龍肝散

治陰證脫肛

伏龍肝一兩 龜頭骨五錢 百藥煎二錢半

右爲末每用一二錢濃煎紫蘇湯候溫洗和清油  
調塗並如前法

磁石散

治脫肛

磁石半兩火煅醋淬七次

右爲末每服一錢空心米飲調下

寸金錠子東垣  
十書

治前證

牡蠣粉 紅藤根 乾漆各五錢 藤黃 雄黃

雌黃 船硫黃 輕粉 粉霜 蘇香 硫霜

枯黃丹各一錢

右爲末陳米飯和搗丸如棗核大每一丸納肛門  
深二寸用新磚瓦子二箇炭火燒赤淬醋中綿裹  
一箇於肛門熨之冷卽換之下惡物除根

參芪湯萬病  
回春

一名提肛散治肛門虛寒脫出

人參 黃芪蜜炒 當歸 白朮 生地黃

白芍藥酒炒 白茯苓各一錢 升麻 桔梗

陳皮 乾薑炒各五分 甘草炙三分

右剉作一貼水煎服

熏龍法古今  
醫鑑

治療漏脫肛

龍一箇放鑊內 麝香一二分

右將滾水傾入鑊內泡龍坐其上熏之良久將水  
洗痔後將肉作羹食之將鼈頭作末摻肛上

獨虎散古今  
醫鑑

治療脫肛

五倍子半兩

右水三椀煎至椀半入焰硝荆芥各一錢乘熱熏

洗用五倍子末摻之

文蛤散古今  
醫鑑

治療脫肛不收

五倍子末 白礬 蛇牀子

右煎湯熏洗後以赤石脂末摻芭蕉葉上托入或

長尺餘者以兩牀相接中空以器盛藥水滿架起

與牀平令病者仰臥浸器中逐日如此縮盡爲度

秋暮取霜露侵過浮萍不拘多少以淨瓦攤開陰乾  
其瓦一日一易不可見日務要陰乾用紙包起

右研爲細末先以井水洗淨肛門後以藥末摻上

其肛徐徐卽入

孩兒散醫學入  
門下同

治肛脫熱腫

熊膽五分 孩兒茶三分 片腦一分

右爲末人乳調敷肛上熱汁自出而肛收

茯苓麪

白茯苓 麻子去皮

右爲末和勻九蒸九曬入蜜少許常食之能斷酒  
肉鹽醬可治久痔

七聖丸古今  
醫學

治肛門痛不可忍脈訣曰積氣生於脾臟旁大腸  
疼痛陣難當此藥主之

榔榔 桂心 木香 川芎各五錢

鴆李仁泥一兩五錢 羌活一兩 大黃煨八錢

右爲末蜜丸梧子大白湯下三十九微利卽愈

切不可快利其痔滋甚

槐角丸

治痔漏腫痛或便血

槐角 防風 地榆 枳殼炒 當歸酒洗炒

荆芥各一兩

右爲末煉蜜丸梧桐子大每服五十九空心滾湯  
下腫痛或便祕飲槐花酒膾多或倦宜服黃芪人  
參湯漬而作痛宜服乳香止痛散

雙解散

治男子交感強固精氣以致精血交錯肛門連拗  
腫痛大小便澀滯

薛桂 大黃炒 白芍藥 澤瀉 黑牽牛炒搗

桃仁去皮尖各二錢半 甘草五分 乾薑一錢

右作二劑水二鍾煎七分空心并食前服

秦艽白朮湯

東垣十書下同

治療瘡作痛大便乾燥或下血

秦艽 桃仁去皮尖研膏 澤瀉 枳殼麸炒

皂角仁煅存性 歸尾酒拌 白朮各一錢二分

地榆一錢

血不止信之

右作一劑用水二鍾煎八分食前服亦可爲丸

祛風潤燥湯

治痔瘡焮腫作痛大便祕澀

防風 荆芥穗 羌活 黃連 黃芩 秦艽

枳殼各一錢五分 澤瀉 皂角仁去皮燒存性

桃仁去皮尖研 紅花各一錢 大黃煨二錢

右作一劑用水二鍾煎八分食前服

醫學綱目

治外痔及翻花痔脫肛腫痛膿水不止

柴灰淋濃汁兩椀熬至一椀入 草烏片 大黃片

各二錢慢火熬至半椀入 甘草一錢滾數沸入

淨石灰細末半匙略滾三五次

右用絹兩重濾過再熬成膏候冷入膽礬五分研

極細瓦器盛貯臨用入龍腦末少許和勻以銀篦

薰藥塗傅日一次重者塗三五次先以藥水洗乾

乃塗之神效

秦艽蒼朮湯

東垣十書下同

治前證

秦艽 桃仁去皮尖另研 防風 蒼朮製

皂角仁燒存性爲末各一錢半 當歸梢酒洗  
澤瀉各一錢 大黃少許

雖大便過瀉亦不宜多用 黃檗酒洗  
各五分

若大腸頭沉重者濕勝也更加之如天氣熱或病人燥熱喜冷以意加之

右除桃仁皂角仁二味外餘藥咬咀如麻豆大都

作一服水三盞煎一盞二分去滓入桃仁等二味

再上火煎至一盞空心候宿食消盡熱服之待少

時以美饌壓之不犯胃也服藥日忌生冷硬物冷

菜之類及酒濕麪大料物乾薑之類犯之其藥無

效如有白膿加白葵花五朵去萼青皮半錢去白

入正藥中同煎又用木香三分爲細末同桃仁等

二味再上火同煎依上法服餌古人治此疾多以

歲月除之此藥一服立愈病大者再服而愈

紅花桃仁湯

治前證

車前子一兩五錢 大麻子微炒 大黃各五錢半

生半熟 牛膝酒浸 槭李仁 菟絲子酒浸

枳殼 山藥各二錢

右爲末煉蜜丸如桐子大每服三十丸溫湯下

秦艽防風湯

治痔漏每日大便時發疼痛如無疼痛者非痔漏

也此藥主之

秦艽 防風 當歸 白朮各一錢半 炙甘草

澤瀉各六分 桃仁三十箇 黃檗五分 柴胡

升麻各二分 大黃煨 橘皮各三分 紅花少許

右水三盞煎一盞稍熱空心服

乳香散

治牡痔

箬葉去頭粗梗剉四兩 蛇蛻一條頭尾俱全者

黃牛角尖長二寸者一對剉 乳香 猪牙皂角

鰓鯉甲各二兩

右入砂罐內蓋口鹽泥固濟曬乾用炭十斤煅候

碧燄出去火放冷取出研細每服二錢匕以胡桃

肉一枚細研拌藥空心酒調下

秦艽羌活湯

秦艽 黃芪各一錢 防風七分 藁本三分

升麻 炙甘草 麻黃 柴胡各五分 細莘

紅花各少許 羌活一錢二分

右水二盞煎至一盞空心服

搜風順氣丸

治痔漏風熱祕結

車前子一兩五錢 大麻子微炒 大黃各五錢半

生半熟 牛膝酒浸 槜李仁 菟絲子酒浸

枳殼 山藥各二錢

右爲末煉蜜丸如桐子大每服三十丸溫湯下

秦艽防風湯

治痔漏每日大便時發疼痛如無疼痛者非痔漏

也此藥主之

秦艽 防風 當歸 白朮各一錢半 炙甘草

澤瀉各六分 桃仁三十箇 黃檗五分 柴胡

升麻各二分 大黃煨 橘皮各三分 紅花少許

右水三盞煎一盞稍熱空心服

乳香散

治牡痔

箬葉去頭粗梗剉四兩 蛇蛻一條頭尾俱全者

黃牛角尖長二寸者一對剉 乳香 猪牙皂角

鰓鯉甲各二兩

右入砂罐內蓋口鹽泥固濟曬乾用炭十斤煅候

碧燄出去火放冷取出研細每服二錢匕以胡桃

肉一枚細研拌藥空心酒調下

秦艽羌活湯

治前證

秦艽 桃仁去皮尖另研 防風 蒼朮製

治前證

猪懸蹄甲燒存性研一兩 水銀三大豆許

右先取木銀用蒸棗肉一枚研勻次入猪蹄灰和爲丸如芡實大先以鹽湯洗下部內一丸夜臥再用以瘥爲度

檳榔散

治風氣稽留下部結成牝痔生瘡下血腫疼

檳榔炒 澤瀉酒浸 瞿麥 防己 甜葶藶炒  
藁本去苗土 陳皮去白炒 榆李仁同陳皮炒  
滑石各半兩 木香 芫花酢拌炒黃各一兩

乾漆炒烟盡一錢二分半

右爲細末每服二錢不拘時溫酒調下日三

檳藤散

治痔下血不止生瘡腫痛

檳藤子仁 龜甲酢炙 黃芪 蛇蛻燒灰存性  
槐角子炒 川大黃炒 藁本 桂心各半兩

當歸剉炒 蜂房炙各七錢五分 猪後懸蹄甲七枚炙焦黃

右爲細末每服二錢食前米飲下

麝香散

治牝痔及一切內外痔疼痛不可忍

新黃大苦蕷一枚切開頂子不去瓢選不蛀皂角子填滿以開下頂蓋合別用紙筋泥固濟約三指厚以炭火簇合燒令紅放於地坑內出火毒一宿取出入

麝香末一錢

右研極細以磁盒盛每服一錢匕米飲調下

赤小豆散

治前證

赤小豆炒熟 生地黃 黃芪各一兩 赤芍藥

白薇 桂心各半兩 黃芩 當歸微炒各七錢半  
右爲細末每服二錢食前槐子煎湯調下

乾葛湯

乾葛 枳殼炒 半夏薑製 生地黃 茯苓

杏仁各一錢五分 黃芩 甘草炙各五分

右水二錘黑豆一百粒薑五片白梅一箇同煎至一鍾食前服

橘皮湯

治前證

橘皮 枳殼炒 槐花炒 川芎各一錢五分

桃仁去皮尖炒 木香 檳榔 紫蘇 香附

甘草炙各一錢

右咬咀水二錘生薑三片紅棗一枚煎一鍾食前溫服

威靈仙丸

治氣痔大便澀

威靈仙 乳香另研 枳殼炒各一兩

右爲細末以粟米飯和爲丸桐子大每服十五丸

食前米飲送下日三服

熏熨方

治氣痔脫肛

枳殼炒 防風各一兩 白礬枯二錢五分另研

右咬咀拌勻水三椀煎至二椀乘熱熏之仍以軟帛蘸湯熨之通手卽淋洗

桑木耳散

治痔疾肛邊痒痛

桑木耳灸 槐木耳灸 蟬皮炙黃 羌活  
當歸炒各一兩 枳殼二兩炒

右爲細末每服二錢食前粥飲調下

皂角煎丸

治內痔腸頭裏面生核寒熱往來

滿尺皂角三挺去核弦酢炙 蕙苡仁 白朮煅  
刺蝟皮炙黃 白芷各一兩 桃仁去皮尖炒

甜葶藶炒 川芎 桔梗各半兩 猪後蹄垂甲十枚燒存性

皮煎湯服

龍甲丸

治內痔

龍甲丸

治內痔

龍甲丸

治內痔

龍甲丸

治內痔

龍甲丸

治諸痔出血裏急疼痛

刺蝟皮一張炙焦 川芎 白芍藥 槐花微炒

枳殼炒 艾葉炒黃 地榆 當歸身 黃芪炙

白礬煅 貢衆各半兩 猪後蹄甲十枚炙焦

盈尺皂角一挺去弦核酢炙黃 頭髮三錢燒存性

右爲細末蜜丸如桐子大每服五十九食前米飲送下

痛甚能消丸

治諸痔疼痛不可忍者

黑玉丹

威靈仙四兩 防風 刺蝟皮燒灰存性 卷柏

阿膠炙燥各半兩 糯米炒一合

右爲細末蜜丸如梧子大每服十九加至二十九

不拘時用人參湯送下日二服

試蟲散

治前證

臭椿皮 慎火草陰乾景天 地骨皮各二兩

馬牙硝一兩

右爲細末用精豬肉一片摻藥末三錢匕在肉上就上坐一二時起看有蟲即出無即已

龍腦散

治痔瘡熱毒

活鯽魚一尾去腸雜入穀精草填滿以泥固濟糠火燬存性

右爲細末入龍腦少許蜜調傅之

白金散

治久新痔痛如神

海螵蛸去粗皮

右一味爲細末每用二三錢生麻油調成膏以雞翎拂上每日夜用之日久自消

烟熏方

治痔漏痛

白蟮魚骨 熟艾各等分

右剉碎和勻用新盆子一箇盛藥在內用紙封盆口上通一竅以火燒藥候烟出竅上坐熏之烟盡即止

治新久腸風痔漏著牀疼痛不可忍者服此藥不過三四次便見功效初得此疾發癢或疼穀道週迴多生梗核此是痔如破是漏只下血是腸風皆酒色氣風食五事過度卽成此疾人多以外醫塗治病或在腸中自有蟲蝕若不去根本其病不除

此藥真有奇效

刺蝟皮 槐角各三兩 猪後懸蹄甲四十九枚

牛角鰓剉 亂髮皂角水洗 敗櫻各二兩以上六

味俱裝入鍋內燒存性 苦棟皮一兩二錢五分

芝麻生 雷丸各一兩 乳香五錢 蘑香一錢

右爲末酒煮麪糊丸如桐子大每服八丸先嚼胡桃一枚以溫酒吞下或海藻煎酒吞下空心食前日三服切忌別藥不過三五日永除根本

地榆散

治痔瘡腫痛

地榆 黃芪炙 枳殼炒 檳榔 川芎 黃芩

槐花 赤芍 羌活各一錢 白芨 蜂房炒焦

甘草炙各五分

右作一服水二鍾煎至一鍾食前服

皂刺丸

治痔漏愈而復痒

皂角刺二兩燒煙盡存性 槐花 防風七錢半

蛇牀子 白礬煅 枳殼 白蒺藜炒去刺

羌活各五錢 蜂房炒焦 五倍子各二錢五分

右爲細末酢調菜豆粉煮糊爲丸如桐子大每服五十九食前用苦棟根煎湯送下仍用熱童便入

白礬末淋洗肛門 蒲黃散

治痔漏

蒲黃 血竭半兩

右爲細末每用少許貼患處

槐角地榆丸

治痔漏脈芤下血者

地榆 槐角 白芍藥炒 山梔子炒焦 枳殼

黃芩 荆芥穗

右入生地黃水煎服

槐角炒 枳殼炒 黃連 黃芩 當歸 白芍

赤茯苓 甘草

烏梅燒存性 右入生地黃水煎服

荆枳湯

治前證

荆芥穗 枳殼炒 槐花 紫蘇莖葉 香附

甘草炙各等分

右爲細末每服二錢空心米飲調下

逐瘀湯

通利大小便腸取下惡物

川芎 白茯神 白芷 木通 赤芍 甘草生

白茯苓 乾地黃 五靈脂 枳殼 蓬莪术

阿膠各一錢 桃仁去皮尖炒 大黃各一錢五分

右作二服用水二鍾生薑三片蜜三匙同煎食前服以利爲度

骨碎補丸

治前證

骨碎補 補骨脂 熟地黃 川當歸 繢斷

石楠葉 黃芪 銀石斛 牛膝 杜仲炒去絲

菟絲子各二兩 附子炮一兩 白芍藥 川芎

菟絲子 沙參 羌活 防風 獨活 天麻各兩半

右爲末煉蜜丸空心鹽湯下

大瘻方

羌活 防風 細辛 附子 甘草 川芎

續斷 白芍藥 白朮 當歸 桂心 麻黃

黃芪 熟地黃

右爲細末煉蜜丸空心鹽湯下三錢此方與前骨

碎補丸相表裏

桂附丸

治氣漏諸瘡

乳香一錢 厚朴薑製 粉草炙 白朮 桂心

附子炮裂米醋中浸再炮三五次去皮臍各一兩

木香二錢五分

右爲細末煉蜜丸如桐子大空心米飲下二三十

丸丹溪云精要治漏諸瘡與桂附丸此屬冷只因

瘡久不合風冷乘之血氣不潮而成也厚朴雖溫其瀉衛尤速恐不若參芪佐以陳皮庶乎與病情

相得此方治冷漏瘡若寒而虛者只以加味十全

湯隨時令經絡加減用之爲當又虛甚者宜參术

歸芪膏

陷脈散

治漏瘡及三十年瘻瘍大或如盆孟久久不瘥

致有漏潰令人骨肉消盡或堅或軟或潰令人驚惕臥寐不安體中掣痛愈而復作

乾薑炮 琥珀研 附子炮去皮 大黃各一兩

丹參七錢半 石硫黃研 白石英研 鍾乳研

鷦鷯骨研各半兩

右爲末貯以磁盒韋囊勿令泄氣若瘡濕即傳無

汁卽煎豬脂和傅之以乾爲度或死肌不消加芒硝二兩益佳一法加胡燕窠一枚

蜈蚣油

醫學入門

治諸痔

端午日取大蜈蚣一條竹簽陰乾

右俟臨發剪一寸煅存性麻油調塗輕則不發重

則次年對周日又發再剪一寸煅塗斷根又法用

生蜈蚣數條浸麻油內俟生微略化塗痔及諸瘡

癬

枯痔方

醫學

治諸痔消腫

雄黃 硫黃 明礬各等分

右爲末用新盞先鋪礬末一半次鋪餘藥又以礬

末蓋上火煅候礬枯爲度研爲末津唾調傅乾落

爲度後用石膏五倍子爲末敷收瘡口神效

黑靈散

治漏瘡

牡蠣粉 賴丹 硫黃研各一分 露蜂房剉二分

右同炒令烟盡爲細末入髮灰一分麝香少許和

勻傅之

馬齒莧陰乾 臟月燭燼各等分

右爲細末以臘猪脂和先以溫泔水洗拭乾然後

以藥傅之日三

神應膏

宋褚防禦治理宗久漏瘡諸方不效獨此膏愈之

如腸毒胃毒爲丸服之神效

當歸一兩一錢 赤芍藥 大黃各兩半 白芷

生地黃各一兩二錢

梔榔散

右九味細剉用真香油二斤浸春五日夏三日秋

七日冬十日入鍋內以文武火煎令黑色濾去查

如熱天用黃丹二十兩冷月十五兩旋旋下丹不

住手攪試水中沉爲度不可令婦人雞犬見如漏

有孔者以膏送入孔內外以膏攤貼之

檳榔散

治癰疽瘡癰膿潰之後外觸風寒腫焮僵硬膿出

清稀出而不絕肉腠空虛惡汁臭敗瘡邊乾急好

肌不生及療疳瘡不斂口

木香 檳榔 黃連

右等分爲細末猪脂和傅瘡口卽斂

治漏外塞藥

爐甘石煅童便淬 牡蠣粉

右爲極細末傅之

截疳散

東垣十書

治年深疳瘡

黃連 麝香 龍腦各半兩 密陀僧 黃丹

白芨 白薇各一兩 輕粉一錢

右爲細末和勻乾摻或紙上以膏貼之

黑丸子良方奇效

專治久年痔漏下血

百草霜 白僵蠶各一兩 木餳頭三兩 烏梅

敗櫟 側柏葉 亂髮各一兩二錢半俱燒存性

桂心三錢 白芷五錢

右爲細末研勻醋糊爲丸如梧桐子大每服三五

十九空心用米飲湯送下

加味四君子湯

治五痔下血面色萎黃心忪耳鳴脚弱氣乏口淡

人參 白朮炒 白茯苓 白扁豆蒸 黃芪炙

甘草炙各等分

右爲細末每服二錢白湯點服一方有五味無甘草

食不知味

臭樗皮散 治痔漏下血及膿不

艾葉三分微炒 臭樗皮微炒 黃連 地榆

酸石榴皮 真阿膠炒令黃各一兩

右爲細末每服二錢食前粥飲調下

神效方

治痔疾下血日夜不止

白藜五兩 綠藜三兩 黃丹飛 伏龍肝

螵皮各二兩

右搗碎入磁罐子內用炭火五七斤燒炭盡爲度候令取出研如粉以麪糊爲丸如梧桐子大每服

十九空心米飲下

芎歸丸

治前證

川芎 當歸 神薌炒 黃芪 槐花微炒

地榆各半兩 荆芥穗 頭髮燒存性 木賊

阿膠炒各一兩

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服五十九食

前用米飲送下

猪臘丸

治痔漏下血

猪臘一條洗淨控乾 槐花炒爲末入臘內兩頭紮

定石器內米醋煮爛

右搗和丸如梧桐子大每服五十九食前當歸酒下

勝金丸

右爲細末軟飯和丸如梧桐子大每服五十九空心

百藥煎三兩一兩生用一兩炒焦一兩燒存性

右爲細末軟飯和丸如桐子大每服五十九空心

米飲下一方爲細末米湯調二錢服

應效散

一名托裏散治氣瘻疳蝕瘡多年不效者

地骨皮不拘多少冬月取皮陰乾

右爲細末每用紙捲蘸紙瘡口內自然生肉更用

米飲調二錢不拘時服三日見效

內托黃芪酒煎湯

治寒熱濕腎癱堅硬漫腫作痛

黃芪鹽水拌炒 歸尾各二錢 柴胡一錢半

肉桂各一錢 甘草炙 黃藥各五分

升麻七分 大力子炒一錢

右作一劑水酒各一鍾煎八分食前服

神應散

黃牛角鬚一枚槌碎 猪牙皂角七箇去皮弦子

蛇蛻皮一條 穿山甲七片 刺蝟皮一兩

右各細剉入罐內黃泥固濟火煅通紅候冷細研爲末臨臥時細嚼胡桃仁一箇如糊用好酒一盞送下使睡至五更時以溫酒調下藥三錢至辰時更進一服雖久病不過三服立效

加味香蘇散得效方

陳皮 枳殼 川芎 槐花各一錢 紫蘇莖葉

檳榔 木香 桃仁 香附 甘草各五分

右剝作一貼薑三片棗二枚同煎服

上品錠子醫學入門

專治十八種痔漏

紅藜一兩二錢五分 信砒火煅五錢 乳香

沒藥 硫砂各二錢五分 牛黃二分五釐

硇砂五分熟二分生三分

右爲末麪糊和勻捻成錠子看瘡大小深淺插入

竅內肉變黑色直待黑肉去盡方可上生肌散

釣腸丸得效

治諸痔及久瘻脫肛下膿血

黃苦蓼 蠟皮各一箇 胡桃肉七箇俱燒存性雞冠花二兩半 白附子 南星 半夏各三兩枳殼 藥子皮各一兩 綠藜殼 白藜殼

附子生各五錢

右爲末酢糊和丸梧子大空心溫酒下三十九

寬腸丸

治痔大便祕濕痛用此寬腸

黃連 枳殼各等分

右爲末麪糊和丸梧桐子大米飲下五十九

又方

凡用藥枯痔後大便堅硬難下宜用此方

大黃煨 枳殼 當歸酒洗各等分

右爲末煉蜜丸梧子大服如上法

血竭散直指方

治痔漏痛不可忍

血竭 牡蠣粉 髮灰各等分

右爲末入麝香少許津唾調敷或杏仁泥調敷

清心丸丹溪心法

治痔痒痛內經曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火此諸痔受病之源也此藥主之

黃連一兩 茯神 赤茯苓各五錢

右爲末蜜丸梧子大空心米飲下百丸

枯礬散得效方

治五痔痒痛

枯白礬一錢 片腦五分

右爲末先以藥湯洗後摻少許

水馬散

治一切痔

夏月三伏內於止水中採婆子一名水馬兒高腳水

面跳走者是也採取三十箇用三張紙包每包十箇

於背陰處懸掛陰乾

右每包作一服研爛空心溫酒調下良久乃吃飯

三日連三服十日內見效久患痔瘻血者二三十

服絕根

黑地黃丸河間六書

治久痔痔漏下膿血虛者服之神妙治痔之聖藥

蒼朮一斤米泔浸熟地黃一斤 五味子八兩

乾薑秋冬一兩春七錢夏五錢

右爲末棗肉和丸如梧子大空心米飲或溫酒下

百丸

三神丸東垣十書

治僧道流因久坐飽食發爲諸痔

枳殼 皂角殼 五倍子炒各等分

右爲末蜜丸梧子大空心溫水下五十九

脚毒湯萬病回春

洗痔漏

焰硝一兩 瓦松 馬齒莧 甘草各五錢

五倍子 川椒 防風 側柏葉 枳殼 葱白

蒼朮各三錢

右水五椀煎至三椀熏洗日二次

熊冰膏醫學入門

治五十年久痔及一切痔漏脫肛止痛絕勝他藥

熊膽二分半 片腦半分研勻

右以白雄雞膽三箇取汁調勻以雞羽蘸塗痔上

先以藥水洗淨乃上藥神效

痔漏有蟲如細絲黑頭取去除根

瞿麥半升 猪牙皂角一寸

右爲末入猪腰子一隻內用米泔煮空心食之少

頃腹痛上廁蟲皆隨出作地坑埋之薄粥補之

涼血飲

治痔漏因風熱燥歸於大腸故涼血爲主

人參 黃芪 黃連 生地黃 當歸 川芎

槐角 條芩 枳殼 升麻各一錢

右剉作一貼水煎空心服或丸服

蓮花蕊散

治痔漏二三十年不愈者三服效

蓮花蕊 黑烏頭末各一兩五錢 當歸五錢

礬紅二錢

右爲末先忌食肉六七日空心食肉一頓取溫酒

下藥三錢取下膿血或蟲是效

取漏膿法醫學入門

焰硝三兩 苦參一兩五錢

右爲末用布四寸長二寸闊縫一袋入藥半袋以

砒三分放藥末中間方入全藥袋滿縫袋中兩頭

安帶子如跨馬繫住

活龜丸

治腸風痔漏

大烏龜一箇以火燒地熱蓋龜於地逼出臭屁盡通

身用草包縛外用黃泥固濟灰火煅熟取肉研泥

龜殼用牛骨髓塗炙五七次透心酥乾爲末

黃連一兩九蒸九曬 當歸尾三錢三分

右共爲末和龜肉搗丸梧子大白湯下五十九丸

豚胃丸

治痔漏亦治諸瘻

槐花二兩 黃連 牡丹皮各一兩 蝦皮七錢

羌活六錢

右剉入豬肚內縫定煮爛去藥食肚如硬再服以患處軟方止或同上諸藥爲丸服亦可

辰砂膏

丹溪心法

痔漏塞竅

信砒一錢 白礬二錢 密陀僧 辰砂各五錢

右先研信砒細鋪鍋底次用礬末鋪砒上火煅烟盡爲度次將陀僧辰砂研細白糕和勻作尖挺如小麥大取一粒納漏孔內俟敗肉盡後貼生肌散

田螺膏

治痔瘡腫痛坐臥不得諸藥不效者

大田螺八九箇以針挑開頂蓋入白礬末少許於內置地上尖底埋土中其頂蓋仰天經一宿次日取蓋上水汁以雞羽塗痔上五七次即消