

卷之六

蓼 科

1272 金线草 *Jinxiancao*
江西《草药手册》

〔异名〕 重阳柳、蟹壳草(花镜),毛蓼、白马鞭(植物名实图考),人字草、九盘龙(广西中药志),毛血草(贵州民间药物),野蓼、一串红(江西《草药手册》),蓼子七、化血七、大蓼子、九节风(万县中草药),大叶辣蓼、鸡心七(甘肃)。

〔品种考证〕 本品以毛蓼之名见于《植物名实图考》限草类,曰:“其穗细长,花红,冬初尚开,叶厚有毛,俗呼为白马鞭。”据其文图,其原植物与蓼科金线草较一致。

〔来源〕 为蓼科植物金线草、短毛金线草的全草。

〔原植物〕 1. 金线草 *Antenoron filiforme* (Thunb.)
Roberty et Vautier [*Polygonum filiforme* Thunb.]

多年生直立草本,高50~100cm。根茎横走,粗壮,扭曲。茎节膨大;叶互生;有短柄;托叶鞘筒状,抱茎,膜质;叶片椭圆形或长圆形,长6~15cm,宽3~6cm,先端短渐尖或急尖,基部楔形,全缘,两面有长糙伏毛,散布棕色斑点。穗状花序顶生或腋生;花小,红色;苞片有睫毛;花被4裂;雄蕊5;柱头2歧,先端钩状。瘦果卵圆形,棕色,表面光滑。花期秋季,果期冬季。

生于山地林缘、路旁阴湿地。分布于山西、陕西、山东、安徽、江苏、浙江、江西、河南、湖北、广东、广西、四川、贵州等地。

2. 短毛金线草 *Antenoron neofiliforme* (Nakai) Hara

本种与金线草的主要区别为:叶先端长渐尖,两面有短糙伏毛。分布于西南及陕西、甘肃、山东、江苏、安徽、浙江、江西、湖北、河南等地。

〔采收加工〕 夏、秋季采收,晒干或鲜用。

〔药材及产销〕 1. 金线草 *Herba Antenoronis Filiformis*
产于云南、贵州、四川、陕西、湖北、广西、江西、江苏、浙江等地。自产自销。

2. 短毛金线草 *Herba Antenoronis Neofiliformis* 产销同上。

〔药材鉴别〕 性状鉴别 (1) 金线草 根茎呈不规则结节状条块,长2~15cm,节部略膨大,表面红褐色,有细纵皱纹,并具众多根痕及须根,顶端有茎痕或茎残基。质坚硬,不易折断,断面不平整,粉红色,髓部色稍深。茎圆柱形,不分枝或上部分枝,有长糙伏毛。叶多卷曲,具柄;叶片展开后呈宽卵形或椭圆形,先端短渐尖或急尖,基部楔形或近圆形;托叶鞘膜质,筒状,先端截形,有条纹,叶的两面及托叶鞘均被长糙伏毛。气微,味涩、微苦。

(2) 短毛金线草 茎枝无毛或疏生短伏毛;叶片长椭圆形



金线草

或椭圆形,先端长渐尖,略弯曲,有短糙伏毛;托叶鞘疏生短糙伏毛或近于无毛。

显微鉴别 金线草茎横切面:韧皮纤维束散在。形成层成环。木质部导管稀少,散见于木纤维中。薄壁细胞含淀粉粒及草酸钙簇晶。淀粉粒多单粒,圆形、长椭圆形、三角形,直径3~8 μ m,脐点多在中心。草酸钙簇晶直径32~40 μ m。

〔药性〕 味辛、苦,性凉,小毒。

1. 《广西中药志》:“辛、涩,温,有小毒。入脾经。”

2. 《广西本草选编》:“味微苦、辛,性温。”

3. 《青岛中草药手册》:“性寒,味辛、涩。”

4. 南药《中草药学》:“辛、苦,微寒。”

5. 《福建药物志》:“辛,微凉。”

〔功能与主治〕 凉血止血,清热利湿,散瘀止痛。主治咳血,吐血,便血,血崩,泄泻,痢疾,胃痛,经期腹痛,产后血瘀腹痛,跌打损伤,风湿痹痛,瘰疬,痈肿。

1. 《广西中药志》:“祛风止痛,健脾燥湿,散瘀消肿。治霍乱吐泻,风湿痛,痈肿,瘰疬。”

2. 《广西本草选编》:“行气止痛,活血调经。主治胃脘痛,月经不调,白带,痢疾,腹痛泄泻,外伤出血。”

3. 《青岛中草药手册》:“散瘀止血,清湿热,消肿毒,舒筋接骨,解毒利气。”

4. 南药《中草药学》:“止血,解毒,散瘀。治肺结核咳血,经期、产后瘀阻腹痛,胃痛。”

5. 《广西民族药简编》:“水煎服,治腰痛,痢疾,肠炎腹泻,咯血;兼捣烂敷伤口周围,治毒蛇咬伤。”

〔用法用量〕 内服:煎汤,9~30g。外用:适量,煎水洗或捣敷。

〔使用注意〕 孕妇慎服。

《广西本草选编》:“孕妇忌服。”

〔附方〕 1. 治初期肺癆咯血 金线草茎叶30g。水煎服。(江西《草药手册》)

2. 治肺结核咯血 金线草30g,千日红15g,筋骨草9g,产麻根15g。水煎,加白糖15g,冲服。(《青岛中草药手册》)

3. 治痢疾 鲜金线草、龙芽草各30g。水煎服。(《福建药物志》)

4. 治经期腹痛,产后瘀血腹痛 金线草30g,甜酒50ml。加水同煎,红糖冲服。(江西《草药手册》)

5. 治风湿骨痛 人字草、白九里明各适量。煎水洗浴。(《广西中药志》)

6. 治皮肤糜烂疮 金线草茎叶水煎洗患处。(江西《草药手册》)

1273 金线草根 *Jinxiancaogen*
《四川中药志》

〔异名〕 海根(本草拾遗),铁棱角三七、铁箍散(天目山药用植物志),毛药、水线花根(贵州民间药物),蓼子七(四川中药志),土三七、铁拳头(江西《草药手册》)

〔来源〕 为蓼科植物金线草 *Antenoron filiforme* (Thunb.) Roberty et Vautier 和短毛金线草 *A. neofiliforme* (Nakai) Hara 的根茎。

〔原植物〕 参见“金线草”条。

〔采收加工〕 夏、秋季采挖,洗净,晒干或鲜用。

〔化学成分〕 短毛金线草根茎含有没食子酸(gallic acid),左旋儿茶精(catechin),左旋表儿茶精(epicatechin),左旋表儿茶精-3-O-没食子酸酯(epicatechin-3-O-gallate),原矢车菊素(procyanidin)_{B₂},原矢车菊素 B₂-3'-O-没食子酸酯(procyanidin B₂-3'-

(-)gallate)^[1]。

【药理】 短毛金线草 (*Antenoron neofiliforme*) 的根在试管内对金黄色葡萄球菌有较强的抗菌作用,对变形杆菌、痢疾杆菌、伤寒杆菌、副伤寒杆菌、白色葡萄球菌、大肠杆菌和绿脓杆菌等也有不同程度的抗菌作用^[1]。

【药性】 味苦、辛,性微寒。

1. 《本草拾遗》:“味苦,小温。无毒。”
2. 《天目山药用植物志》:“性寒,味苦。”
3. 《贵州民间药物》:“性凉,味苦、涩。”
4. 《湖北中草药志》:“淡,平。”
5. 《四川中药志》1982年版:“苦、辛,凉。”

【功能与主治】 凉血止血,散瘀止痛,清热解毒。主治咳嗽咯血、吐血、崩漏,月经不调,痛经,腕腹疼痛,泄泻,痢疾,跌打损伤,风湿痹痛,瘰疬,痈疽疔毒,烫火伤,毒蛇咬伤。

1. 《本草拾遗》:“主霍乱中恶,心腹痛,喉痹,蛊毒,痈疽恶肿,赤白游疹,蛇咬犬毒。酒及水磨服,敷之亦佳。”
2. 《花镜》:“治汤火疮。”
3. 《四川中药志》1962年:“散瘀行气,消肿止痛。”
4. 《天目山药用植物志》:“止血,解毒。治各种出血,解诸药毒。”

5. 《贵州民间药物》:“除湿热,止泻痢。”

6. 《全国中草药汇编》:“凉血止血,祛瘀止痛。主治吐血,肺结核咯血,子宫出血,淋巴结核,胃痛,痢疾,跌打损伤,骨折,风湿痹痛,腰痛。”

【用法用量】 内服:煎汤,15~30g;亦可泡酒或炖肉服。外用:适量,捣敷;或磨汁涂。

【使用注意】 孕妇慎服。

【附方】 1. 治初期肺癆咯血 金线草根 30g。水煎服。(江西《草药手册》)

2. 治久咳 蓼子七 30g,胡颓叶 9g,水煎服。咳嗽咯血加苎麻根 15g,水煎服。

3. 治血热崩漏 蓼子七 30g,荠菜 30g。水煎服。(2~3方出自《四川中药志》1982年)

4. 治月经不调及痛经 金线草根 250g,切细和鸡或猪蹄脚 2只,加黄酒炖烂,去滓服食。每月经时服 1次,约服 2~3次。

5. 治月经不调,经来腹胀,腹中有块 金线草根 30g,益母草 90g。水煎,冲黄酒服。(4~5方出自《天目山药用植物志》)

6. 治胃痛 金线草根 30g,首乌 15g,青木香 9g。水煎服。(《湖北中草药志》)

7. 治水泻 水线花根 30g,煎水服。每日 3次。

8. 治红白痢疾 生水线花根 90g,红、白糖各 15g。煎水服。(7~8方出自《贵州民间药物》)

9. 治霍乱腹痛,蛇咬伤 金线草根,水酒磨汁内服,并外涂。(江西《草药手册》)

10. 治白带 水线花根 30g,炖肉吃。(《贵州民间药物》)

11. 治跌打损伤 ①鲜金线草根 30g,鲜杜衡 15g。共捣烂,敷患处。(《湖北中草药志》) ②蓼子七 30g,大血藤 30g,红牛膝 30g,酢浆草 30g,铁马鞭 30g。浸酒服,并外搽。(《四川中药志》1982年)

12. 治骨折 鲜金线草根适量,切碎,捣极烂,酌加甜酒或红砂糖捣和,敷于患处,夹板固定。

13. 治腰痛 鲜金线草根 30~45g。水酒各半煎服。

14. 治淋巴结核 鲜金线草根 30~45g,玄参 9~12g,芫花根 3g。水煎,以鸡蛋 2个煮服。(12~14方出自江西《草药手册》)

参考文献

化学成分

[1] Liang Xiao Zhong, et al. C. A, 1990, 112:73775x

药理

[1] 张德山,等. 中医药学报, 1981, (4):52


1274 沙拐枣 *Shaguizao* (沙漠地区药用植物)

【异名】 头发草(沙漠地区药用植物)。

【来源】 为蓼科植物沙拐枣的根或带果全草。

【原植物】 沙拐枣 *Calligonum mongolicum* Turcz.

灌木,高 1~1.5m。老枝灰白色,开展;一年生枝草质,绿色,有关节,节间长 1~3cm。叶线形,长 2~4mm;托叶鞘膜质,极小。花两性,淡红色,通常 2~3朵簇生于叶腋;花梗细弱,下部有关节;花被片 5,卵形,大小不等,果期水平伸展;雄蕊 12~16,与花被近等长;子房椭圆形,有 4棱,花柱 4,较短,柱头头状。瘦果宽椭圆形,不扭转或稍扭转,先端急尖,基部狭窄,连刺毛直径约 10mm;肋状突起不明显,每一肋状突起有 3行刺毛;刺毛稀疏,有分枝,细弱而脆,易折断。花、果期 5~7月。



沙拐枣

生于沙丘、沙地。分布于内蒙古、宁夏、甘肃、新疆等地。

【采收加工】 根夏、秋采挖,全草果熟期采收,晒干。

【药性】 味苦、涩,性微温。归肾、膀胱经。

1. 《沙漠地区药用植物》:“味苦、涩,性微温。”

2. 《甘肃中草药手册》:“苦,微寒。”

【功能与主治】 清热解毒,利尿。主治热淋,尿浊,疮疖疔毒,皮肤皴裂。

(《甘肃中草药手册》:“清热解毒,利尿。主治热淋尿浊,疮疖疔毒,皮肤皴裂等。”)

【用法用量】 内服:煎汤,15~30g。外用:适量,研末调敷或煎水洗。

【附方】 1. 治小便混浊 沙拐枣根 15~30g。水煎服。(《沙漠地区药用植物》)

2. 治尿浊,热淋 沙拐枣根 30~60g。水煎服。(《甘肃中草药手册》)

3. 治皮肤皴裂 沙拐枣全草,研末,调油膏外涂或煎水外洗。(《沙漠地区药用植物》)

1275 **金荞麦** *Jinqiaomai*
(植物名实图考)

【异名】赤地利(《新修本草》),赤薜荔(《纲目》),金锁银开、天荞麦根(《李氏本草》),开金锁(《本草从新》),贼骨头、透骨消(《植物名实图考》),苦荞头、铁石子(《天宝本草》),野荞子(《分类草药性》),蓝荞头(《民间常用草药汇编》),荞麦三七(《浙江民间常用草药》),野荞麦根、苦荞麦根(《上海常用中草药手册》),荞当归(《陕西中草药》),铁拳头(江西)。

【释名】本品叶似荞麦,而根内部呈黄赤色,故称金荞麦。其余诸“荞麦”之名,皆因叶形相似而得名。汪连仕(《采药书》):“能开锁缠喉风”,因而称金锁银开、开金锁。《植物名实图考》:“为治跌打要药,窃贼多蓄之,故俚医呼贼骨头。”又根累结成团块,色黑赤,而有铁石子、铁拳头之名。以“当归”、“三七”称之者,皆因其有活血化瘀之功。

【品种考证】本品以“赤地利”之名始载于《新修本草》,云:“叶似萝藦蔓生,根皮赤黑,肉黄赤。二、八月采根,日干。”(《本草拾遗》)云:“生江东平地。花、叶如荞麦,根坚硬似狗脊,一名五截,一名蛇罔。”(《本草图经》)云:“所在山谷有之,今惟出华山,春夏生苗,作蔓绕草木上,茎赤,叶青,似荞麦叶,七月开白花,亦如荞麦,根若菝葜。亦名山荞麦。”所附图有误。而《植物名实图考》在蔓草类“赤地利”条下云:“江西、湖南通呼为天荞麦,亦曰金荞麦。茎柔披靡,不缠绕,茎赤叶青,花、叶俱如荞麦,长根枯硬。”以上所述,考其文图,其原植物与药用金荞麦相一致。

【来源】为蓼科植物金荞麦的根茎。

【原植物】金荞麦 *Fagopyrum dibotrys* (D. Don) Hara [*Fagopyrum cymosum* (Trev.) Meisn.] 又名:五毒草、五截、蛇罔(《本草拾遗》),天荞麦(《李氏本草》),野荞麦(《南京地区常用中草药》),万年荞(《云南药用植物名录》),苦荞麦(《广西药用植物名录》)。

多年生宿根草本,高0.5~1.5m。主根粗大,呈结节状,横走,红棕色。茎直立,多分枝,具棱槽,淡绿微带红色,全株微被白色柔毛。单叶互生,具柄,柄上有白色短柔毛;叶片为戟状三角形,长宽约相等,但顶部叶长大于宽,一般长4~10cm,宽4~9cm,先端长渐尖或尾尖状,基部心状戟形,顶端叶狭窄,无柄抱茎,全缘或微波状,下面脉上有白色细柔毛;托叶鞘抱茎。秋季开白色小花,为顶生或腋生,稍有分枝的聚伞花序;花被片5,雄蕊8,2轮;雌蕊1,花柱3。瘦果呈卵状三棱形,红棕色。花期7~8月,果期10月。(图1)

生于路边、沟旁较阴湿地。分布于华东、中南、西南和陕西、甘肃等地。

【栽培要点】生物学特性 适应性较强,喜温暖气候,适宜生长的温度为15~30℃,在-10℃左右地区栽培可以安全越冬。土壤以肥沃疏松的砂质壤土生长较好,粘土及排水不良的低洼地不宜种植。

栽培技术 用种子、根茎和扦插繁殖。种子繁殖:春播或秋播均可,春播4月,秋播10月。根茎繁殖:在春季将根茎挖出,选取健康根茎切成小段,以根茎幼嫩部分及根茎芽胞作繁殖材料。扦插繁殖:在夏季剪取组织充实的枝条,长15~20cm,具节2~3个,插条深2/3,行距12cm×9cm。

田间管理 在苗期要勤除杂草,松土2~3次,追肥可在苗高50~60cm左右或开花前施1次化肥,每1hm² 225~300kg。雨季注意排水,干旱时应适当浇水。

病虫害防治 桃蚜在发生期喷药液,冬季清园,将枯枝和落叶深埋或烧毁。病毒病可选无病株留种,注意防治虫害。

【采收加工】在秋季地上部分枯萎后采收,先割去茎叶,将



图1 金荞麦

根刨出,去净泥土,选出作种用根茎后,晒干或阴干,或50℃内炕干也可。

【药材及产销】金荞麦 *Rhizoma Fagopyri Dibotrydis* 主产于江苏、浙江;江西、湖南、湖北、广东、广西、贵州等地亦产。多自产自销。

【药材鉴别】性状鉴别 根茎呈不规则团块状,常具瘤状分枝,长短、大小不一,直径1~4cm。表面棕褐色至灰褐色,有紧密的环节及不规则的纵皱纹,以及众多的须根或须根痕;顶端有茎的残基。质坚硬,不易折断,切断面淡黄白色至黄棕色,有放射状纹理,中央有髓。气微,味微涩。(图2)

以个大、质坚硬者为佳。




图2 金荞麦(根茎)外形

查看完整版

付费下载



【百万古籍库】

<https://www.fozhu920.com/list/>

【易】【医】【道】【武】【文】【奇】【画】【书】

1000000+ 高清古书籍

打包下载





【风水】风水命理资料合集_9500 本

阴宅阳宅、风水堪舆、八字命理、手相面相、符咒卦象、奇门遁甲、紫微斗数.....



【中医】中华传统医学资料大全_15000 本

针灸、推拿、正骨术、汉医、苗医、民间秘方偏方、药洒药方、祖传医术、珍本...



【道术】道家法术\茅山术\符咒术\气术_3000 套

修真秘籍、丹道、道家秘术、胎息功、内丹术、茅山法术、道家符咒、巫术、...



【武术】传统武术与现代搏击术_6200 册

少林、武当、太极拳、形意拳、八极拳、咏春拳、气功、散打、格斗、拳击、...



【集藏】经史子集库_13300 卷

【经史子集】楚辞、汉赋、诗集、词集、宝卷、正史、编年、别史、纪事本末、地理志...



【国画】传世名画 _ 6100 卷

唐、金、辽、宋、元、明、清 800 多位画家近 6000 多幅传世...



【县志】方志\地方县志\乡志\地理志_8100 册

府志、区志、乡志、地理志..... 此合集为全国范围地方县志\府志古籍影印电子版，...



【国学】中华古籍库—32 万册古籍书

32 万册《中华古籍库》【32 万册影印古籍 + 20 多亿字，带检索器和阅读工具】包括各地方志、日本内...

【更多】 >> <https://www.fozhu920.com/list/>